


27 décembre 1904

HERBIER BOISSIER

CHAMBÉSY

SUISSE.



Monsieur,

Le grand échantillon que vous nous avez adressé est en tous points identique au Myosotis Welovitchii Bux. et Reut. de l'Herbier Boissier.

Quant au jeune échantillon, il est trop peu développé pour pouvoir s'identifier avec certitude: le seul caractère bien accusé est la surabondance de poils dressés le long de la tige et sur les calices; si ce caractère se maintient avec le complet développement de la plante, il pourrait suffire à la distinguer du M. Welovitchii, dont les soies sont rarement étalées et plus fréquemment réfléchies surtout dans la partie inférieure de la tige. — Ce caractère de votre jeune plante se retrouve, à un bien moindre degré, il est vrai, dans certaines variétés du M. palustris, notamment var. repens J. Don., dont certains échantillons esher-

à Monsieur le Prof. D. J. A. Henriques
Université de Coimbra, Portugal.

liérants se rapprochent plus ou moins
de votre spécimen. En tous cas, il
ne peut être identifié avec le M.
maritima Hochst. de l'Herbier Boissier!

Avec nos remerciements pour
l'autorisation que vous nous
donnez de conserver pour l'Herbier
Boissier les échantillons envoyés,
nous vous prions d'agréer, Monsieur,
l'assurance de nos sentiments
bien distingués

Gustave Beauverd
Conservateur de l'Herbier.