

Prague le 20/5 1884



Très honoré Monsieur,

J'ai reçu les deux envois que vous bien voulu me communiquer, l'une adressé pour Opvêro et l'autre adressé pour ici. Ayant étudié ces plantes j'ai l'honneur de vous informer des notes suivantes.

*Ranunculus* a (Cabo. de Basto 4.81 lg. Moller) = *R. Lenormandii* f. Schy, forma foliis minoribus.

*Ranunculus* b. (de la même localité et du même collecteur) = *R. Lenormandii* f. Schy. forme major [ad *R. homeiophyllum* vergens]

*Adonis* (Lissabon 4.80. lg. Moller) = *A. haeclica* Cass.

*Ronmbia* h (Coimbra, S<sup>a</sup> Clara, un specimen seul) = *R. Columnae* P.M. - Cette espèce est remarquable par ses fleurs très-petites ses styles très-courts etc.

+ Romulea g. (Lerra da Estrella 5/79 leg. Fon-  
ruca) = R. Anthocodium S. M. var

Romulea c. (Zombaria 2/81 Dr. J. Henriques)  
= R. Anthocodium S. M. pulcherrima!

" Romulea e. (Porto leg Johnston 2/81) = R. Cla-  
siana Lge. certe.

Romulea a. (Zombaria 2/81 Dr. J. Henriques); b.  
(ibidem 2/81 Moller); d. Porto (2/81 Johnston) et  
f. (Cabaceiros de Basto 4/79 leg M. Henriques)  
= R. purpurascens Willk. saltem ex parte,  
non Tenore! -

Parlatore dit du R. purpurascens Ten. "R.....  
" filamentis a basi ad medium p. lobulis [presque  
" glabris chez votre plante], anthera brevioribus  
" [un peu plus longues ch. v. p.], pedicello stamini-  
" bus breviora [bien plus longue ch. v. p.].....  
" pappi folialis superiorem margine anguste  
" hyalino-membranaceo...." [presque toute hya-  
" line]. - Aucun doute de la difference  
de ces deux especes! - Par le couleur du  
perigon votre Romulea purp. serait le  
R. uliginosa Lge, j'ai vu figure de cette



plante (dessinée par M. Willkomm); elle diffère par le style accourci, aussi longue que les étamines, et par la couleur moins vive du perigon, pâle à la gorge (non jaune) et elle croît sur des ~~par~~ prairies humides. — Par le style très long votre plante ressemble au *Rom. purp. g. major* Lze. Il est impossible qu'elle est la même, mais je prendrais cette forme pour espèce distincte. Il serait avantageux d'examiner aussi la capsule de tous ces plantes.

Le *Romulea g.* (Etrusca) diffère du *R. Pullocodium* par la couleur du perigon, la gorge non jaune mais pâle, et par la floraison bien plus tardive. Peut-être la station de la plante est très-élevée?

Votre *Anemone* me paraît maintenant très-affine au *A. trifolia* L., mais je ne suis pas sûr sur les différences car

la littérature est incomplète et se fait  
sur plusieurs caractères importants.  
J'étend encore plus des matériaux de  
*A. trifoliat* vera pour assurer le fait.

J'ai reçu avant 3 à 4 semaines l'  
épreuve des tables exposant trois espèces  
nouvelles du *Ranunculus* (parmi ceux le  
*R. Henriquesii*). Le traité paraîtra ainsi  
bientôt.

Avec mes saluts les plus cordiaux  
et très respectueux

vos très dévoués

Heugyn