


J. Pöltten 29/5 88.

Cher Monsieur,


Je vous suis bien obligé de ce que vous avez dirigé mon attention vers quelques inexactitudes dans mon description du *Sporobolus Molleri*; vous les avez déjà corrigées dans vos dessins très exacts et je vous prie de faire autant pour les phrases de la description en mettant: gluma strobili inferior quinta 5-pla brevior ovati-oblonga, retusa, erosula; et plus en avant: Stigmata brevia perce plumosa stylis eis triplo brevioribus insidentia. La figure C est très bonne quoique un peu trop mince petite, dans mes échantillons aussi les glumes sont moins étalées même pendant la floraison. Si vous pouviez ajouter aussi une

figure représentant la caryopse cela compléterait
vos dessins très caractéristiques.

Après, Monsieur, les sentiments tout dévoués
de votre

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "H. Lacaze". The signature is highly stylized with large, sweeping loops and flourishes, particularly around the 'L' and the end of the name. It is written on a piece of aged, yellowed paper.







Sporobolus Mollvi
~~distichus~~ n. sp.

Annuus, totus glaberrimus. Culmi erecti 12-30 cm alti
filiformes, 2-nodes, nodo inferiori basilari, superiori in $\frac{1}{4}$
inferiori culmi sito, heretico, striati, e nodo imo ramosi.
Paginee laeves hexae, compressae, carinatae, internodiis parum
breviores. Ligula subnulla, ad cilia minutissima retracta.
Laminae lineares, e basi rotundata latiori sensim in acumen
tenuissimum attenuatae, 4-6 cm lg., basi 1.5-2.5 mm. lt., erecto-
patulae, planae, flaccidae, nervo medio tenui, lateralibus
primariis utrinque 2-3, secundariis inter primarios crebris
confertissimis, nullis prominulis percussae. Panícula linearis,
angusta, patens, 8-20 cm lg., 0.8-1.5 cm lt., erecta, laxius-
cula, ramis spirali ordine enascentibus solitariis vel
suboppositis simplicibus vel basi ramulis secundariis pau-
cispiculatis auctis. Spiculae secus ramos conferto-distichae
raris 3-4-stichae, breviter pedicellatae, pedicellis primariis
spicula duplo, secundariis (subadmitt) 4-6plo brevioribus,
lineari-lanceolatae 2 mm lg., flavescens, glabrae. Gluma
sterilis inferior spicula 5plo brevior ovalis obtusissima, hyalina,
enerois, superior spicula $\frac{1}{3}$ lt., hyalina, e basi late ovata
subito in acumen tenuissime cuspidatum ^{scabrum} abiens, uninervis;

Gluma florifera ^{Mexiles} ~~trichopoda~~ ^{superans}, membranacea, late lanceolata, cuspidato-acuminata, sub-uninervis, acumine scabro. Palea glumâ $\frac{1}{3}$ ^x, brevior, ovali-oblonga, obtusa, hyalino-membranacea uninervis, glaberrima. Antherae 3, minutissimae (0.2 mm lg.); ovarium glabrum, stigmata brevissima parce plumulosa, sessilis. Flores cleistogami. Caryopsis obovata, truncata, a latere compressa, nitida, semen non dimittens; embryo caryopsos dimidium subaequans.

Species distinctissima, nulli notae affinior.

Roca Nova Moka (820m), Roca Laudate (770m)
R. S. Maria 1350m.