

Faucher & Cutler Oct 1898

Seu nome

Agradeço a Vm as primeiras  
informações contidas em  
seu cartão de 4 de Setembro  
último, bem como o ofere-  
cimento de Bolétons do  
Jardim Botânico.

Farei por satisfazer as de-  
sijas de Vm no tocante. O que  
os exames por qualquer de  
nos da Universidade em que  
seu passa as férias, um certo  
numero de plantas madeiras.  
Se não tivermos outros officios  
a cumprir e não podermos dedi-  
car exclusivamente os meus  
trabalhos predilectos, brevemente  
poderei offerecer a Vm um her-  
bario, senão completo pelo menos

basilanties de species dit-  
ta.

Cum - Hu - colligen de Ser-  
phularias de Madras a qu-  
me referi in mihis ultimis  
ta. Semper formae aliquae quae  
contrariae, quae in hunc modum  
sunt, hunc tamen quae tamen sunt  
sunt communiter tan plantae u-  
sunt similitudines a una specialis-  
ta de Her- hinc quae existunt al-  
li in herbis de Linn. & Tinnam,  
tamen quae in perenne d'elles sunt  
facile dicitur in quae species in  
ad novas partem - florum de Madras.

En tunc. Cas. Hu. facit, cum  
Julianus in communiter, hinc qu-  
estis mihis. In cas. de qu-  
se de apud de Competencia de  
Qualiter in classificatione a plantis

que euvi.

Um exemplar de Sc. lutea em  
seus de base a descripção de  
Pentham ou Prodrumus paucis-  
sime per different de que euvi,  
a descripção de Lowe nas "Trans-  
actions of the Cambridge Philo-  
sophical Society" ou um melhor a meu  
exemplar, et descripção de Sc. Smithii  
de Prodrumus paucis. um também  
um euvi muito a exemplar de  
Munk's Collection.

Juncto euvi alguns apun-  
tamentos sobre Scrophularias e  
Cladonia, que talvez sirvam a  
botanico que se encarregar de  
estudal-os.

acompanham a Scrophularias as  
seguintes plantas em tanto. sob  
de opporuer - He: Silvatica etc.

Amianum, Epilobium tetragynum,  
var. Langyia, Suncis auritus, Li-  
tus glaucus, v. intricatus, Bromus  
maximus, Stipa bicolor(?), Juncus  
chotodes, Festuca pulchra (specimen  
rarissimum), tus Tyria (n<sup>o</sup> 1, 2 & 3),  
Anis Lycopodium (n<sup>o</sup> 1 & 2), unum Verba-  
cum, unum tu exemplum, e unum  
gramineum de P. de T. Lourenco  
cujus generis e speciem non potuit  
determinare

Quando tu tunc acciderit de  
classificandi e speciem non poterit  
determinare, sed in tu. obsequio de  
me communi e nomen dicitur.  
Quoniam tamen certum e speciem  
de tu esse de Stipa bicolor e  
Juncus chotodes. Est alterum e-  
speciem non nisi speciem unum variat  
de Scirpus Baerthyanus, cum minus non

- de flous?

Os Tyias venados i' d'item e  
 Thu que são plantas natu-  
 ralizadas no Elladim e são  
 reputaes. O Verbascum sub-  
 sume os principis que são o  
Sinuatum, mas heji sem car-  
 tatum nisi autem species. Os  
 sumplaus enviados poriem  
 de Lazaret de Funchal, onde  
 a planta existe he um Can-  
no preparand - u o sementi,  
 - sem que se p' d'ell existam  
 outras especies de mesmo gener.  
 Logo que me utu flous suas  
 perfitas serial-as he - he.

O portador das plantas i'  
 o estudante de faculdade de  
 medicina, chamada,


João em top - Considera

de la cin

et de la cin

Charles Auguste de la cin





Note sur les Scrophularia de  
Madagascar qui composent la col-  
lection.

N° 1. Sc. arguta, Taland.; Benth.  
in DC. X, p. 305. - dans et rochers  
au dessus de 100 m. : Lavault. F. r.  
C. H. Munier legit. C'est la seule  
Scrophularia que l'on trouve aussi à  
Porte-Saint et Desertes.

N° 2. Sc. Scrodonia, L.; Benth. l. c.  
p. 307. Cette plante vient dans  
les lieux frais, dans les forêts, sur  
le bord des courants d'eau, etc. T. c.  
entre 200 et 1800 m. - C. H. Munier  
legit.

N° 3. Sc. .... Lit de la rivière  
de Sainte-Lucie, 200 m. au dessus  
du niveau de la mer. C. H. Munier  
legit. F. r.

N° 4. Sc. Smithii, Hornem. ? Benth.  
l. c. p. 308 (p. part.) ? - lieux humi-  
des, boisés, dans les vallées de l'in-  
térieur : Savada de Pilsain F. r.  
près le tunnel (1200 m., F. r. C. H.  
Munier legit.

et 5. Se. racemosa, Lowe; Benth. l. c.  
p. 308. Liens humides et bords des  
courants d'eau dans le sud de l'île  
de l'entre 100 et 600 m.: lehoupana,  
B. C. et. ell. legit.

et 6. Se. ellenixiana, Ellenix. Catalogo  
das Phanerog. da ellad., p. 16. - Tail-  
le d'un mètre à 2, 50. Tige ramusee,  
quadrang. à 4 angles tranchants; feuil-  
les glabres en dessus, plus ou moins  
pubesc. en dessous, ovales ou ovales  
oblongues, aiguës ou obtuses, cordées  
à la base, doubl. éren. ou dentel. - cie-  
mil., les Supér. tronqués, dent. en  
série; thym subaphyllé, long, étroit;  
cymes pédonculées, à rameaux fleurifères,  
racémiformes, garnis de poils courts,  
subglanduleux; calice à lobes ovales,  
larg. membraneux sur les bords; étamines  
très rudimentaires suborbiculaires. Bords  
des courants d'eau: Terada de S. Roque  
(200 m.). T. r. C. et. ell. legit.

et 7. Se. hirta, Lowe in Transactions  
of the Cambridge Philos. Soc. vol IV, part  
I, p. 21. - Rochers humides dans le

región haise de elhad. : Terada de  
Ribesir Frio, près le tunnel (1200 m.).

T. r. C. v. ell. legit.

N° 8. Sc. longifolia, Benth. l. c. p. 309.

Terres secs des rivières: Ribeira de  
S.ª Lucia (300 m.). C. v. ellum legit.

T. r.

N° 9. Sc. .... (est Sc. longifolia  
var.?). avec la précédente. T. r.

C. v. ell. legit.

N° 10. Sc. .... Bords de courants  
d'eau dans l'intérieur de elhadin; Ter-  
rada de Ribesir Frio entre Ribesir  
Frio et Lanaceiros. C. v. ell. legit. T. r.

N° 11. Sc. johnsoniana, Menz. l. c. p.

17. - Fige glabre quadrang, ramens,  
feuilles subovales-oblongues ou lanceol.-ob-  
longues, cordées et quelquefois déesuprés  
à la base, glabres ou glabrescentes, double-  
dentées; pétioles longs, ceux des feuilles  
sup. poilus et plus ou moins ciliés; thyse  
aphylle oblong-pyramidal; cymes pédon-  
culées, tri-tétrachètes après la maturité des capsu-  
les, à rameaux sup. subracemiformes; calice  
à lobes ovales suborbiculaires; étamine rudi-

montain oval, souvent tronqué au sommet  
-Noches humides dans l'intérieur de l'ladère  
Lerada de l'ouli elledonk. (100 m.) Tr.  
C. et. ellener legit. An Se. aquatica var.?  
N° 12. Se. . . . . Liti des rivières:  
Nibeira de Inferno (100 m.) Tr. - J. ell.  
ellener legit.

N° 13. Se. pallescens, Lowe in litt.; Se.  
elladerensis, ellener. l. c. p. 18. Herissin  
- pubescent; feuilles ovales, cordées à la  
base, double-dentés-crisp.; thyse aphyll-  
le; cymes pedonc. multiflor, tri-tétra-  
clomes après la maturité des capsules, à  
rameaux supérieurs subracomiformes; éta-  
mine rudimentaire ovale, tronqué (é-  
chaneré - Lowe). Liti des rivières: Nibeira  
de Vasco Gil. Tr. J. ell. ellener legit.