



Hochgeehrter Herr Professor!

Besten Dank für ihren Brief,
Abhandlung und Characeen!

Es war ja ihre Meinung, daß ich
diese letzteren behalten könnte?
Wenn Sie mir Characeen für
Bestimmung senden wollten, so will
ich sie natürlich zurücksenden,
da Sie es fordern.

Die nun gesondert habe ich untersucht.
x N. a ist Kit. mucronata Blennier
(N. exilis Br. & Gr.) Die Blätter der oberen
Pflanze sind oft nur einmal
geteilt!

x N. b. N. Traubaceus h.

x - c. Chara foetida A. Br. f. subinermis
elongata crassior (junior, Tabnum).

x - d. Ch. fragilis Desv. f. brevibracteata,
Tenuifolia, viridior (superior longifolia)

- e. Ch. foetida A. Br. f. subhispida

elongata *sublongifolia*, *macroptile*,
macrostelos

f. *Ch. fasciata* cf. Br. f. *pubescens* *macroptile*, *macrostelos* (*longifolia*) *divergens*,
elongata, *parvus* *incrassata*.

g. *Chara fragifera* Daries!

h. *Ch. fasciata* cf. Br. f. *pubinervis*,
macroptile, *pubelongata*, *macrostelos*.

Die Beschreibung Kitzings über
"Ch. trichophylla" ist so schlecht
dass ~~man~~ 20 Jahre - glaube ich -
für seine Beschreibung passen.

Die Bearbeitungen Kitzings
über Characeen gehen nicht wie diese,
nige Brauns vor der Entwickelungs
geschichte aus. Ein Bestimmung d. Chae-
raceen muss man Characeen Frieds in
Monatsbericht d. Berlin. Akad. 1867 und
auch Lohs Kryptogamenflora von Schlesien
(Alga von Kirchner, worin Braun die
Characeen bearbeitet hat) benutzen.

Einige Characeen werden ich Ihnen
früher geschildern. Morgen werde



von hiesigen Museum
ich einige Samen von Früchten von
widwachsenen Pflanzen, in Schlesien
und Norwegen 1880 gesammelt. Unser
Museum haben von Früchten aus Portugal
nur *Ephedra quarrivalvis* und auch die
heute von Coimbra erhalten.

Es ist wohl kein in Portugal, der
sich mit den Süßwasseralgen be-
schäftigt und Thalamekmer in der
von Weterak und mir herausgegebener
Exsiccatausammlung, Alga ag. det.
exs. praeipue Scandinaviae. Für 60
(à 65) gute Ex. von ~~der~~ ^{Preis (3)} nicht vorher
mitgethielten Formen geben vier 1 Tsc.
à 50 nr.; 8 Tsc. sind erforderlich. In
Tsc. & vor 2 aus Spanien; in Tsc. 7 à 8
waren 36 aus Brasilien. Der Preis pr.
Tsc. ist 21,00 Frs.

Von Portugal kennt Brauns nur:

Nic. Brauniensis - Coimbra

Ch. foetida - Flora Lusitan. II 873. Chrys.
(Nr. 700) ohne Namen ist Ch. foetida juc-
venilis longifolia pr. Costa L. Welwitsch

Ch. feddei f. major elongata strictissima
Coimbra misit Prof. Scouler 1883 in
herb. acad. Holmienus.

Aus Spanien hat er die an folgenden
Plattt ausgezeichneten geschenkt. Etwa
die Thandort auf die Balearen - viele
in Willkoms Javas. — Alle diese sind
wohl recht bestimmt und es ist deshalb
nicht nötig sie an mich zu
senden. — Ubrige von Willkom da
gesammelte spanische Characeen
bestimme ich gern.

Mit grösster Hochachtung
ergeben Ihnen
Otto Nordsteltz

Lund 7/4 81.

Characæ hispanice
c manuscrito a. Pracejnic
Ch. hyalina (de) Ag. s. A. Br.



In lacu Albufera 20 Mai 1844. Willkorn 577.
Lamprothamnus alopecuroides L. Br.

J. Montagnei

Mallorca - - - Willkorn n. 182

Chara coronata Liz. J. B. & ~~Cortina~~ Branci-
ni (Gmel.) Br.

In aquis quietis ad Marianeras
Jul. 1841 Reuter ^(Marianeras?) ohne Zweifel in Spanien
in her. Boissier.

(In herb. Shuttleworth ist sie auch von
Reuter mit 1841 aber bei Madrid ange-
geben).

Ch. ornata Wallr.

Mallorca - - - - - 242

Ch. intermedia L. Br.

Aranjuez ad Jarama (?) 15 Sept. 1841
Reuter (herb. Boissier). Eine kaum
beobachtete schwächtige schwer kennt-
liche Form

var. ornata

In lacu Albufera juli. 1852 S. Bourgeau
(cf. Leontini Oscar. Melanch. p. 69) Ex.

von Willkomm (n° 57) maj 1894 nochmals
zu untersuchen.

Ch. Gymnophylla cf. Br.

Eaux stagnantes dans la Sierra de
Alcaras (E. Bourgeau R. d'Espagne 1880
(voir [d. Maen] in herb. Franco-Mallorcas et in
herb. Missier.)

Sierra Prieta, Hispania australis, alt.

5-600 hexap. legit Rambur Entomologus,
C. Missier.

- Spanien Willkomm n° 2 a (30) in herb. Hooker
- In fonte ad urben Malaga Jan. 1883
L. D. J. Lange. (3 formes, alle niedrig)
- Mallorca - - - - - 497

Ch. foetida cf. Br.

kräftige f. divergens, Tassen d'eau
selée à Cartagena April 1880 (E.
Bourgeau pl. d'Espagne)

- f. pubescens in fossis pr. Santander
aoc. 1883 d' J. Lange.
- "In ganz Extremadura gemein"
herb. Cotta (ich weiß nicht von wen ge-
zammelt).



- Madrid von Theobald dene mir mitgetheilt)
- f. longibracteata, elongata, robustior.
Cartagena in Gräben salziger Woffers
(E. Muñozan pl. d' Espagne 1850)
- f. pubhispida brachyphyllae et brevi-
bracteata, brachyphylla crassa
Cartagena (Muñozan pl. d' Espagne
1850 als Ch. hispida).
- f. pubhispida brachyphylla brevibracteata
passim gymnophylla et paracymo-
nophylla, habitu maxime accedens
ad Ch. gymnophyllae, β Fonte
neptunum (Ch. Gymnophylla Desf.)
Sierra de Segura 20 Juli. (Muñoz
an pl. d' Espagne 1850 als Ch.
hispida var.) - Eadem in herib. Briffier.
- f. pubhispida

Minorca - - - - - sub n. 132

Ch. brachystigma A. Br. nkr. 1839

Species dubia c. Bengalum. Ohne
Zweifel dagegen die früher Ch. meridio-
nalis von Extremadura in aquis que-
ts prope Ceiras Vere 1846 d. Welwitschij

Ch. aspera Willd. f. leptophylla virescens
fragiles pubinervis - In fossis salinis
ad urbem Almeriae regni granat.

Dec. 1881 Dr. J. Lange.

*Ch. galioides DC. f. -

Minorca

Hoyermanns

5. Rodriguez

Ch. fragilis Desv. f. brachyphylla Griseb.
Willkomm ^{sub} "gg's a (20) in herb. Hooker,

- f. capillacea (Jacq., Schr.) fontaine. Fort de la
Porra, Minifabini Minorque (Baleares) 1868
L. Rodriguez no 7.

- kleinere und grössere ex v. Hedwigii sich an-
nähernde form. Minorca 22 May 1872. Ro-
diguez n 2 (auch ad capill.) 4, 7, 3.

- f. capillacea (vora nicht vielleicht con-
veniens??) Schr. Matriflora oft stark einge-
krümmt, hier und da mit Knäcken an der unter-
en Stelenknoten Minorca (Tarmada? Jarmada?)

Rodriguez no 1

- In fossis pr. Santander Dec 83 Dr. J. Lange.
- var. tuberculifera A. Br. nsc. 1883!

Schreit! [D'ft vielleicht Ch. fragilis? O. Nordsp?] In Lago "Laguna de Doníños" Galic. bor.
14 Sept. 1883 L. J. Lange.