

Lisboa 29 Decemb. 88

Excmo. Sr. Mariz

Agradeço a resposta com respeito a *Arabis*,
o que me tinha levado a procurar a espécie na
seccão ~~*Eurostictis*~~ foi não somente por ter visto
2 das sépalas gibbosas ou saccadas, como também
por me parecer que a vagem pertencia antes
ao tipo longitudinella venoso striatae de que
ao nervo medio conspicuo saepe valido. Foi esta
a ^{razão} differença das outras nervuras — Comtudo
conforme plenamente com a authorizada opinião
de V. Ex.^{ca} que tendo estudado todas as espécies do
grupo pude mais bem apreciar o valor
relativo d'estas differencias.

Se não for verdadeiramente abusar
da sua benevolencia tomara a liberdade
de submetter-lhe mais uma duvida — a
pagina aqui incluída — que parece appropi-
ada — e da *S. stricta* Fries com a differença
que as folhas são muito mais compridas do
que diz a descripção do *Grenier & Godron*. Não
é individual pois tenho muito exemplares.
Agradeço e peço desculpa. S. J. Aveiras

Tabery seja variedade da *S. Reuteri* Lindl. ? ou outra da *S. stricta* Fries, mas
não a *S. stricta* nem tem as folhas ovadas,
mas é simplesmente mucronada.

