

Mont
Meu caro Aug.º



Pelo-me o favor de, quando tiver occasião, verificar nos seus herbarios o seguinte caso e dizer-me as conclusões a que chegou.

Quando eu estudei as Tridaceas portuguezas referi ao T. Fontanesii Jord. uns exemplares do Alto Alentejo, entre os quaes a espec. n.º 1358 da Soc. Brot. (colhido pelo Mollet). O Battandier enviou-me por essa occasião alguns exemplares argelinos, mas posteriormente enviou-me outros, e hoje é para mim fóra de duvida que as plantas portuguezas não se podem incluir n'essa especie -

Serão ellas umes fórma apenas do T. Tiphium? Procurando estudar melhor a questião parece-me que tem certos caracteres do T. serotina Wk,

como são principal^{te} os ovarios int^o
salientes das espáthas, a dureza do
caule, meduloso e não óco, e a
floração relativam^{te} tardia (Tunho).

Peço-lhe por isso o favor de
comparar esse novo exemplar com
o exemplar do T. serotina do
herbario Willkomm, e de me
dizer se julga ou não possível
esta aproximação — Na forma
dos segmentos do periantho parece
haver discordancia —

Tenho no herb. da Polytechnica
um exemplar colhido em Portugal
pelo R. da Cunha, no mesmo mez,
exemplar 2-floro ou 3-floro, em

que as flores, são ainda mto mais
salientes das epothas, pois não
só ficam de fóra os ovarios como
uma parte consi deravel dos
pedunculos.

Desculpe esta macada, e creia
me sempre

Seu V.º Aug.º e Obj.º

23-III-911

Antonio L. Pra Continha

