

6


Yvernes le 23 Février 1894.



Cher Monsieur Henriques,

Je vous prie de m'excuser d'être resté
si long temps sans vous répondre : j'ai
été longtemps et gravement malade ;
quand j'ai reçu nos deux cartes, j'étais en
lit et incapable de me lancer à aucun
travail. Depuis peu de temps, seulement,
je commence à travailler quelque peu, et
après divers petits travaux très urgents, je me
suis empressé de faire les 2 Descriptions
Demandées, que je vous envoie ci-joint.

Recevez, Cher Monsieur Henriques, les
bien affectueuses salutations de
Votre tout dévoué

A large, flowing cursive signature in black ink, which appears to read "Dr. Capuron".

Dissotis Lizenandi Cogn. sp. nov. rami setis longisentis patulis vel subreflexis inaequalibus inferne incrassatis et hirsutis dense armatis; folia brevissime petiolatis, ovatis, acutis, basi distincte cordatis, margine ^{5-nervis,} dentibus, supra subsparce longaque bullata-setosis, subtus ad nervos setis tibi incrassatis et hirsutis densimacula armatis caeteris minime forcatis et dense longaque sericeo-villosis; paniculis laxis, paucifloris, bracteis subnulis; floribus 5-morib; breviter-pedicellatis; calycis tube setis patulis brevissentis basi incrassatis et pectinatis densimacula hirsuta, lobis caducis, trianguli-linearibus, acutis, tubo paulo brevioribus.

Rami gracieles, absente tetragoni. Pitholis longisentibus denseque hirsutis, ~~3~~ 3-5 mm. longis. Folia patula, rigida, 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$ em. longa, 2-2 $\frac{1}{2}$ em. longa. Paniculae 6-7 em. longae; pedicelli brevissime hirsutti, 2-4 mm. longi. Calycis tubis anguste campanulatis, basi subrotundatis, 9-10 mm. longis; lobi vix hirsutti, 6-7 mm. longi. Petala purpurea, anguste obovata, apice, leviter rotusa, margine brevissime ciliata, 2 em. longa. Anthorum subrectae vel leviter arcuatae, articulo unde undulatae; majoris 11-12 mm. longae, connectivo infra lobulos 14-15 mm. longo producto, basi minime bicolorato; minoris 9-10 mm. longae, connectivo infra lobulos 4-6 mm. longo producto. Stylus filiformis, 2 $\frac{1}{2}$ em. longus.

Cette espèce fait se place dans le voisinage des *D. Cannellana* Cogn. et *D. Chillonii* Cogn.; mais alors elle ne ressemble guère à ces dernières, et il est facile de l'en distinguer en comparant la diagnose ci-dessus avec celle des deux espèces citées, que nous avons prodromées dans *D. Monge* Phaner.

VII. p. 373.



Amphibblemma acante Cogn. sp. nov. caule nullo; foliis solitariis vel binis, longe petiolatis, late ovatis, acutisensulis, basi profunde emarginato cordatis, margine remotissimè ~~emarginato~~ dentatulatis, utrinque brevissimè sparsaque setulosis; petiolis pubescensque subsparsae breviterque retrorsim setulosis; calyce longissimè et dense setoso, lobis triangulare-subulatis, tubo parvo brevioribus; petalis anguste oboratis, non ciliatis.

Petiolus robinsonius, circiter 19 cm. longus. Folia tenuiter membranacea, laete viridia, sub-g-norria, 11 cm. longa, 9-10 cm. lata. Cymæ bifidae, subcongestæ, paucifloræ, floribus subsessilis; pedunculus communis satis gracilis, 6-7 cm. longus, infra medium minime bracteolatus; rami divergentes; pedicelli dense hirtelli, 2-3 mm. longi. Calyxis tubus obconicus, 3 mm. longus; lobii leviter flexuosi, 2-2½ mm. longi. Petala ut videtur pallide rosea fore alba, 6 mm. longa. Anthæe anguste oblongæ, rectæ, apice subtruncatæ, majora ½ mm. minoræ $\frac{2}{3}$ mm. longæ.

Par ses fleurs très petites et ses anthères extrêmement ~~courtes~~ courtes, cette espèce a quelques rapports avec l'*A. molle* Hook.f.; mais elle se distingue nettement de ce dernier par ses feuilles beaucoup moins velues et profondément échancrees à la base. C'est l'ailleur la seule des sept espèces qui composent actuellement le genre *Amphiblemma*, qui soit privée de tige et qui ne parte qu'une ou deux feuilles radicales.

