

JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS

PUBLICADO

PELO


Dr. F. Gomes Teixeira

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo Professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.



VOL. XII—N.^o 1

COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1894



JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS

PUBLICADO


PELO

DR. F. GOMES TEIXEIRA

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo Professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.

VOLUME XII

COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1894



BIOGRAPHIA DO DR. RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA PINTO (*)

POR

ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA

No dia 14 de setembro do corrente anno falleceu em Penafiel, em casa de sua filha, a ex.^{mais} sr.^a D. Maria Magdalena de Mamedo Sousa Pinto, este distinctissimo lente jubilado na facultade de Mathematica, o unico dos nossos professores da Universidade, a quem a morte havia ate agora poupadu.

A similitudão da numerosa e illustrada familia dos Navarros, que deu seis doutores para as diferentes facultades academicas, a familia Sousa Pinto tinha em Mathematica o sabio astronomo e analysta que pranteamos, outro irmão mais velho, Basilio Alberto de Sousa Pinto, doutor em Leis, lente de Direito, Reitor da Universidade e depois visconde de S. Jeronymo, e um terceiro, Joaquim de Sancta Clara Sousa Pinto, que foi lente de Chimica na Academia Polytechnica do Porto.

Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto era filho de José de Sousa Ribeiro Pinto, e tinha nascido em Ferreiros de Tendaes, concelho de Sinfães, districto de Vizeu, a 24 de janeiro de 1811. Vindo para Coimbra, e feitos os preparatorios, matriculou-se na facultade no anno de 1825, n'ella concluiu com brilho o seu curso em 1830, e a 13 de julho de 1836 recebeu o gráu de doutor, sendo convidado pelo decreto de 1 de setembro d'esse

(*) Extrahida do *Instituto de Coimbra*, 1893.

anno, que o declarou opositor, a reger cadeira, e concorrendo com outros collegas para a resolução de uma das diversas crises, por que passou aquella corporação academica. Em portaria de 22 de maio de 1837 foi chamado para assistir aos actos.

Pelas promoções da Universidade coube-lhe uma das cadeiras de Astronomia. Nessa sciencia produziu o estudo admiravel intitulado — *Calculo das ephemерides* — onde examinou e discutiu as formulas, que desde o fundador do Observatorio tinham passado sem demonstração de uns para outros calculadores, sendo muito duvidoso se algumas se encontravam exactas. Este excelente livro mereceu os mais justos aplausos das pessoas competentes, e até na camara dos deputados o lente, que fôra da faculdade, Guilherme José Antonio Dias Pegado, lhe teceu rasgados elogios, chamando ao auctor um dos primeiros mathematicos de Portugal.

Já antes, suprindo a deficiencia do compendio de Besout, que não continha os necessarios subsidios para se poderem entender as obras de Poisson e Laplace, adoptadas nos últimos annos da faculdade, a congregação o encarregara conjunctamente com o seu collega, Francisco de Castro Freire, da traducção do *Curso completo de mathematicas puras*, de L. B. Francoeur, que era, n'essa epocha, incontestavel melhoramento para o ensino. Os traductores desempenharam-se com esmero da incumbencia, introduzindo bastantes materiaes, que não tinham sido tractadas pelo auctor, de que resultou na segunda e terceira edição, que aperfeiçoaram cada vez mais, o livro antes parecer trabalho novo, que traducção de original francez. Durante algum tempo foi adoptado na Eschola Polytechnica de Lisboa e na Academia Polytechnica do Porto.

À pag. 76 do n.^o 1 do *Instituto*, de julho de 1890, escrevemos o seguinte, em apontamentos para a biographia de José Monteiro da Rocha:

«A faculdade de Mathematica pertenciam quatro cadeiras de conegos magistraes: uma na sé de Leiria; outra na de Miranda, transferida depois para Bragança; a terceira e a quarta nas sés de Elvas e Portalegre. As duas primeiras conservaram-se para os lentes, que fossem ecclesiasticos; as duas ultimas foram transformadas, pela bulla *scientiarum omnium* do papa Clemente XIV, em commendas da ordem de Christo, e destinadas aos lentes seculares.

«José Monteiro da Rocha obteve em 1774 provimento n'uma d'ellas, na cadeira de conego magistral da sé de Leiria, como professor ecclesiastico. Foi a maior das recompensas dos seus valiosos serviços por occasião da reforma da Universidade, e dos seus assíduos trabalhos na organização da facultade de Mathematica, a cada passo lembrados ao grande ministro pelo animo generoso de D. Francisco de Lemos. E quando este foi pela segunda vez nomeado reitor reformador da Universidade, como premio de serviços e prova de estima, conseguiu-lhe a commenda de Christo e a carta do conselho do principe regente».

Os premios recebidos pelo fundador do Observatorio Astronomico da Universidade foram conferidos tambem ao professor, que mais tempo esteve dirigindo aquelle estabelecimento, e que tanto se distinguiu nas investigação das formulas do calculo das ephemерides, e nas observações alli feitas com os poucos e fracos instrumentos fornecidos pelos governos. Assim, ao dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto foi dada a commenda da ordem de Christo e a carta do conselho de Sua Majestade; e coube a honra de ser nomeado socio da Academia real das sciencias de Lisboa, socio honorario do Instituto de Coimbra, e membro de outros institutos e sociedades scientificas estrangeiras. Não solicitou directa nem indirectamente estas distincções, que vieram ao encontro do seu grande merecimento.

Outra publicação, com que enriqueceu as sciencias mathematicas foi a que impropriamente se denominou — *Complementos de geometria descriptiva* — e que é um livro de alta analyse, tractando por esse modo alguns problemas resolvidos na geometria descriptiva de Fourcy, que era em 1854 o compendio adoptado na facultade para o ensino d'esta sciencia.

Como professor da cadeira de Astronomia fez tambem o valioso serviço de compôr o livro de ensino, que se tornava indispensavel para substituir a volumosa obra de Biot, que por muitos annos serviu ao estudo na Universidade. Os *Elementos de Astronomia*, que na parte estudada encerram a ultima palavra da sciencia, são apenas dois volumes de 4.^º, de 218 e 126 paginas, oscriptos com o rigor que distingue todos os trabalhos mathematicos do auctor, e sufficientes por em si conterem as matérias do programma.

Falámos da exactidão e do rigor, que havia nas publicações

de Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto; mas se n'ellas em consequencia d'essa virtude podia acaso transparecer alguma sombra de obscuridade, a assimilação com que abrangia todos os assuntos, e a clareza com que os desenvolvia, tornaram-no o primeiro lente da faculdade, e o mais eloquente expositor das doutrinas mathematicas. Nunca deixou de ser entendido por todos aquelles a quem ensinava ou a quem se dirigia, e de se lhes impôr pelo brilho da sua palavra inspirada.

As obras de Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto foram publicadas nas seguintes datas:

Curso completo de mathematicas puras, por L. B. Francoeur, traduzido do francez, em collaboração com o dr. Francisco de Castro Freire. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1838 e 1839, 2 vol. em 8.^o gr. *Segunda edição mais correcta e consideravelmente augmentada*. Ibi, 1853-1858, 8.^o gr., 4 vol. *Geometria analytica* de L. B. Francoeur, 3.^a ed. Ibi, 1871. *Algebra Superior*, do mesmo auctor, 3.^a ed. Ibi, 1871. *Calculo differencial e calculo integral*, do mesmo auctor, 3.^a ed. Ibi, 1878.

Additamento ás Notas do calculo differencial e integral de Francoeur. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1845, 4.^o, de 48 pag. quasi todo introduzido nos logares respectivos da 2.^a edição do *Curso completo de mathematicas puras* acima referido.

Calculo das ephemerides astronomicas de Coimbra. Ibi, na mesma Imprensa, 1849, 4.^o, de 182 pag.

Das refracções atmosphericas. Lisboa, na Imprensa Nacional, 1850, 8.^o gr., de 24 pag. com uma estampa. D'aqui sahiu a seguinte:

Memoria sobre as refracções atmosphericas apresentada á Academia real das sciencias. Foi em sessão de 5 de julho de 1854 mandada imprimir na Nova serie das Memorias da Academia.

Complementos da Geometria descriptiva de Fourcy. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1853, 4.^o, de 100 pag.

Apontamentos de trigonometria spherica. Ibi, na mesma Imprensa, 1854, 4.^o gr., de 8 pag. No *Instituto*, vol. III, pag. 130 a 133; e 185 a 188.

Apontamentos de optica. Ibi, 1856, 4.^o gr., de 18 pag. com estampas. No *Instituto*, vol. III, pag. 264 a 267; vol. IV, pag. 25 a 28; 72 a 75; 167 e 168; 179 e 180; 203.

Elementos de astronomia. Primeira parte. Ibi, 1858. *Suplemento* com estampas. Ibi, 1859, 4.^o, de 218 pag. Segunda edição, tom. I, 4.^o, de 416 pag. com *um supplemento e additamentos* á primeira parte, 54 pag. e sete estampas. Ibi, 1872.

Elementos de astronomia. Segunda parte. Ibi, 1860, 4.^o, de 124 pag. e mais 2 innumeradas e uma estampa. Segunda edição, tom. II, 4.^o, de 226 pag. e doze estampas. Ibi, 1872.

Eclipse solar de 18 de julho de 1860. Memoria apresentada ao excellentissimo ministro do reino pela commissão portugueza. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1860, 4.^o, de 39 pag. com 4 mappas em que vem o resultado das observações no cabo de Oropesa. No *Instituto*, vol. x, secção official de 1861, pag. 57 a 66.

Relatorio sobre a visita dos observatorios de Madrid, Paris, Bruxellas e Greenwich, apresentado ao ministro do reino em 9 de novembro de 1860, 4.^o, de 30 pag. e mais uma innumerada no fim. No *Instituto*, vol. x, secção official de 1861, pag. 67 a 77.

Elementos de Geometria de L. B. Francoeur, traduzidos pelos lentes da faculdade de Mathematica, Francisco de Castro Freire e Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto. Coimbra, 1856. Depois de varios acrescentamentos foram publicados com o titulo de *Geometria elementar theorica e practica*, por Francisco de Castro Freire e Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, lentes da faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra. Coimbra na Imprensa da Universidade, 1859. Novas edições em 1863 e 1866.

Additamento ao calculo dos eclipses. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1868, folio, de 11 pag.

Breves reflexões sobre as parallaxes das estrellas, e sobre os instrumentos do observatorio de Coimbra. No *Instituto*, vol. I, pag. 45 e 46.

Cometa de agosto de 1862. No *Instituto*, vol. XI, pag. 120.

Ecclipse do sol em 15 de marzo de 1858. No *Instituto*, vol. VII, pag. 22 e 23.

Nota sobre a parallaxe equatorial do sol, e additamento a esta nota. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1869, folio, de 4 pag.

Noticia sobre um cometa que se observou em abril de 1854. No *Instituto*, vol. III, pag. 3, 4 e 5.

Observação do cometa de 1861. No *Instituto*, vol. x, pag. 204 a 206.

Observações feitas em 1858 no observatorio de Coimbra para a determinação da sua longitude. No *Instituto*, vol. vi, pag. 215, 216, 240, 253 e 273; no vol. vii, pag. 60, 84, 108, 168, 204 e 268; no vol. viii, pag. 32 e 212; e vol. ix, pag. 128 e 160.

Posição geographica do observatorio da Universidade de Coimbra. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1867. No *Instituto*, vol. ix, pag. 24 e 25.

Taboas para a correcção das passagens meridianas no observatorio astronomico da Universidade e intervallos equatoriaes dos fios do reticulo do circular meridiano de Coimbra. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1867 e 1868.

Uso do instrumento de passagens pelo primeiro vertical com as taboas dos angulos horarios e das distancias zenithaes nas passagens pelo primeiro vertical do observatorio astronomico da Universidade de Coimbra. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1870 e 1871.

Nota sobre a carta de M. Wils Brown na qual se indica um novo metodo para o calculo das distancias lunares observadas no mar. No *Instituto*, vol. v, pag. 10 e 11. Mostra que a formula é a mesma que deu o lente de Mathematica, Francisco de Paula Travassos, no *Methodo de reducção* publicado em Coimbra no anno de 1805.

Collimação do polo de um circular mural de Fortin. No *Instituto*, vol. i, pag. 198.

Bibliographia. Taboas da lua reduzidas das de Burchhardt pelo sr. Florencio Mago Barreto Feio. No *Instituto*, vol. i, pag. 258.

Tratado elementar de Mathematicas, por D. Aciulo F. Vallin e Buotillo, cathedratico en la Universidad de Madrid. No *Instituto*, vol. ii, pag. 166, 167, 186 e 187.

Bibliographia. Taboas auxiliares para o calculo das ephemerides astronomicas do observatorio da Universidade de Coimbra, pelo sr. Jacome Luiz Sarmento. No *Instituto*, vol. ii, pag. 296.

Noticia dos pequenos planetas descobertos em 1855 e 1856. No *Instituto*, vol. iii, pag. 291 e 292; e vol. v, pag. 128 e 129.

Influencia da lua nos terramotos. No *Instituto*, vol. iii, pag. 116, 117, 118, 195 e 196.

Programma da cadeira de astronomia. No *Instituto*, vol. **III**, pag. 26 e 27.

Duas consultas de 27 de abril de 1857: a primeira pedindo a mudança do Observatorio para o sitio do Castello, onde para este fim se fizeram n'outro tempo solidos alicerces; a segunda a criação de uma nova cadeira na faculdade. No *Instituto*, vol. **VI**, pag. 37 e 38.

O dia 18 de julho de 1861. No *Instituto*, vol. **IX**, pag. 130.

Estudos instrumentaes no observatorio astronomico da Universidade de Coimbra. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1887, folio, de 86 pag. e mais uma innumerada e uma estampa.

Continuação dos estudos instrumentaes. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1890, folio, de 21 pag. com uma estampa.

Observações feitas no primeiro vertical do observatorio astronomico da Universidade com o instrumento de passagem transportavel de Repsold. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1882, folio, de XII-88 pag. e mais tres innumeradas.

Demonstração elementar das leis do movimento uniformemente variado. No *Instituto*, vol. **XVII**, pag. 57 a 59, e 248.

Taboa de interpolação para o meio dia do intervallo. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1874, folio, de 2 pag.

Suplemento ao calculo das ephemerides. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1887, 4.^o, de 8 pag.

Observação do cometa de 1881. No *Instituto*, vol. **XXIX**, pag. 111 e 112.

Adopção de um meridiano universal. Sessão do Instituto de 13 de janeiro de 1883. No *Instituto*, vol. **XXX**, pag. 304 a 306.

Taboas de $\tau = \frac{g}{h} \operatorname{sen} (H + \gamma \tau)$ para o calculo dos eclipses e

occultações. São 30 paginas publicadas em 1877, as 5 primeiras em portuguez e em franeez, explicando a formação de umas taboas compostas: uma pelo dr. Agostinho José Pinto de Almeida; outra pelo dr. Rufino Guerra Osorio, ambos lentes da faculdade de Mathematica; a primeira ainda inedita, e a segunda publicada na ephemeride para 1844.

Taboa dos factores L, A, C para a correcção das passagens meridianas no Observatorio astronomico de Coimbra. Instituto de agosto de 1892, pag. 129 e 130.

Noticia sobre LE VERRIER. No *Jornal de sciencias matematicas e astronomicas*, 1 vol., 1877, pag. 86 a 89.

Apontamentos de mathematica. Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1893, 8.º, de 21 pag.

Mais de meio seculo de constantes labores, durante o qual foram publicados tão esplendidos estudos, como os que deixamos aqui brevemente descriptos, tornou conhecido e apreciado dentro e fóra do paiz o abalisado geometra e insigne astronomo, que a Universidade e o Observatorio acabam de perder.

Aos cultores da sciencia mathematica, aos alumnos e professores da faculdade, e á desolada familia do nobre extinto, enviamos sentidos e cordeaes pesames.

BIBLIOGRAPHIA

G. Peano : Lezioni di Analisi infinitesimale, Torino, 1893.

Consta esta obra de dois volumes, que contêm o curso professoado pelo auctor na Universidade de Turin. Os assumptos considerados são os que ordinariamente se encontram em obras d'esta natureza e são expostos com clareza, simplicidade e com aquelle rigor que o illustre geometra costuma empregar em todos os seus trabalhos. Para simplificar e dar maior precisão á linguagem, emprega o sr. Peano alguns signaes da *Logica*, como tem feito em muitos dos seus trabalhos anteriores. Faz tambem, no segundo volume, um grande uso de algumas das operações sobre segmentos da recta introduzidos por Hamilton, Grassmann, Möbius, etc., e que tanta importancia vão adquirindo na actualidade ; esta circunstancia fazendo com que o modo de expôr as doutrinas consideradas n'este volume diffira consideravelmente do modo como são expostas nos manuaes de calculo mais espalhados, dá a esta parte da obra um interesse consideravel. Além d'isso, em muitos pontos, taes como na theoria das funcções interpolares, na doutrina relativa ao calculo por approximação dos integraes definidos, na theoria das equações differenciaes, etc., o auctor expõe o resultado das suas proprias indagações.

Vamos indicar resumidamente o objecto de cada capitulo.

No capitulo 1.^o são estudadas as propriedades fundamentaes das derivadas das funcções, são procuradas as derivadas das funcções elementares e faz-se applicação das doutrinas estudadas á theoria das tangentes ás curvas planas.

No capitulo 2.^o trata o auctor do desenvolvimento das funcções em serie ordenada segundo as potencias crescentes da variavel, das formulas de interpolação, da determinação dos verdadeiros valores das funcções indeterminadas n'un certo ponto. Faz depois applicação dos principios estudados n'este capitulo á theoria dos

pontos de inflexão das curvas planas, á theoria das asymptotas e á theoria dos contactos.

No capitulo 3.^o é estudada a noção de integral, tanto definido como indefinido, e é feita depois applicação da doutrina exposta á theoria das áreas, á theoria da rectificação das curvas e á theoria dos volumes.

No capitulo 4.^o são apresentados os methodos geraes de integração; em seguida são integradas as funcções rationaes e as funcções irrationaes e transcendentess que é uso considerar em obras d'esta natureza.

No capitulo 5.^o são estudados os principios geraes da theoria das series e dos productos infinitos e os methodos de integração por series.

Com o capitulo 5.^o termina o primeiro volume da obra. O volume 2.^o consta de quatro capitulos. No primeiro são estudados os numeros complexos dependentes de duas ou mais unidades, a representação d'aqueles por vectores, as series compostas de termos complexos, etc. No capitulo seguinte é extendida a formula de Taylor ao caso dos numeros complexos e faz-se applicação da theoria dos numeros complexos a varias questões de geometria relativas ao plano osculador, á curvatura das linhas, etc. Termina-o a theoria da integração no caso dos numeros complexos.

O capitulo 6.^o é consagrado ao estudo das funcções de muitas variaveis. Ahi são estudadas as propriedades das derivadas parciaes e ahi são consideradas algumas questões de Analyse e de Geometria que dependem d'estas derivadas. N'este capitulo são considerados tambem os integraes multiplos.

No capitulo 9.^o é finalmente estudada a integração das equações diferenciaes nos casos mais elementares.

Cada um dos assumptos considerados n'esta obra excellente é seguido por numerosos e bem escolhidos exercicios, para que os alumnos se habituem a manejar com facilidade os methodos estudados.

L'intermédiaire des mathématiciens, Paris, G. Villars.

Com este titulo vêm de fundar os srs. Laisant e Lemoine um

novo jornal, que tem um programma completamente diferente dos outros jornaes mathemáticos existentes e que deve ser da maior utilidade para os geometras. O sim d'este jornal é pôr em relação dois mathematicos, cada vez que um necessita de uma informação que o outro lhe possa dar. Para isso, cada numero consta de duas secções, a primeira das quaes contém as questões que são dirigidas aos directores do jornal pedindo informações sobre os assumptos a respeito dos quaes os autores desejam ser informados; a segunda contém as respostas enviadas pelos geometras que estejam no caso de dar cada informação pedida. Nos quatro numeros que até hoje foram publicados vêm questões e respostas assignadas por muitos dos maiores geometras da actualidade.

M. d'Ocagne : Sur la détermination géométrique du point le plus probable donné par un système de droites non convergentes (Journal de l'École Polytechnique de Paris, 1893).

O objecto d'esta memoria importante é a resolução do seguinte problema: Supondo que um ponto é determinado pelo encontro de muitas rectas cujo traçado depende de elementos dados por observações, não é possível fixar com exactidão a posição d'este ponto por causa dos erros das observações; determinar porém a sua posição mais provável.

Ch. de la Vallée Poussin : Mémoire sur l'intégration des équations différentielles (Mémoires de l'Académie des Sciences de Belgique, 1893).

N'esta bella e importante memoria o autor extende o theorema fundamental de Calculo integral, relativo á existencia de integral das equações diferenciaes, a casos em que nas equações diferenciaes figuram funções discontinuas. O metodo empregado para

esse fim é uma generalisação do methodo empregado por Cauchy no caso das funcções continuas.

P. Pizzetti: Gli odierni studi sulla figura della Terra, Genova, 1893.

Contém este opusculo um discurso muito interessante, pronunciado pelo sr. Pizzetti na Universidade de Genova, na inauguração solemne do anno academico de 1892 a 1893. O objecto d'este discurso é, como o seu titulo indica, o que actualmente se sabe a respeito do problema que tem por fim determinar a figura da terra.

G. B. Guccia: Richerche sui sistemi lineari di curve algebriche piane dotati di singularità ordinarie (Rendiconti del Circolo mat. di Palermo, 1893).

Não é possivel dar em pequeno espaço noticia de todas as proposições importantes que se encontram n'esta memoria. Limitar-nos-hemos por isso a dizer que o auctor se baseia principalmente nos trabalhos de Cremona e Jonquières e que, depois de algumas definições e explicações preliminares, estuda os systemas lineares k vezes infinitos determinados por $k+1$ curvas dadas, os systemas lineares k vezes infinitos com uma singularidade ordinaria, o jacobiano de tres curvas dadas, o de uma curva e de um feixe e o de uma rede, etc.

J. A. Serrasqueiro: Tratado elementar de Cosmographia, Coimbra, 1893.

Contém este volume a parte da Cosmographia exigida pelos

programmas officiaes para o ensino d'esta sciencia nos Lyceus. Está dividido em cinco partes em que são respectivamente estudadas as estrelas, a terra, o sol, a luna e finalmente os planetas e os cometos. Sem sair do ponto de vista elementar, o auctor apresenta a respeito da constituição physica, posições relativas e movimentos d'estes corpos, bastantes informações.

S. Pincherle : Sull' interpolazione (Memorie della R. Accademia di Bologna, 1893).

N'esta memoria occupa-se o sr. Pincherle do problema que consiste em determinar uma função por meio do conhecimento dos valores que ella toma para um dado sistema de valores da variavel. Supondo que A representa a collecção de valores dados á variavel independente, que A' representa a collecção derivada d'esta, segundo a nomenclatura de Cantor, examina o sabio geometra italiano as questões seguintes :

1.^o Pode-se construir, por meio dos valores dados, uma expressão arithmetica que tome os valores dados nos pontos da collecção $A + A'$?

2.^o Quaes são as condições para que exista uma função analytica, regular nos pontos de A e que tome os valores dados nos pontos de $A + A'$?

— *Sur la génération de systèmes récurrents au moyen d'une équation linéaire différentielle (Acta mathematica, 1893).*

Entre outros assumptos, o auctor trata n'esta memoria do desenvolvimento das funcções em serie ordenada segundo as funcções de um sistema recorrente de que se conhece a escala de relação.

Annuaire pour l'an 1894 publié par le Bureau des longitudes, Paris, G. Villars.

Contém este *Annuario*, além das informações que é uso conter

esta publicação periodica, as noticias seguintes : *A luz e a electricidade segundo Maxwell e Hertz*, por Poincaré ; *A origem e o emprego da bussola maritima chamada hoje compasso*, por Fleuriáis ; *Quatro dias de observação no vertice de Monte-Branco*, por Janssen ; *Discursos pronunciados nos funeraes do Almirante Páris*, por Faye, Bouquet de la Grye e Fleuriáis ; *Discursos pronunciados na inauguração da estatua de Arago*, por Tisserand, Cornu e Mouchez.

L. C. Almeida : Primeiras noções sobre o calculo das quantidades geometricas, Coimbra, 1893.

Na pagina 5 do tomo xi d'este jornal deu-se noticia de um opusculo do mesmo auctor com o mesmo titulo. O presente opusculo é a continuação do anterior e contém a doutrina das series dc termos imaginarios e os primeiros principios da theoria das funcções exponenciaes, logarithmicas e circulares de uma variavel imaginaria.

J. Bruno de Cabedo : Principios fundamentaes da theoria dos numeros limites, Coimbra, 1893.

Partindo da definição de numero irracional adoptada por Heine e Cantor, o auctor expõe n'este opusculo, com todo o rigor e clareza, a theoria d'estes numeros.

Gino Loria : Della varia fortuna di Euclide in relazione com i problemi dell'insegnamento geometrico elementare, Roma, 1893.

N'este bello opusculo faz o auctor a historia do papel que os

Elementos de Euclides têm representado no ensino da Geometria elementar. Este estudo leva-o a dar informações de grande interesse sobre o modo como na actualidade é ensinada a Geometria nos diversos paizes e sobre a natureza e qualidades dos livros mais empregados para esse fim.

J. Pedro Teixeira : Sur les nombres bernoulliens (Jornal da Academia das Sciencias de Lisboa, 1893).

N'este artigo o auctor apresenta uma expressão dos numeros de Bernoulli por meio de um determinante.

L. Grillières : Étude des modifications apportées par la rotation diurne de la terre aux lois de l'équilibre et du mouvement des corps pesantes, Paris, Nony, 1893.

O auctor estuda primeiramente a influencia da rotação diurna sobre a direcção do fio de prumo e sobre a intensidade da atracção terrestre, e em seguida trata, por meio da consideração dos movimentos absolutos, a questão dos desvios que soffrem os corpos pesados durante a sua queda.

Ch. de la Vallée Poussin : Sur les applications de la notion de convergence uniforme dans la théorie des fonctions d'une variable complexe (Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 1893).

- M. d'Ocagne : Sur la construction des cubiques cuspidales par points et tangentes (Nouvelles Annales de Mathématiques, t. XI).*
- *Sur une classe de transformations dans le triangle etc. (Item, t. XII).*
- *Remarque sur la déformation des surfaces de révolution (Bulletin de la Société mathématique de France, t. XXI).*
- *Sur la sommation d'une certaine classe de séries (Comptes rendus, 1893).*
-

P. Mansion : Sur les principes fondamentaux de la Géométrie, de la Mécanique et de l'Astronomie, Paris, G. Villars, 1893.

R. Guimarães : Sur l'évaluation de certaines aires coniques (Association française pour l'avancement des sciences, 1892).

- M. Lerch : Généralisation du théorème de Frullani (Bulletin de la Société R. des Sciences de Bohême, 1893).*
- *Sur une fonction transcendente (Item).*
- *Sur un point concernant la théorie de la fonction gamma (Item).*
- *Sur deux transcendentes considérées par Legendre (Item).*
- *Sur un théorème de Kronecker (Item).*
-

G. Vivanti : Sulle serie di potenze (Annali di Matematica, 1893).

SUR LES SURFACES RÉGLÉES

NOTE DE

GEMINIANO PIRONDINI

(à Parme)

§ 1

Je rappelle ici quelques formules connues de la théorie des surfaces réglées.

Soient ξ, η, ζ les coordonées d'un point quelconque P d'une ligne Λ (*directrice*); $\cos A, \cos B, \cos G$ les cosinus directeurs d'une droite R (*génératrice*) passant par le point P ; v une portion quelconque de R comptée à partir de P ; i l'inclinaison de R sur Λ ; σ l'arc de Λ ; X, Y, Z les coordonnées d'un point quelconque de la surface réglée lieu des droites R . On a

$$(1) \quad X = \xi + v \cos A, \quad Y = \eta + v \cos B, \quad Z = \zeta + v \cos C$$

$$(2) \quad \cos i = \sum \cos A \cdot \frac{d\zeta}{d\sigma}$$

..

Et si l'on pose

$$(3) \quad M^2 = \Sigma \left(\frac{d \cos A}{d \sigma} \right)^2; \quad N = \Sigma \left(\frac{d \cos A}{d \sigma} \cdot \frac{d \xi}{d \sigma} \right),$$

la plus courte distance $d\Delta$ entre la génératrice (1) et la successive est donnée par l'équation

$$d\Delta = \sqrt{\begin{vmatrix} \frac{d\xi}{d\sigma} & \frac{d\eta}{d\sigma} & \frac{d\zeta}{d\sigma} \\ \cos A & \cos B & \cos C \\ \frac{d \cos A}{d \sigma} & \frac{d \cos B}{d \sigma} & \frac{d \cos C}{d \sigma} \end{vmatrix}} \cdot \frac{d\sigma}{M}$$

Mais, en force des égalités (2) et (3) et des identités

$$\Sigma \cos^2 A = 1, \quad \Sigma \left(\frac{d \zeta}{d \sigma} \right)^2 = 1$$

on déduit

$$\begin{vmatrix} \frac{d\xi}{d\sigma} & \frac{d\eta}{d\sigma} & \frac{d\zeta}{d\sigma} \\ \cos A & \cos B & \cos C \\ \frac{d \cos A}{d \sigma} & \frac{d \cos B}{d \sigma} & \frac{d \cos C}{d \sigma} \end{vmatrix}^2 = \begin{vmatrix} 1 & \cos i & N \\ \cos i & 1 & 0 \\ N & 0 & M \end{vmatrix} - M^2 \sin^2 i - N^2;$$

on a donc

$$d\Delta = \frac{\sqrt{M^2 \sin^2 i - N^2}}{M} d\sigma.$$

Soit r_0 la distance entre le point P de A et le point où la génératrice rectiligne R passant par le point P est coupée par la plus courte distance entre cette génératrice et la successive. En posant

$$a = \begin{vmatrix} \cos B & \cos C \\ \frac{d \cos B}{d \sigma} & \frac{d \cos C}{d \sigma} \end{vmatrix} d\sigma, \quad b = \begin{vmatrix} \cos C & \cos A \\ \frac{d \cos C}{d \sigma} & \frac{d \cos A}{d \sigma} \end{vmatrix} d\sigma$$

$$c = \begin{vmatrix} \cos A & \cos B \\ \frac{d \cos A}{d \sigma} & \frac{d \cos B}{d \sigma} \end{vmatrix} d\sigma,$$

on a

$$v_0 = \begin{vmatrix} \frac{d\xi}{d\sigma} & \cos A + \frac{d \cos A}{d \sigma} d \sigma & a \\ \frac{d\eta}{d\sigma} & \cos B + \frac{d \cos B}{d \sigma} d \sigma & b \\ \frac{d\zeta}{d\sigma} & \cos C + \frac{d \cos C}{d \sigma} d \sigma & c \end{vmatrix} \cdot \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = M^2 \cdot d\sigma^2$$

Si donc on néglige les infiniment petits, on peut écrire

$$(4) \quad v_0 = -\frac{N}{M^2}$$

Il suit que l'équation

$$(5) \quad M^2 \sin^2 i - N^2 = 0$$

exprime que la surface réglée (1) est développable et l'autre équation

$$(6) \quad N = 0$$

exprime que la directrice Λ est la ligne de striction de la surface réglée (1).

Rapportons les points de la surface (1) aux lignes coordonnées $\sigma = \text{const.}$ (génératrices rectilignes) et $v = \text{const.}$; la distance dS entre deux points de la surface infiniment rapprochés est donnée par l'équation

$$(7) \quad dS^2 = (M^2 v^2 + 2 N v + 1) d\sigma^2 + 2 \cos i \cdot d\sigma dv + dv^2.$$

§ 2

À un point quelconque $M(x, y, z)$ d'une ligne L considérons le trièdre trirectangle T formé par la tangente $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, la normale principale $(\cos \lambda, \cos \mu, \cos \nu)$ et la binormale $(\cos l, \cos m, \cos n)$. Soit P un point lié au trièdre T et R une droite passant par P .

Désignons par U, V, W les coordonnées de P , par $\cos a, \cos b, \cos c$ les cosinus directeurs de R par rapport au trièdre T ; et sur la surface réglée Σ , lieu des droites R , prenons pour directrice Λ le lieu des points P . Cela posé, les coordonnées

d'un point quelconque de Σ sont exprimables par les équations

$$\begin{aligned} X = & (x + U \cos \alpha + V \cos \lambda + W \cos l) + \\ & + v (\cos a \cos \alpha + \cos b \cos \lambda + \cos c \cos l), \text{ etc.} \end{aligned}$$

La comparaison entre ces équations et les autres (1) donne

$$\xi = x + U \cos \alpha + V \cos \lambda + W \cos l;$$

$$\cos A = \cos a \cos \alpha + \cos b \cos \lambda + \cos c \cos l, \text{ etc.}$$

Si donc on désigne par s, ρ, r l'arc, le rayon de courbure et le rayon de torsion de L , on a

$$(8) \quad \left\{ \begin{array}{l} M^2 = \left\{ \left(\frac{d \cos a}{ds} - \frac{\cos b}{\rho} \right)^2 + \left(\frac{\cos a}{\rho} + \frac{d \cos b}{ds} + \frac{\cos c}{r} \right)^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + \left(\frac{d \cos c}{ds} - \frac{\cos b}{r} \right)^2 \right\} \left(\frac{ds}{d\sigma} \right)^2 \\ N = \left\{ \left(\frac{d \cos a}{ds} - \frac{\cos b}{\rho} \right) \left(1 + U' - \frac{V}{\rho} \right) + \right. \\ \left. + \left(\frac{\cos a}{\rho} + \frac{d \cos b}{ds} + \frac{\cos c}{r} \right) \left(\frac{U}{\rho} + V' + \frac{W}{r} \right) + \right. \\ \left. \left. + \left(\frac{d \cos c}{ds} - \frac{\cos b}{r} \right) \left(W' - \frac{V}{r} \right) \right\} \left(\frac{ds}{d\sigma} \right)^2 \\ \cos i = \left\{ \left(1 + U' - \frac{V}{\rho} \right) \cos a + \left(\frac{U}{\rho} + V' + \frac{W}{r} \right) \cos b + \right. \\ \left. + \left(W' - \frac{V}{r} \right) \cos c \right\} \frac{ds}{d\sigma} \\ \left(\frac{ds}{d\sigma} \right)^2 = \left(1 + U' - \frac{V}{\rho} \right)^2 + \left(\frac{U}{\rho} + V' + \frac{W}{r} \right)^2 + \left(W' - \frac{V}{r} \right)^2 \end{array} \right.$$

§ 3

Considérons la surface réglée Σ que l'on obtient en déplaçant, parallèlement à sa direction, une des trois droites *tangente*, *normale principale* et *binormale* d'une courbe L , le long des autres. La directrice Δ soit, dans tout cas, le lieu des points où les génératrices de Σ coupent les droites principales de L , suivant lesquelles on fait le déplacement.

I^o) Si l'on fait glisser les tangentes le long des normales principales, on a

$$U = W = 0, \quad a = 0, \quad b = c = \frac{\pi}{2};$$

si donc on a recours aux équations (8), les conditions (5), (6) deviennent

$$\frac{1}{\rho} \cdot \frac{1}{r} V = 0, \quad \frac{1}{\rho} V' = 0.$$

Et puisque la solution $\frac{1}{\rho} = 0$ est à refuser, on voit que la surface Σ est développable lorsque $\frac{1}{r} = 0$ (la ligne L est plane) ou $V = 0$ (Σ est la développable osculatrice de L).

La courbe Δ est la ligne de striction de Σ lorsque $V' = 0$; le déplacement des tangentes le long des normales principales doit donc être constant.

II^o) Si l'on fait glisser les tangentes le long des binormales, on a

$$U = V = 0, \quad a = 0, \quad b = c = \frac{\pi}{2},$$

et les équations (5), (6) deviennent

$$\frac{1}{\rho} \cdot W' = 0, \quad \frac{1}{\rho} \cdot \frac{1}{r} W = 0.$$

La surface Σ est donc développable lorsque le déplacement W est constant.

La courbe Λ est la ligne de striction de Σ lorsque $\frac{1}{r} = 0$ (la ligne L est plane) ou $V = 0$ (Σ est la développable osculatrice de L).

Dans le cas que l'on vient de considérer on a la formule remarquable

$$\cos i = \frac{ds}{d\sigma}.$$

III°) Si l'on fait glisser les normales principales le long des tangentes, on a

$$V = W = 0, \quad a = c = \frac{\pi}{2}, \quad b = 0,$$

et les équations (5) (6) donnent

$$\frac{1}{r} (1 + U') = 0, \quad \frac{1}{\rho} (1 + U') = 0.$$

La première équation a les solutions

$$\frac{1}{r} = 0, \quad 1 + U' = 0.$$

La solution $\frac{1}{r} = 0$ démontre que la ligne L est plane; l'autre $1 + U' = 0$ est une solution de la deuxième équation. La ligne Λ est dans ce cas une développante de L .

IV) Si l'on fait glisser les normales principales le long des binormales, on a

$$U = V = 0, \quad a = c = \frac{\pi}{2}, \quad b = e,$$

et l'on obtient les équations

$$\frac{1}{r} - \frac{W'}{\rho} = 0, \quad \frac{1}{\rho} + \frac{W'}{r} = 0.$$

La surface Σ est donc développable lorsque

$$W = \int \frac{\rho}{r} ds + \text{const.}$$

La courbe Λ est la ligne de striction de Σ lorsque

$$W = - \int \frac{r}{\rho} ds + \text{const.}$$

V°) Si l'on déplace les binormales le long des tangentes, il résulte

$$V = W = 0, \quad a = b = \frac{\pi}{2}, \quad c = 0$$

et l'on a les conditions

$$\frac{1}{r} (1 + U') + 0, \quad \frac{1}{\rho} \cdot \frac{1}{r} U = 0.$$

La surface Σ est donc développable si la ligne L est plane, ou bien si la ligne A est une développante de L .

La courbe A est la ligne de striction de Σ lorsque L est plane ou bien lorsque la condition $U=0$ est vérifiée (Σ est, dans ce cas, la surface lieu des binormales de L).

Il est bon de remarquer que, dans ce cas, on a $\cos i = 0$, quelle que soit U .

Par conséquent «Si l'on déplace, suivant une loi arbitraire, les binormales d'une ligne quelconque, parallèlement à leur direction, le long des tangentes, la ligne A , lieu des extrémités de ces déplacements, est une trajectoire orthogonale des génératrices de la surface réglée engendrée».

VI°) Si l'on déplace les binormales le long des normales principales, on a

$$U=W=0, \quad a=b=\frac{\pi}{2}, \quad c=0,$$

et l'on déduit les conditions :

$$\frac{1}{r} \left(1 - \frac{V}{\rho} \right) = 0, \quad \frac{1}{r} V' = 0.$$

La surface Σ est donc développable lorsque $\frac{1}{r} = 0$ (L est plane), ou $V = \rho$ (la surface Σ est la développable polaire de L). La directrice A est la ligne de striction de Σ lorsque la ligne L est plane, ou bien lorsque le déplacement des binormales le long des normales principales est constant.

§ 4

Sur chaque plan osculateur d'une ligne L conduisons une droite, ayant l'inclinaison θ sur la tangente; et soit Σ la surface réglée que l'on engendre, et Λ le lieu des points où les droites menées rencontrent les tangentes de L .

Puisque dans ce cas on a

$$V=W=0, \quad a=\theta, \quad b=\frac{\pi}{2}-\theta, \quad c=\frac{\pi}{2},$$

les équations (5), (6), par l'application des égalités (8), donnent

$$(9) \quad \left\{ (1+U') \sin \theta - \frac{U}{\rho} \cos \theta \right\} \frac{\sin \theta}{r} = 0$$

$$(10) \quad \left\{ (1+U') \sin \theta - \frac{U}{\rho} \cos \theta \right\} \left(\frac{d\theta}{ds} + \frac{1}{\rho} \right) = 0.$$

La condition (9) se dédouble comme il suit

$$\theta = 0, \quad \frac{1}{r} = 0, \quad (1+U') \sin \theta - \frac{U}{\rho} \cos \theta = 0.$$

La solution $\theta = 0$ donne la développable osculatrice de L ; l'autre $\frac{1}{r} = 0$ n'a pas d'importance, la ligne L étant, dans ce cas,

plane. La troisième solution vérifie aussi l'équation (10), et la surface développable Σ a pour arête de rebroussement la ligne Λ .

La détermination de U revient à l'intégration d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, ce qui nous donne

$$U = \left(a - \int e^{-\int \frac{\cot \theta}{\varphi} ds} ds \right) e^{\int \frac{\cot \theta}{\varphi} ds},$$

a étant une constante quelconque.

L'équation (10) se dédouble dans les autres

$$(1 + U') \sin \theta - \frac{U}{\varphi} \cos \theta = 0, \quad \frac{d\theta}{ds} + \frac{1}{\varphi} = 0;$$

la première solution vérifie aussi l'équation (9) et la deuxième donne

$$\theta = k - \int \frac{ds}{\varphi}.$$

Donc «La condition nécessaire et suffisante pour que la ligne de striction de la surface gauche, lieu d'une série de droites menées sur les plans osculateurs d'une ligne L , soit le lieu des points où ces droites coupent les tangentes de L , est que la différentielle de l'inclinaison des droites sur les tangentes soit égale à l'angle de contingence de L ».

Supposons $U=0$ et l'on a un théorème de *M. Catalan* (*).

L'équation (7), pourvu que l'on y substitue les valeurs de M , N , $\cos i$, donne le carré de l'élément linéaire de la surface gauche; et si l'on pose la condition d'orthogonalité entre les lignes

(*) *Bulletin de la Société Philomathique*, 1848.

coordonnées $s = \text{constant}$ (génératrices rectilignes) et $v = \text{constant}$,
on a

$$(11) \quad (1 + U') \cos \theta + \frac{U}{\rho} \sin \theta = 0$$

$$(12) \quad dS^2 = \left\{ \frac{\sin^2 \theta}{r^2} v^2 + \left[\frac{U}{\rho \cos \theta} + \left(\frac{d\theta}{ds} + \frac{1}{\rho} \right) \right]^2 \right\} ds^2 + dv^2.$$

On sait d'ailleurs que le carré de l'élément linéaire de la surface lieu des normales principales d'une ligne $L_1 (s_1, \varphi_1, r_1)$ est

$$(13) \quad dS_1^2 = \left\{ \frac{v_1^2}{r_1^2} + \left(1 - \frac{v_1}{r_1} \right)^2 \right\} ds_1^2 + dv_1^2.$$

L'identification des expressions (12), (13) conduit aux conditions

$$(14)$$

$$\varphi_1 = - \frac{U}{\left(1 + \rho \frac{d\theta}{ds} \right) \cos \theta}, \quad r_1 = \frac{Ur}{\rho \sin \theta \cos \theta}, \quad ds_1 = \frac{U}{\rho \cos \theta} ds.$$

Donc :

«La surface réglée dont il s'agit est applicable sur la surface gauche des normales principales de la ligne L_1 dont les rayons φ_1, r_1 , de courbure et de torsion sont exprimables en fonction de l'arc par les équations (14), U, ρ, θ étant liés entre eux par la condition (11).».

Exemple. Lorsque U est une constante, l'équation (11) donne

$$\rho = -U \tan \theta;$$

si donc on suppose que θ soit une constante, il résulte

$$\rho_1 = \frac{\rho}{\sin \theta}, \quad r_1 = -\frac{r}{\sin^2 \theta}, \quad ds_1 = -\frac{ds}{\sin \theta}.$$

Les rayons de courbure ρ et ρ_1 sont donc constants.

Par conséquent «Si sur les tangentes d'une ligne L à courbure $\frac{1}{\rho}$ constante on prend des distances constantes U et par leurs extrémités P on mène, dans les plans osculateurs, des droites inclinées sur les tangentes de l'angle θ défini par l'équation $\tan \theta = -\frac{\rho}{U}$, les génératrices de la surface réglée Σ que l'on obtient sont perpendiculaires à la ligne Λ lieu des points P .

Si l'on déforme Σ par flexion, de manière à réduire Λ à une ligne asymptotique de la surface réglée déformée, la ligne Λ se réduit à une ligne L_1 à courbure constante. La torsion et l'arc élémentaire de cette ligne L_1 ont un rapport constant à la torsion et à l'arc élémentaire de L ».

§ 5

Sur chaque plan normal d'une ligne quelconque L traçons une droite inclinée de l'angle θ sur la normale principale, et considérons la surface réglée Σ que l'on vient de former.

Soit Λ le lieu des points où les droites menées coupent les normales principales de L . Nous avons

$$U=V=0, \quad a=\frac{\pi}{2}, \quad b=\theta, \quad c=\frac{\pi}{2}-\theta$$

et les conditions (5), (6) deviennent

$$(15) \quad \left(\frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{r} \right) \left(1 - \frac{V}{\rho} \right) - \frac{\cos \theta}{\rho} \left(V' \sin \theta + \frac{V}{r} \cos \theta \right) = 0$$

$$(16) \quad \left(\frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{r} \right) \left(V' \sin \theta + \frac{V}{r} \cos \theta \right) + \frac{\cos \theta}{\rho} \left(1 - \frac{V}{\rho} \right) = 0.$$

Celles-ci sont des équations différentielles linéaires du premier ordre; on peut donc effectuer leur intégration et résoudre d'une manière complétée les problèmes correspondants.

Cas particulier. Soit $V = \rho$; la ligne Λ est alors le lieu des centres de courbure de L et les équations (15), (16) deviennent

$$(15') \quad \left(V' \sin \theta + \frac{V}{r} \cos \theta \right) \cos \theta = 0$$

$$(16') \quad \left(V' \sin \theta + \frac{V}{r} \cos \theta \right) \left(\frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{r} \right) = 0.$$

Les solutions de l'équation (15') sont

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad V' \sin \theta + \frac{V}{r} \cos \theta = 0.$$

La première donne lieu à la développable polaire de L ; la deuxième conduit à la développable osculatrice de Λ , car cette solution vérifie l'équation (16').

Donc: «Par la ligne Λ lieu des centres de courbure d'une ligne quelconque L , passent deux surfaces développables, dont

Lambechellus ex lichenis operari

laminosus ex lichenis operari
laminosus ex lichenis operari

laminosus ex lichenis operari

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Publica-se o *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* em fasciculos de 32 paginas. Cada 6 fasciculos formarão um volume de 192 paginas.

Preço de cada volume — 2\$400 réis

A correspondencia relativa ao *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* deve ser dirigida para o Porto, rua de Costa-Cabral.

F. GOMES TEIXEIRA

Curso de Analyse infinitesimal

Tomo I (Calculo differencial);
Tomo II (Primeira parte do Calculo integral);
Tomo III (Segunda parte do Calculo integral).

Preço de cada volume — 2\$500 réis.

JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS

PUBLICADO

PELO

Dr. F. Gomes Teixeira

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo Professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.



VOL. XII—N.^o 2

COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1895

ГЛАВА
СОЛНЦЕ И ЗАПАДНЯЯ ЗИМА

ОБЩИЙ

СВЕДЕНИЯ О СОЛНЕЧНОМ СВЕЧЕНИИ
ПОДГОТОВЛЕНЫ
ДЛЯ ПРИЧИТАНИЯ
СОЛНЦА И ЗАПАДНЯЯ ЗИМА

АВТОРСКАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЕ

1881

les génératrices sont dans les plans normaux de L ; ce sont la développable polaire de L et la développable osculatrice de Δ .

Si l'on remarque que

$$\theta = \int \frac{ds}{r} + \text{const.}$$

est une des solutions de l'équation (16'), on a :

« Par la ligne Δ , lieu des centres de courbure d'une ligne quelconque L , passent deux surfaces réglées ayant Δ pour ligne de striction, et dont les génératrices sont dans les plans normaux de L . Ces surfaces sont la développable osculatrice de L , et celle dont les génératrices sont inclinées sur les normales principales de L de l'angle θ donné par l'équation

$$\theta = \int \frac{ds}{r} + \text{const.}$$

Au moyen d'un calcul analogue à celui du n.^o 4, cherchons le carré de l'élément linéaire de la surface gauche dont il s'agit, et posons ensuite la condition que les lignes coordonnées $s = \text{const.}$ (génératrices) et $v = \text{const.}$ soient orthogonales.

On a

$$V' \cos \theta - \frac{V}{r} \sin \theta = 0$$

$$(18) \quad dS^2 = \left\{ \left[\frac{V'}{\sin \theta} - \left(\frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{r} \right) v \right]^2 + \left[\left(1 - \frac{V}{r} \right) - \frac{\cos \theta}{r} v \right]^2 \right\} ds^2 + dv^2.$$

En comparant l'équation (18) à la (13), on trouve pour conditions d'identité

$$\rho_1 = \frac{\rho^2 V'^2 + (\rho - V)^2 \sin^2 \theta}{\rho^2 V' \left(\frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{r} \right) + (\rho - V) \sin \theta \cos \theta} \cdot \frac{1}{\sin \theta}$$

$$r_1 = \frac{\rho^2 V'^2 + (\rho - V)^2 \sin^2 \theta}{V' \cos \theta - (\rho - V) \left(\frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{r} \right) \sin \theta} \cdot \frac{1}{\rho \sin \theta}$$

$$ds_1 = \frac{\sqrt{\rho^2 V'^2 - (\rho - V)^2 \sin^2 \theta}}{\rho \sin \theta} \cdot ds.$$

On peut, à l'aide de ces équations, déterminer la ligne L_1 , pourvu que l'on rappelle la condition (17).

Exemple. Soit

$$V = \rho \text{ et } \theta = \text{constante};$$

les formules que l'on vient d'écrire deviennent

$$\rho_1 = \frac{-r\rho'}{\sin \theta}, \quad r_1 = \frac{\rho\rho'}{\sin \theta \cos \theta}, \quad ds_1 = \frac{\rho'}{\sin \theta} ds.$$

La condition (17) se réduit à l'autre

$$\rho' \cos \theta - \frac{\rho}{r} \sin \theta = 0,$$

d'où il suit

$$\frac{\rho}{r} = \rho' \cot \theta.$$

Si donc $\frac{\rho}{r}$ est constant, ρ' est aussi constant et la ligne L est une hélice cylindro-conique. Et puisque les formules précédentes démontrent que ρ' et r_1 sont des fonctions linéaires de s_1 , on conclut que la ligne L_1 est elle-même une hélice cylindro-conique.

Donc : « Si l'on mène, par les centres de courbure d'une hélice cylindro-conique L , et dans les plans normaux, des droites inclinées sur les normales principales d'un angle θ défini par l'équation

$$\tan \theta = \frac{\rho' r}{\rho},$$

la ligne Λ , lieu des centres de courbure de L , est une trajectoire orthogonale des génératrices de la surface gauche engendrée. Si l'on déforme par flexion cette surface de manière que la ligne Λ devienne une ligne asymptotique de la surface gauche déformée, cette ligne (qui, comme on sait, est une hélice cylindro-conique) devient une nouvelle hélice cylindro-conique ».

§ 6

Sur chaque plan rectifiant d'une ligne L traçons une droite coupant la tangente sous l'angle θ ; soit Σ la surface réglée que l'on vient d'engendrer et Λ le lieu des points où les droites menées coupent les tangentes de L .

On a

$$V = W = 0, \quad a = \theta, \quad b = \frac{\pi}{2}, \quad c = \frac{\pi}{2} - \theta$$

et les équations (5) (6) donnent

$$(19) \quad \frac{U}{\rho} \frac{d\theta}{ds} + (1 + U') \left(\frac{\cos \theta}{\rho} + \frac{\sin \theta}{r} \right) \sin \theta$$

$$(20) \quad (1 + U') \sin \theta \cdot \frac{d\theta}{ds} - \frac{U}{\rho} \left(\frac{\cos \theta}{\rho} + \frac{\sin \theta}{r} \right) = 0.$$

L'intégration de ces équations s'effectue tout de suite.

Si l'on suppose $U = 0$, les équations (19), (20) deviennent

$$\left(\frac{\cos \theta}{\rho} + \frac{\sin \theta}{r} \right) \sin \theta = 0, \quad \sin \theta \cdot \theta' = 0.$$

Ces équations ont la solution commune $\theta = 0$, et dans ce cas Σ est la développable osculatrice de L . L'autre solution de la première équation est

$$\tan \theta = - \frac{r}{\rho},$$

et la surface Σ est la développable rectifiante de L .

L'autre solution de la deuxième équation est $\theta = \text{const.}$, ce qui démontre un théorème bien connu de *M. Bonnet* sur la ligne de striction géodésique d'une surface gauche.

En revenant au cas général, calculons le carré de l'élément

linéaire de la surface gauche, et posons ensuite la condition que les lignes coordonnées

$$s = \text{const.}, \quad v = \text{const.}$$

soient orthogonales ; on obtient

$$(21) \quad (\mathbf{1} + \mathbf{U}') \cdot \cos \theta = 0$$

$$(22) \quad dS^2 = \left\{ (1 + U' - v \cdot \sin \theta \cdot \dot{\theta})^2 + \left[\frac{U}{\varphi} + v \left(\frac{\cos \theta}{\varphi} + \frac{\sin \theta}{r} \right) \right]^2 \right.$$

$$\left. + v^2 \cos^2 \theta \cdot \dot{\theta}'^2 \right\} ds^2 + dv^2.$$

La condition (21) se dédouble de la manière suivante

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \mathbf{1} + \mathbf{U}' = 0.$$

Nous nous bornons à la première solution.

Les droites menées sont, dans ce cas, parallèles aux binormales de \mathbf{L} et l'expression (22) de dS^2 se réduit à l'autre

$$(23) \quad dS^2 = \left\{ (1 + U')^2 + \left(\frac{U}{\varphi} + \frac{v}{r} \right)^2 \right\} ds^2 + dv^2.$$

Supposons ensuite $U = 0$ et l'équation

$$(24) \quad ds_1^2 = \left(1 + \frac{v_1^2}{r_1^2} \right) ds_1^2 + dv_1^2,$$

à laquelle se réduit l'équation (23), donne l'expression du carré de l'élément linéaire de la surface gauche des binormales d'une ligne L_1 (s_1, ϱ_1, r_1).

Pour identifier les expressions (23), (24) posons

$$v_1 = v + k,$$

k étant une constante, et l'on obtient les trois équations

$$\left\{ (1+U')^2 + \frac{U^2}{\varrho^2} \right\} ds^2 = \left(1 + \frac{k^2}{r_1^2} \right) ds_1^2;$$

$$\frac{U}{\varrho r} ds^2 = \frac{k}{r_1^2} ds_1^2; \quad \frac{1}{r^2} ds^2 = \frac{1}{r_1^2} ds_1^2.$$

qui nous donnent

$$U = k \frac{\varrho}{r}; \quad r_1 = r \left\{ 1 + k \left(\frac{\varrho}{r} \right)' \right\};$$

$$ds_1 = \left\{ 1 + k \left(\frac{\varrho}{r} \right)' \right\} ds.$$

Lorsque la ligne L est donné, ϱ et r sont des fonction connues de s et les formules précédentes donnent la construction de la

ligne L_1 dont les binormales engendrent une surface gauche applicable à la surface gauche donnée.

Exemple. a) Si l'on suppose

$$\frac{\rho}{r} = \text{constante},$$

on a

$$ds_1 = ds, \quad r_1 = r.$$

On obtient donc le théorème : «Si sur les tangentes d'une hélice quelconque L on prend des distances constantes $k \frac{\rho}{r}$, et par les extrémités on conduit des parallèles aux binormales, la surface réglée que l'on obtient est la surface gauche des binormales d'une ligne L_1 , dont le rayon de torsion et l'arc élémentaire sont égaux au rayon de torsion et à l'arc élémentaire de L . La distance entre les points correspondants des lignes L , L_1 est k ».

b) Si l'on suppose que r_1 soit proportionnel à r , on a

$$\left(\frac{\rho}{r}\right)' = \text{const.} - \frac{1}{a}, \quad U = k\left(\frac{s}{a} + b\right).$$

La condition

$$\frac{\rho}{r} = \frac{s}{a} + b$$

nous apprend que la ligne L est une géodésique d'un cône (*).

(*) *Studi geometrici relativi specialmente alle superficie gobbe. Journal de M. Battaglini, 1855.*

Donc : « Si sur les tangentes d'une géodésique d'un cône

$$\left(\frac{c}{r} = \frac{s}{a} + b \right)$$

on prend des distances

$$U = k \left(\frac{s}{a} + b \right),$$

et par les extrémités on conduit des parallèles aux binormales de la ligne, la surface réglée que l'on obtient est la surface des binormales d'une ligne L_1 , dont le rayon de torsion et l'arc sont liés au rayon de torsion et à l'arc de L par les équations

$$r_1 = \left(1 + \frac{k}{a} \right) r, \quad s_1 = \left(1 + \frac{k}{a} \right) s.$$

La distance entre les points correspondants des lignes L, L_1 est k . »

§ 7

Faisons tourner d'un angle θ les binormales d'une ligne L , autour des points de cette courbe, et dans les plans normaux. À la surface gauche Σ que l'on vient d'obtenir, on peut appliquer les formules du § 2, pourvu que l'on y suppose

$$U = V = W = 0, \quad a = \frac{\pi}{2}, \quad b = \frac{\pi}{2} \theta, \quad c = \theta.$$

On a donc

$$ds = d\sigma; \quad M^2 = \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2} + \left(\frac{d\theta}{ds} + \frac{1}{r} \right)^2; \quad N = -\frac{\sin \theta}{\rho}.$$

Et si l'on fait usage de l'équation (4) du § 4, on arrive au théorème :

«La condition nécessaire et suffisante pour que la surface Σ que l'on vient de construire soit la surface gauche des binormales d'une ligne L_1 est exprimée par l'équation

$$(25) \quad \frac{\sin \theta}{\frac{\rho}{\sin^2 \theta} + \left(\frac{d\theta}{ds} + \frac{1}{r} \right)^2} = k,$$

k étant une constante».

Si donc θ n'est pas constant, chaque ligne L donne lieu à une des surfaces gauches Σ que l'on vient de considérer. La construction de la ligne L_1 , ayant pour binormales les génératrices de Σ , n'offre pas de difficulté, puisque k désigne précisément la distance entre les points correspondants des courbes L, L_1 .

Si θ est constant, l'équation (25) donne

$$(26) \quad \frac{1}{\rho} = k \sin \theta \cdot \frac{1}{\rho^2} + \frac{k}{\sin \theta} \cdot \frac{1}{r^2}.$$

Donc : «Les lignes gauches L dans lesquelles les rayons de courbure et de torsion sont liés entre eux par l'équation (26), (dans laquelle k et θ sont des constantes) sont caractérisées par la propriété que, si l'on fait tourner les binormales de l'angle θ , avec la condition qu'elles ne sortent pas des plans normaux, la surface

gauche que l'on obtient est le lieu des binormales d'une autre ligne L_1 .

La distance entre les points correspondants des lignes L , L_1 est k .

Si l'on suppose $\theta = \frac{\pi}{2}$, on a l'équation

$$\frac{1}{\rho} = k \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r'^2} \right),$$

caractérisant (*) les lignes L dans lesquelles les normales principales sont les binormales d'une autre ligne.

Parme, novembre, 1892.

(*) *Journal de M. Battaglini*, I. c.

CONGRESSO DE CAEN

(Extracto de uma carta do sr. R. Guimarães)

Entre as varias questões discutidas na 1.^a e 2.^a secções (scien-
cias mathematicas) do Congresso que a *Association française pour
l'avancement des sciences* realizou na cidade de Caen de 9 a 14
do corrente, uma ha, que é digna de menção, principalmente
pelas resoluções tomadas. É a seguinte :

«Estudar os meios a seguir para facilitar as relações entre os
mathematicos das diversas nações e contribuir para o progresso
das sciencias mathematicas e aperfeiçoamento dos methodos».

As resoluções tomadas pelo Congresso, e que me apresso a
transmittir-lhe, afim de as tornar conhecidas dos leitores do seu
Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas, são as se-
guientes :

1.^º Empregar todos os esforços para a realização de congres-
sos de mathematica internacionaes que terão logar com intervallos
de alguns annos. É provavel que o primeiro d'estes congressos
tenha logar em Genebra ;

2.^º Approvar completamente a ideia do professor Mansion pelo
que respeita á redacção do Vocabulario mathematico e felicitar
o major de engenharia sr. Brocard, pelos serviços que já tem
prestado com relação ao vocabulario francez ;

3.^º Fazer votos para que o projecto do sr. Jacques Boyer, re-
lativo ao *Diccionario mathematico*, seja levado a cabo tanto em
França, como nos outros paizes ;

4.^º Chamar a atenção para as notaveis memórias sobre ma-
thematicas puras que ultimamente se têm publicado na Alle-
manha, e que bom seria que se traduzissem para diversas linguas ;

5.^º Considerar que os grandes esforços empregados pelo pro-

fessor Peano, da Universidade de Turin, e varios outros dos seus compatriotas, pelo que respeita á propaganda da *Logica mathematica* e á publicação de um formulario mathematico, são de natureza a contribuir para a realisação do fim em vista;

6.^º Applaudir a publicação da *Revue semestrielle des publications mathématiques*, devida á iniciativa de um grupo de mathematicos hollandezes á frente dos quaes se acha o professor Schoute, da Universidade de Groningue, e felicitar a commissão de preparação do *Repertoire bibliographique*, pelo estado de adiantamento em que se encontram os trabalhos;

7.^º Chamar a attenção para os grandes serviços prestados pelo *Intermédiaire des mathématiciens*, pelo que respeita ás relações entre os mathematicos entre si, felicitando ao mesmo tempo os fundadores de tão importante revista, os srs. Laisant e Lemoine, membros da associação franceza.

8.^º Tomar em consideração a ideia apresentada pelo sr. Lemeray com relação á criação de bibliothecas mathematicas, tendo por fim pôr os seus livros á disposição dos estudiosos que residam fóra dos grandes centros científicos.

Além d'estas resoluções, a secção resolveu que a questão, tal qual foi este anno apresentada, continue a fazer parte das ordens do dia no proximo Congresso da associação franceza, o qual terá logar na cidade de Bordeus em 1895.

Caen, 14 de agosto de 1894.

NOTA SOBRE EL TRIANGULO

POR

DON JUAN J. DURAN LORIGA

Capitan de Artilleria

Las expresiones

$$a^2 + b^2 + c^2, \quad a^2 + b^2 - c^2, \dots,$$

que se presentan en muchas formulas relativas al triangulo son susceptibles de una interpretacion geometrica muy sencilla.

Consideremos el triangulo A B C y la circunferencia descrita sobre el lado BC = a , como diametro. La potencia del punto A respecto á esta circunferencia tiene por expresion A B' A B ó lo que es lo mismo $m_a^2 - \frac{a^2}{4}$, y poniendo en lugar de m_a su valor en funcion de los lados resulta, llamando p_a á la potencia,

$$p_a = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2};$$

del mismo modo se obtiene

$$p_b = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2},$$

$$p_c = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}.$$

Sumando miembro á miembro las tres igualdades y llamando P á la suma, resulta :

$$P = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}.$$

Llamaremos á esta cantidad P *potencia del triangulo*, así como á p_a , p_b y p_c *potencias parciales* relativas á cada uno de sus vértices, ó brevemente, potencia parcial de A, de B ó de C.

La consideracion de las potencias simplifica muchas formulas del triangulo, ya haciendo mas sencilla su estructura, ya facilitando su retencion por medio de reglas mnemónicas —, y no por la sustitucion de letras convencionales como abreviacion de los trinomios de que hemos hablado al principio, sino por cantidades que tienen completa interpretacion geometrica y pueden figurar como elementos de los triangulos para la resolucion de problemas que pueden proponerse haciendolos entrar como datos.

La enunciacion de algunos teoremas adquiere una forma mas sencilla; p. e. el fundamental de los triangulos oblicuangulos se traduce en las siguientes igualdades :

$$p_a = bc \cos A, \quad p_b = ac \cos B, \quad p_c = ab \cos C,$$

esto es, *en todo triangulo la potencia de un vértice es igual al producto de los lados que en el concurren por el coseno del angulo que forman*, resultando por consiguiente que la potencia es positiva,

nula, ó negativa, segun el angulo correspondiente sea agudo, recto, ó obtuso, hecho que igualmente se deduce de la definicion geometrica.

Es bien facil obtener, en vista de nuestra definicion de potencia, las relaciones siguientes

$$P^2 + p_a^2 + p_b^2 + p_c^2 = a^4 + b^4 + c^4,$$

$$\frac{\tan A}{\tan B} = \frac{p_b}{p_a},$$

$$\frac{ap_a}{\cos A} = \frac{bp_b}{\cos B} = \frac{cp_c}{\cos C},$$

diciendonos la 2.^a que en todo triangulo *las potencias de los vertices son inversamente proporcionales á las tangentes de los angulos correspondientes* y la 3.^a que *los productos de los lados por las potencias de los vertices opuestos son proporcionales á los coseños de los angulos correspondientes*.

La altura de un triangulo en funcion de las potencias de los vertices tiene por expresion

$$h_a = \frac{1}{a} \sqrt{p_a \cdot p_b + p_a \cdot p_c + p_b \cdot p_c}$$

y por consiguiente el area

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{p_a \cdot p_b + p_a \cdot p_c + p_b \cdot p_c}.$$

Para los valores de los angulos se tiene:

$$\cos A = \frac{p_a}{b_c}, \tan A = \frac{2S}{p_a}.$$

De las definiciones dadas y de formulas conocidissimas relativas á los triangulos, se deducen inmediatamente varios corolarios; citaremos algunos:

1.^o En los triangulos equivalentes y de la misma potencia total (equipotenciales) el angulo de Brocard es constante.

2.^o Si en un triangulo se fijan las potencias de los vértices (con lo que se determina un lado), el lugar geometrico del tercero es una perpendicular á dicho lado.

3.^o Si se marca la potencia total y la de un vértice (con lo que tambien se fija un lado), el lugar geometrico del tercer vértice es una circunferencia.

4.^o Si un triangulo variando de forma y posicion se mantiene inscripto en una circunferencia pero moviendose el centro de gravedad segun otra concentrica, se conserva equipotencial (igual potencia total).

5.^o Una propiedad analoga se verifica respecto al ortocentro.

6.^o Cuando un triangulo conserva un angulo fijo en magnitud y posicion y constante la potencia del vértice, el tercer lado envuelve una hipérbola.

7.^o Si varios triangulos son equipotenciales, tambien lo son entre si los formados con las medianas de ellos.

8.^o Cuando varios triangulos equipotenciales son inscriptibles en una misma circunferencia, se verifica: 1.^o La suma de los cuadrados de las distancias del centro de esta á los lados es constante. 2.^o Lo mismo sucede respecto á la suma de los cuadrados de los radios de los circulos inscriptos y exinscriptos. 3.^o Los ejes orticos de todos estos triangulos son tangentes á una misma circunferencia.

9.^o Si varios triangulos son equipotenciales y equivalentes, la suma de los inversos de los cuadrados de los radios de los circulos inscriptos y exinscriptos, es constante.

10.^o Cuando un triangulo manteniendose inscripto en una cir-

cunferencia pivotea al rededor de un vértice conservando fija la potencia en este punto, el tercer lado es tangente á una conica y las alturas que corresponden á los vértices móviles son tangentes á una parabola.

11.^o La potencia de dos circunferencias (*) no es mas que la parcial del triangulo formado por la linea de centros y los radios que van á uno de los puntos de intersección, y con respecto á dicho punto.

En ciertas formulas de la geometria moderna del triangulo puede ser comodo para retenerlas, hacer entrar las expresiones potenciales; asi tenemos p. e. para las coordenadas normales absolutas del ortocentro

$$\delta_a = \frac{p_b p_c}{2S}, \quad \delta_b = \dots, \quad \delta_c = \dots;$$

del centro del circulo circunscripto

$$\delta_a = \frac{ap_a}{4S}, \quad \delta_b = \dots, \quad \delta_c = \dots;$$

del reciproco del ortocentro

$$\delta_a = \frac{2Sp_a}{aP}, \quad \delta_b = \dots, \quad \delta_c = \dots.$$

(*) Sobre la definicion de potencia de dos circunferencias, vease:
R. Lachlan.—An elementary Treatise on modern pure geometry, pag. 189.

Las coordenadas baricentricas de los vertices del 2.^o triangulo de Brocard son

$$A_2 \dots \alpha : \beta : \gamma = 2p_a : b^2 : c^2,$$

$$B_2 \dots \alpha : \beta : \gamma = a^2 : 2p_b : c^2,$$

$$C_2 \dots \alpha : \beta : \gamma = a^2 : b^2 : 2p_c.$$

La ecuacion del eje de homologia del triangulo dado y el 2.^o de Brocard es

$$\frac{\alpha}{a^2 - 2p_a} + \frac{\beta}{b^2 - 2p_b} + \frac{\gamma}{c^2 - 2p_c} = 0$$

etc., etc.

Podria ahora proponerse como ejercicio: 1.^o La demonstracion *geometrica* de los corolarios que hemos deducido. 2.^o Diversos problemas de construccion de triangulos en que figurasen entre los datos, ademas de ciertos elementos de los mismos, las potencias totales ó las parciales de sus vértices.

BIBLIOGRAPHIA

E. Cesàro : Corso di Analisi algebrica con introduzione al calcolo infinitesimale. Torino, Bocca, 1894.

Contém este volume o curso que sobre analyse algebrica professou o sr. Cesàro na Universidade de Palermo nos annos de 1886 a 1891. Obra de um geometra illustre, recommenda-se pelo rigor, clareza e elegancia com que está escrito, pela quantidade de assumptos interessantes que n'elle são considerados e pela maneira original com que muitas questões ahí são tratadas.

Abre o livro por uma exposição muito bem feita da theoria dos determinantes, á qual se segue a da parte mais importante da theoria das fórmulas lineares e das fórmulas quadraticas. Depois é exposta com a maior clareza a theoria dos numeros irrationaes. Segue-se o estudo da noção de limite, a respeito da qual o auctor não só expõe os theoremas que geralmente se encontram nas obras que tratam d'este assumpto, mas outros de natureza mais elevada e menos conhecidos, de que elle tem tirado partido em muitas das publicações com que tem enriquecido a sciencia.

Ao estudo da noção de limite segue-se o estudo das series, em que os theoremas demonstrados anteriormente a respeito d'esta noção têm a sua primeira applicação. A este respeito o auctor não só apresenta os theoremas de maior importânciā que têm sido enunciados pelos geometras, mas, estudando intimamente estes theoremas, apresenta a respeito d'elles muitas notas e observações importantes que os esclarecem, e fixam o alcance de que são susceptíveis.

Estuda depois o sr. Cesàro os principios geraes da theoria das funcções de variaveis reaes e a theoria do seu desenvolvimento em serie; como applicação, são estudadas as funcções que em obras d'esta natureza é uso considerar.

Nos cinco capitulos seguintes são estudados os fundamentos da

theoria dos numeros complexos, as series compostas de numeros complexos, a theoria das funções hyperbólicas, os quaternões, etc.

Os doze capitulos seguintes da obra são destinados á theoria das equações. N'elles são expostos os methodos classicos para a resolução das equações numericas e para a resolução algebrica das equações do 3.^o e do 4.^o gráo e é demonstrada a impossibilidade da resolução algebrica das equações de gráo superior ao quarto.

Os dois restantes capitulos são destinados um á theoria da interpolação e o outro á theoria dos productos compostos de factores em numero infinito.

Não terminaremos esta rapida noticia sem nos referir aos exercícios que terminam muitos dos capitulos da obra. Escolhidos com grande cuidado, estes exercícios são todos interessantes e alguns mesmo originaes.

*G. Papelier : Leçons sur les coordonnées tangentielles, Paris, Nony,
1894.*

Depois das coordenadas cartesianas não ha sistema de coordenadas que tenha mais importancia do que o das coordenadas tangenciaes. Da combinação dos dois systemas resulta com effeito o *principio da dualidade*, um dos mais secundos da geometria. Para que os alumnos possam empregar este poderoso meio de indagação geometrica, torna-se necessário familiarisarem-se com este sistema de coordenadas, excitando-se no seu manejo; e para esse fim nada melhor do que, depois de estudarem a geometria analytica cartesiana, estudarem a geometria analytica tangencial desde os seus primeiros elementos. Para este fim, a obra do sr. Papelier é um excellente auxiliar. Eis o objecto de cada um dos quatorze capitulos em que se divide:

I. Ponto e recta. II. Generalidades sobre as curvas e principio de dualidade. III. Posição de uma curva relativamente ás suas tangentes. IV. Tangentes e normaes. V. Classificação das curvas de segunda classe. VI. Pólos e polares. VII. Centros, diametros

e eixos. VIII. Reducção da equação geral do segundo gráo. IX. Fócos e directrizes. X. Tangentes communs a duas conicas. XI. Conicas inscriptas no quadrilatero das tangentes communs a duas conicas. XII. Rectas que têm o mesmo pólo relativamente a duas conicas. XIII. Coordenadas trilateraes. XIV. Propriedades de duas e de tres conicas.

A exposição dos assumptos é feita com a maior clareza e muitas questões são n'esta obra pela primeira vez tratadas com o auxilio das coordenadas tangenciaes.

C. Burali-Forti: Logica matematica, Milano, Hoepli, 1894.

Pela precisão e fixidez que permite dar ao enunciado das proposições, a logica mathematica vae attrahindo cada vez mais a attenção dos geometras dos diversos paizes. Tem sido o objecto de obras extensas, onde é exposta desenvolvidamente esta sciencia, antiga na origem que remonta a Leibnitz, mas moderna no seu desenvolvimento, iniciado por Boole e continuado por Schröder, Peirce, Nagy, Peano, etc.; os seus symbolos têm sido aproveitados em trabalhos importantes, para escrever com concisão e de um modo intelligivel para os mathematicos de todos os paizes as proposições n'elles consideradas; tem sido mesmo introduzida no ensino em algumas Universidades da Europa e da America. Tornava-se por isso extremamente desejável a redacção de uma obra resumida, onde sem grandes esforços nem emprego consideravel de tempo se podesse estudar o que é mais importante n'esta sciencia. A este objecto satisfaz plenamente o excellente livro que vem de publicar o sr. Burali-Forti, o qual em pequeno espaço e com a maior clareza apresenta o que é essencial conhecer para se poder usar a Logica mathematica.

Accrescentaremos que o livro, a que vimos de nos referir, faz parte da importante collecção de manuaes que, com o nome de *Manuali Hoepli*, está publicando a casa editora Hoepli de Milão.

Accrescentaremos ainda que os symbolos de Logica mathematica têm sido empregados no *Formulario* geral das mathematicas

que, debaixo da direcção do sr. Peano, está publicando a *Rivista di matematica* e na redacção do qual tem tomado uma parte importante o sr. Burali-Forti.

A. Rebière : Les femmes dans la science, Paris, Nony, 1894.

Contém este opusculo uma conferencia muito interessante que foi feita pelo sr. Rebière no *Cercle Saint Simon de Paris* em 14 de fevereiro de 1894, a qual teve por objecto dar noticia de algumas mulheres que cultivaram com sucesso as sciencias mathematicas. N'ella se refere o auctor a Hypatia de Alexandria, a Emilie du Châtelet, a Maria Agnezi, a Sophie Germain, a Mary Somerville, e a Sophie Kowalevski.

A respeito de todas estas mulheres celebres apresenta o sr. Rebière informações cheias de interesse que tornam a leitura do seu opusculo das mais agradaveis.

M d'Ocagne : Le calcul simplifié par les procédés mécaniques et graphiques, Paris, G. Villars, 1894.

Contém este opusculo algumas conferencias que foram feitas no Conservatorio das artes de Paris pelo sr. M. d'Ocagne, a respeito dos processos mecanicos e graphicos que têm sido empregados para executar os calculos numericos.

Estes processos foram classificados pelo auctor nos grupos seguintes : 1.^º Instrumentos e machinas arithmeticas ; 2.^º Instrumentos logarithmicos ; 3.^º Traçados graphicos ; 4.^º Taboas numericas ; 5.^º Taboas graphicas.

A primeira conferencia refere-se aos processos pertencentes ao primeiro grupo. N'ella são descriptos o addicionador de Troncet, o multiplicador de Neper, as machinas de Pascal, Roth., Thomaz, Bollée, Babbage, Tchebichef, etc.

A segunda conferencia refere-se aos processos pertencentes ao segundo, ao terceiro e ao quarto grupo. Dos instrumentos logarithmicos são n'ella considerados as regoas, os círculos, as hélices e os cilindros.

Na terceira conferencia considera o auctor os processos pertencentes ao ultimo grupo, isto é os abacos. A theoria geral d'estes processos de calculo foi ainda ha poucos annos constituida pelo auctor, que a respeito d'elles escreveu um livro importante do qual se deu noticia no tomo xi d'este jornal. Na conferencia actual o auctor dá, sem o recurso da Analyse, indicações precisas sobre o emprego e vantagens dos diversos abacos.

Encontra-se ainda no opusculo, a que nos estamos referindo uma nota muito interessante, contendo a primeira descrição detaillada da importante machina de calcular devida a Tehebichef, a respeito da qual o seu auctor tinha apenas publicado uma nota muito succinta. D'esta machina ingenhosa existe um unico exemplar, que está depositado no Cónservalorio das artes de Paris.

Com a publicação em opusculo d'estas conferencias fez o sr. M. d'Ocagne um grande serviço. Muitos são na verdade os individuos que exercem profissões sociaes que os levam a effectuar sucessivos calculos numericos; estes encontrarão n'elle os meios para simplificar tão fastidioso trabalho.

G. Vivanti : Il concetto d'infinitesimo e la sua applicazione alla Matematica, Mantova, 1894.

N'este bello e interessante trabalho faz o auctor a historia do conceito que da noção de infinitamente têm feito os philosophos e os mathematicos, e faz o estudo critico das diversas opiniões a este respeito apresentadas. É dividido em duas partes, na primeira das quaes é a noção de infinitamente pequeno estudada debaixo do ponto de vista philosophico e na segunda debaixo do ponto de vista da sua applicação á mathematica.

A primeira parte consta de quatro capítulos onde são considerados os diversos modos como têm sido concebidos os infinitamente

pequenos, já como rigorosamente nullos, já como grandezas constantes, já como grandezas intensivas. N'esta parte é tambem considerada a questão do *angulo de contacto*, celebre nos seculos XVI e XVII, á qual é consagrado um capítulo muitò bem feito.

A segunda parte do opusculo consta tambem de quatro capitulos onde são considerados os methodos de exaustão, dos indivisiveis, dos infinitamente pequenos e dos limites.

O resto do opusculo é ocupado por 215 notas, contendo informações historicas e bibliographicas, cheias de interesse.

Jubilé de M. Hermite, Paris, G. Villars, 1895.

Contém este bello opúsculo a mensagem que foi dirigida ao sr. Hermite pelos geometras de todas, as nações no dia 24 de dezembro de 1892, na occasião do seu septuagesimo anniversario, e os discursos proferidos na sessão solemne que n'esse dia teve lugar na Sorbonne. É adornado com um excellente retrato d'este eminente geometra.

F. Canu: Précis de Météorologie endogène, Paris, G. Villars, 1894.

A presente obra trata de uma parte da physica do globo, cujo estudo é recente, a qual tem por objecto os phenomenos que têm sua origem na crusta terrestre e que são produzidos pela acção das forças naturaes, calor, electricidade, etc. Estes phenomenos podem revelar-se á superficie da terra, ou por movimentos d'esta crusta, como tem logar com os terramotoes, erupções vulcanicas, etc., ou pela influencia que elles exercem sobre o estado da atmosphera.

No seu muito interessante livro, o sr. Canu faz uma exposição d'esta sciencia nova tão completa quanto possivel, e reune e clas-

sifica os trabalhos importantes, mas muito espalhados, que a este respeito têm sido publicados.

C. A. Laisant : Recueil de problèmes de mathématiques, Paris, G. Villars, 1894.

Nas paginas 83 e 125 do tomo xi d'este jornal referimo-nos aos tres primeiros volumes d'esta obra. O presente volume é consagrado á Geometria elementar, a duas e a tres dimensões, e abrange os problemas que se pretende que sejam resolvidos por methodos puramente geometricos. É dividido em oito capitulos onde são respectivamente enunciados : 1.^o problemas relativos a pontos, rectas e angulos ; 2.^o problemas relativos a figuras circulares ; 3.^o problemas relativos aos triangulos ; 4.^o problemas relativos aos polygonos ; 5.^o problemas relativos ás conicas e outras curvas ; 6.^o problemas relativos a planos no espaço e a polyedros ; 7.^o problemas relativos aos corpos redondos ; 8.^o problemas de Geometria descriptiva.

G. Arnoux : Arithmétique graphique. Les espaces arithmétiques hypermagiques. Paris, G. Villars, 1894.

A theoria dos quadrados magicos é uma theoria difficil de arithmetica de que se têm ocupado muitos mathematicos illustres. É d'esta theoria que trata o sr. Arnoux no seu interessante livro. Para se apreciar a importancia dos methodos empregados pelo auctor, transcreveremos de uma communicação feita a este respeito pelo sr. Laisant á Sociedade mathematica de França, as palavras seguintes :

«Ha uma tal originalidade, um tal poder de invenção nos me-

thodos referidos, que eu ficaria muito admirado se a arithmetica os não utilizasse um dia, ou para obter demonstrações mais simples de verdades conhecidas, ou para descobrir verdades novas... As construcções de quadrados magicos, ou de espaços magicos em geral, não foram para o auctor senão uma occasião de utilizar ideias geraes, tendo um alcance bem diferente do de um simples recreio arithmeticico».

R. Guimarães : O vigesimo segundo Congresso da Associação franceza para o adiantamento das sciencias, Lisboa, 1893.

Contém este interessante opusculo o Relatorio, apresentado á Academia Real das Sciencias de Lisboa, dos trabalhos do Congresso da Associação franceza para o adiantamento das sciencias que teve lugar em Besançon no anno de 1893. O auctor apresenta primeiramente uma noticia sobre a origem e fins d'esta util sociedade, refere-se depois aos trabalhos das vinte e quatro secções que a compõem, a muitas das quaes foram por elle apresentados trabalhos enviados por autores portuguezes, e finalmente dá noticia das conferencias, das vizitas e das excursões que foram realizadas pelos membros do Congresso.

Jorge F. d'Avillez : Sobre a representação da terra pelas projecções orthogonaes (Jornal de Scienças mathematicas, physicas e naturaes, 1893).

O objecto d'este artigo é o estudo da representação da terra por meio de cartas geographicas, obtidas por projecções orthographicas orthogonales.

O auctor estuda a forma d'esta projecção, tanto no caso de o plano de projecção ser paralelo ao equador como no caso de ser paralelo a um meridiano; deduz as formulas que dão a posição na carta de qualquer ponto cuja colatitude e longitude sejam conhecidas; considera as deformações d'estes sistemas de projecção e apresenta as condições em que é útil empregal-os. A exposição do assumpto é feita com clareza e simplicidade.

A. Macfarlane : On the definitions of the trigonometric functions, Boston, 1894.

— *The principles of elliptic and hyperbolic analysis, Boston, 1894.*

Contém estes importantes opúsculos duas comunicações feitas pelo auctor, no Congresso de Mathematica que teve lugar em Chicago em 1894. No primeiro o sr. Macfarlane, depois de apresentar e analysar as diferentes definições que têm sido dadas das funções circulares, estende geometricamente estas definições, por meio de considerações ligadas à teoria dos quaterniões, de modo a obter funções que abrangem as precedentes e outras com representação na ellipse, na hyperbole e em outras curvas. No segundo opúsculo o auctor, empregando estas funções, constitue as trigonometrias spherica, ellipsoidal e hyperboloidica.

E. Mosnat : Problèmes de Géométrie analytique. t. III, Paris, Nony, 1894.

Deram-se n'este jornal, na pagina 21 do tomo x e na pagina 5 do tomo xi, noticias a respeito dos dois primeiros volumes d'esta excellente collecção de problemas. No presente volume o auctor

occupa-se dos problemas de Geometria analytica a tres dimensões e apresenta a este respeito 128 problemas com as respectivas soluções e 400 problemas simplesmente enunciados. Estes problemas referem-se á parte elementar da Geometria analytica. A sua escolha foi feita, como nos volumes anteriores, com um grande cuidado.

Ch. Hermite : Sur la généralisation des fractions continues algébriques (Annali di Matematica, 1893).

— *S. Pincherle : Contributo alla generalizzazione delle frazioni continue (Mémorie della R. Accademia di Bologna, 1894).*

N'estas duas importantes memorias é estudado o problema seguinte : Dadas n series ordenadas segundo as potencias de uma variavel x , determinar os polynomios X_1, X_2, \dots, X_n dos gráos m_1, m_2, \dots, m_n de modo que seja

$$S_1 X_1 + S_2 X_2 + \dots + S_n X_n = S_x^{m_1 + m_2 + \dots + m_n + n - 1},$$

onde S é uma serie da mesma natureza que as séries dadas S_1, S_2 , etc.

E. Picard : Sur l'inversion des intégrales des fonctions à multiplicateurs (American Journal of Mathematics, t. XVI).

O auctor resolve a questão seguinte :

Representando por $f(x, y) = 0$ uma relação algebrica e por

$h(x, y)$ uma função racional de x e y , em que casos a equação

$$u = \int^{(x, y)} e^{\int^{(x, y)} h(x, y) dx} dx$$

dá para x e y funções uniformes de u ?

E. Picard : *Sur une équation aux dérivées partielles de la théorie de la propagation de l'électricité* (*Bulletin de la Société mathématique de France*, 1894).

O auctor estuda, por meio do methodo geral de Riemann, a equação ás derivadas parciaes

$$\frac{d^2 U}{dt^2} - \frac{d^2 U}{dx^2} = U.$$

R. Marcolongo : *Sopra due moti di Poinsot concordanti* (*Annali di Matematica*, 1894).

E. Lemoine : *Notes de Géométrie* (*Association française pour l'avancement des sciences*, 1893).

— *Application au tétraèdre de la transformation continue* (*Item*).
 — *Complements de Géométriographie* (*Item*).

G. de Longchamps : Notice nécrologique sur E. Catalan (Journal de Mathématiques élémentaires, 1894).

— *L'arithmétique avec les figures négatives (Association française pour l'avancement des sciences, 1893).*

— *Un théorème de Géométrie des masses (Item).*

— *L'espace infinitésimal autour d'un point d'inflexion (Item).*

— *Sur le trisection.*

G. de Longchamps : Sur certaines généralisations de l'équation de Pell (Journal de Math. élémentaires, 1894).

— *Sur la construction des tangentes aux courbes et sur la tangente à l'atriphtaloïde (Item).*

Gino Loria : Studi intorno alla logistica greco-egiziana (Giornale di Matematiche, Napoli, t. XXXII).

— *La logique mathématique avant Leibnitz (Bulletin des sciences mathématiques, 1894).*

P. Gunther : Die Untersuchungen von Gauss in der Theorie der elliptischen Functionen (Nach. der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1894).

— *Partialbruchzerlegungen in der theorie der elliptischen Functionen (Journal für die reine und ang. Mathematik, t. 113).*

M. Lerch : Nouvelle analogie de la série théta et quelques séries hypergéométriques particulières de Heine.

— *Sur quelques théorèmes d'Arithmétique (Bulletin de la Société R. des Sciences de Prague, 1894).*

— *Sur une intégrale définie (Giornale di Mathematiche, Napoli, t. XXXI).*

Lampe : Zur mechanischen Quadratur (Verhandlungen der Gesellschaft Deutcher Naturforscher, 1893).

D. André : Sur le triangle des séquences (Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1894).

— *Sur le partage en quatre groupes des permutations des n premiers nombres (Bulletin de la Société mathématique de Paris, 1893).*

P. Pizzetti: Sulla espressione della gravità alla superficie del geoide, supposto ellissoidico (Rend. della R. Accademia dei Lincei, 1894).

G. B. Guccia : Una definizione sintetica delle curve polari (Rend. del Circolo mat. di Palermo, 1893).

G. Cantor : Sopra una questione elementare della teoria degli aggregati (Rivista di Matematica, 1893).

E. Cesàro : Sulla determinazione assintotica delle serie di potenze (Rend. delle R. Accademia di Napoli, 1893).

— *La serie di Lambert in Aritmetica assintotica (Item).*

— *Le formole di Codazzi negli iperspazi (Rend. della R. Accademia delle Scienze di Napoli, 1894).*

— *Sulla Geometria intrinseca degli spazi curvi (Atti delle R. Accademia delle Sienze di Napoli, 1894).*

- C. Burali-Forti : I numeri negativi (Rivista di Matematica, 1895).*
 — *Sulle classi derivate a destra e a sinistra (Atti della R. Accademia delle Science di Torino, 1894).*
 — *Sulle classi ordinate e i numeri transfiniti (Rend. del Circolo Math. di Palermo, 1894).*
-

- M. d'Ocagne : Sur la composition des lois d'erreurs de situation d'un point (Comptes rendus des séances de l'Acad. des Sciences de Paris, 1894).*
 — *Abaque général de la Trigonométrie sphérique (Bulletin astronomique 1894).*
-

- G. Vivanti : Theorie degli Aggregati (Rivista di Matematica, Torino, 1894).*
-

- C. A. Laisant : Sur les tableaux de sommes (Association française pour l'avancement des sciences, 1893).*
 — *Figuration graphique de quelques nombres combinatoires. (Item).*
 — *Principes de la méthode de M. Arnoux concernant l'étude des espaces arithmétiques hypermagiques (Bulletin de la Société mathématique de Paris, 1894).*

G. T.

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Publica-se o *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* em fasciculos de 32 paginas. Cada 6 fasciculos formarão um volume de 192 paginas.

Preço de cada volume — 2\$400 réis.

A correspondencia relativa ao *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* deve ser dirigida para o Porto, rua de Costa-Cabral.

F. GOMES TEIXEIRA

Curso de Analyse infinitesimal

Tomo I (Calculo differencial);

Tomo II (Primeira parte do Calculo integral);

Tomo III (Segunda parte do Calculo integral).

Preço de cada volume — 2\$500 réis.

JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS

PUBLICADO

PELO

Dr. F. Gomes Teixeira

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo Professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.




VOL. XII—N.^o 3

COIMBRA

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE

1895



DI ALCUNE FORMOLE RELATIVE ALLA
FUNZIONE SFERICA $P_n(x)$

NOTA DI

DAVIDE BESSO

Professore nella Università di Modena

L'equazione differenziale lineare omogenea del second ordine

$$R_2 y'' + R_1 y' + R_0 y = 0$$

si può, come è noto, trasformare nella

$$(θ R_2 y' + (θ (R_1 - R'_2) - θ' R_2) y)' + ψ y = 0$$

in cui $θ$ significa una funzione arbitraria, ed è

$$ψ = R_2 θ'' + (2R'_2 - R_1) θ' + (R_0 - R'_1 + R_2'')θ.$$

Ed in modo analogo si può trasformare un'equazione differenziale lineare omogenea d'ordine qualunque.

Questa trasformazione è applicata, nella presente Nota, alla dimostrazione d'alcune formole conosciute, e forse di qualche altra, che si riferiscono alla funzione sferica $P_n(x)$.

1. Dall'equazione

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0 \quad \text{I}$$

che, per n intero e positivo, è soddisfatta dalla $P_n(x)$, si deduce

$$\int \psi y dx = (1-x^2)(y\theta' - y'\theta) + \text{cost.} \quad \text{II}$$

in cui è

$$\psi = (1-x^2)\theta'' - 2x\theta' + n(n+1)\theta.$$

Posto

$$y = P_n(x), \quad \theta = 1,$$

risulterà

$$\int_0^a P_n(x) dx = \frac{1}{n(n+1)} \left(P'_n(0) - (1-a^2)P'_n(a) \right) \quad (1)$$

e in particolare

$$\int_0^1 P_n(x) dx = \frac{1}{n(n+1)} P'_n(0) = \begin{cases} 0 & \text{per } n \text{ pari} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cdot \frac{3 \cdot 5 \dots n}{n(n+1) \cdot 2 \cdot 4 \dots (n-1)} & \text{per } n \text{ dispari} (>1). \end{cases}$$

2. Colla sostituzione

$$\theta = P_m(x), \quad m \geq n,$$

si ha

$$\psi = [n(n+1) - m(m+1)] P_m(x),$$

e quindi

$$[n(n+1) - m(m+1)] \int_0^a P_m(x) P_n(x) dx = (1-a^2) [P_n(a) P_m'(a)$$

$$- P_n'(a) P_m(a)] - P_n(0) P_{m'}'(0) + P_n'(0) P_m(0) \quad (2)$$

e in particolare, supponendo che $m+n$ sia un numero pari,

$$\int_0^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0 \quad (3)$$

e, quando sia m pari ed n dispari (> 1),

$$\int_0^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{(-1)^{\frac{m+n-1}{2}}}{n(n+1)-m(m+1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \dots (m-1)}{2 \cdot 4 \dots m} \cdot \frac{3 \cdot 5 \dots n}{2 \cdot 4 \dots (n-1)} \quad (4)$$

3. Posto

$$\theta = x,$$

si trova

$$(n-1)(n+2) \int_0^a x P_n(x) dx = (1-a^2) [P_n(a) - a P_n'(a)] - P_n(0) \quad (5)$$

e quindi

$$\int_0^1 x P_n(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{per } n \text{ dispari } (>1) \\ \frac{(-1)^{\frac{n}{2}-1}}{(n-1)(n+2)} \frac{1 \cdot 3 \dots (n-1)}{2 \cdot 4 \dots n} & \text{per } n \text{ pari.} \end{cases}$$

E colla sostituzione

$$\theta = x^\mu, \quad \mu > 2,$$

si ottiene

$$\left. \begin{aligned} \mu(\mu-1) \int_0^a x^{\mu-2} P_n(x) dx + [n(n+1) - \mu(\mu+1)] \int_0^a x^\mu P_n(x) dx \\ = (1-a^2) [a^{\mu-1} P_n(a) - a^\mu P_n'(a)] \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Si ha quindi la relazione

$$\mu(\mu-1) \int_0^1 x^{\mu-2} P_n(x) dx = (\mu-n)(\mu+n+1) \int_0^1 x^\mu P_n(x) dx \quad (7)$$

mediante la quale, e i valori dell'integrale $\int_0^1 x^\mu P_n(x) dx$ per $\mu=0$ e per $\mu=1$, si otterrà la nota formula che dà il valore di quest'integrale per ogni valore intero e positivo di $\mu > n$; e, in particolare, per $n \geq 2r$,

$$\int_0^1 x^{n-2r} P_n(x) dx = 0. \quad (8)$$

La (7) non vale a determinare l'integrale per $\mu = n$. Ma si può arrivare al noto risultato mediante la formula che da quella si deduce

$$\left. \begin{aligned} \int_0^1 x^n P^n(x) dx &= \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2k (2n+3)(2n+5)\dots(2n+2k-1)}{(n+1)(n+2)\dots(n+2k-1)(n+2k)} \\ (2n+2k+1) \int_0^1 x^{n+2k} P_n(x) dx \end{aligned} \right\} (9)$$

cercando il limite a cui tende il secondo membro quando k tende all'infinito. A tale scopo osservo dapprima che la frazione, che ivi si trova, è eguale a

$$\frac{2 \cdot 4 \dots 2n}{(n+1)(n+2)\dots(2n+1)} \cdot \frac{(2n+2)(2n+3)\dots2k}{(2n+2)(2n+3)\dots2k} \cdot \frac{(2k+1)(2k+3)\dots(2k+2n-1)}{(2k+1)(2k+2)\dots(2k+n)},$$

epperò ha per limite

$$\frac{2 \cdot 4 \dots 2n}{(n+1)(n+2)\dots(2n+1)}.$$

Posto poi

$$P_n(x) = A_n x^n + A_{n-2} x^{n-2} + \dots + A_\lambda x^\lambda \quad \lambda = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$$

si ha

$$m \int_0^1 x^m P_n(x) dx = \frac{m}{m+n+1} A_n + \frac{m}{m+n-1} A_{n-1} + \dots$$

$$+ \frac{m}{m+\lambda+1} A_\lambda$$

e quindi

$$\lim [m \int_0^1 x^m P_n(x) dx]_{m=\infty} = A_n + A_{n-1} + \dots + A_\lambda = 1.$$

Preciò dalla (9) risulta

$$\int_0^1 x^n P_n(x) dx = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)}. \quad (10)$$

Mediante questa formola e la (8) e rammentando che il coefficiente di x_n nella $P_n(x)$ è

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n},$$

si ottiene quella di Legendre

$$\int_0^1 P_n^2(x) dx = \frac{1}{2n+1} \quad (11)$$

4. Colla sostituzione

$$\theta = \frac{1}{(1+gx^2)^\lambda}$$

si ha

$$\begin{aligned} \psi = & -\frac{4\lambda(\lambda+1)(g+1)}{(1+gx^2)^{\lambda+2}} + \frac{2\lambda[(2\lambda+1)g+4\lambda+1]}{(1+gx^2)^{\lambda+1}} \\ & + \frac{(n+2\lambda)(n-2\lambda+1)}{(1+gx^2)^\lambda}, \end{aligned}$$

e ponendo

$$\int_0^a \frac{P_n(x)}{(1+gx^2)^\lambda} dx = V_{\lambda, g, a},$$

si trova

$$\left. \begin{aligned} & -4\lambda(\lambda+1)(g+1)V_{\lambda+2, g, a} + 2\lambda[(2\lambda+1)g+4\lambda+1]V_{\lambda+1, g, a} \\ & + (n+2\lambda)(n-2\lambda+1)V_{\lambda, g, a} = -\frac{1-a^2}{(1+ga^2)^{\lambda+1}} [2\lambda ga P_n(a) \\ & + (1+ga^2)P'_n(a)] + P'_n(0) \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

Per $g = -1$ questa relazione diviene

$$\left. \begin{aligned} & 4\lambda^2 V_{\lambda+1, -1, a} + (n+2\lambda)(n-2\lambda+1)V_{\lambda, -1, a} = \frac{1}{(1-a^2)^\lambda} [2\lambda a P_n(a) \\ & - (1-a^2)P'_n(a)] + P'_n(0). \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Posto anche

$$a=1, \quad \lambda = -\frac{2r+1}{2} \quad (r \geq 0)$$

e

$$V_{-\frac{2r+1}{2}, -1, 1} = \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{2r+1}{2}} P_n(x) dx = T_r,$$

si ottiene

$$(2r+1)^2 T_{r-1} + (n-2r-1)(n+2r+2) T_r = P'_n(0) \quad (14)$$

dalla quale, per n dispari (> 1), risulta

$$T_{\frac{n-3}{2}} = \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{n}{2}-1} P_n(x) dx = \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n^2} \cdot \frac{3 \cdot 5 \dots n}{2 \cdot 4 \dots (n-1)} \quad (15)$$

5. Dalla (14) si ricava, per n pari,

$$T_{r-1} = \frac{(2r-n+1)(2r+n+2)}{(2r+1)^2} T_r$$

e quindi

$$\begin{aligned}
 T_{-1} &= \int_0^1 \frac{P_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{(-n+1)(n+2)}{1^2} T_0 \\
 &= \frac{(-n+1)(n+2)(-n+3)(n+4)}{1^2 \cdot 3^2} T_1 \\
 &= \frac{(-n+1)(n+2)(-n+3)(n+4) \dots (-n+2r+1)(n+2r+2)}{1^2 \cdot 3^2 \dots (2r+1)^2} T_r \\
 &= (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots n} \cdot \frac{(2r+4)(2r+6) \dots (2r+n+2)}{(2r-n+3)(2r-n+5) \dots (2r+1)} \\
 &\quad \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2r+2)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2r+1)} T_r
 \end{aligned} \tag{16}$$

dalla quale risulta

$$\int_0^1 \frac{P_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots n} \lim \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2r+2)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2r+1)} T_r \right)_{r=\infty} \tag{16'}$$

Ora, posto

$$\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2r+2)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2r+1)} = \Omega_r \quad \text{e} \quad \Omega_r \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{2r+1}{2}} x^{2k} dx = U_{r,k},$$

si ha

$$U_{r,0} = \frac{\pi}{2}, \quad U_{r,k+1} = U_{r,k} - \frac{\Omega_r}{\Omega_{r+1}} U_{r+1,k}$$

e, in conseguenza, qualunque sia l'intero positivo k ,

$$\lim (\mathbf{U}_{r,k})_{r=\infty} = 0.$$

Risulta da ciò che, indicando con $\mathbf{L}(x^2)$ qualsivoglia funzione intera di x^2 , si ha

$$\lim \left[\Omega_r \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{2r+1}{2}} \mathbf{L}(x^2) dx \right] = \frac{\pi}{2} \mathbf{L}(0),$$

e in particolare, per n pari,

$$\lim (\Omega_r \mathbf{T}_r) = \frac{\pi}{2} \mathbf{P}_n(0) = \frac{\pi}{2} (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{1.3.5\dots(n-1)}{2.4.6\dots n}.$$

Sostituendo questo valore nella (16') si ottiene la formula

$$\int_0^1 \frac{\mathbf{P}_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left(\frac{1.3.5\dots(n-1)}{2.4.6\dots n} \right)^2 \frac{\pi}{2} \quad (17)$$

che è stata trovata per tutt'altra via dal *Bauer* (*), e pure per via diversa, dimostrata del *Catalan* (**).

(*) *Giornale di Crelle* — Tomo LVI, anno 1859, pag. 110.

(**) *Sur les fonctions X_n de Legendre, second Mémoire* (présenté à la classe des sciences dans la séance du 6 août 1881) pag. 82.

6. Posto

$$\theta = \log \frac{1+x}{1-x}$$

e quindi

$$\psi = n(n+1) \log \frac{1+x}{1-x},$$

si trova

$$n(n+1) \int_0^a P_n(x) \log \frac{1+x}{1-x} dx = 2P_n(a) - (1-a^2) P'_n(a) \log \frac{1+a}{1-a} - 2P_n(0) \quad (18)$$

e, in particolare,

$$\int_0^1 P_n(x) \log \frac{1+x}{1-x} dx = \frac{2}{n(n+1)} - \frac{2}{n(n+1)} P_n(0). \quad (19)$$

Colla posizione

$$\theta = \log(1-x^2)$$

che dà

$$\psi = n(n+1) \log(1-x^2) - 2,$$

e applicando la formola (1), si ottiene

$$\int_0^a P_n(x) \log(1-x^2) dx = \frac{2}{n^2(n+1)^2} [P'_n(0) - (1-a^2) P'_n(a)] - \frac{1}{n(n+1)} [(1-a^2) P'_n(a) \log(1-a^2) + 2a P_n(a)] \quad (20)$$

la quale, per $a = 1$, diviene

$$\int_0^1 P_n(x) \log(1-x^2) dx = \frac{2}{n^2(n+1)^2} P'_n(0) - \frac{2}{n(n+1)} \quad (21)$$

Dalle (18) (20) si ricava, per n pari

$$\left. \begin{aligned} \int_{-a}^a P_n(x) \log(1+x) dx &= -\frac{1-a^2}{n(n+1)} P'_n(a) \\ &\quad \left[\frac{2}{n(n+1)} + \log(1-a^2) \right] - \frac{2a}{n(n+1)} P_n(a) \\ \text{e, per } n \text{ dispari,} \\ \int_{-a}^a P_n(x) \log(1+x) dx &= -\frac{1-a^2}{n(n+1)} P'_n(a) \log \frac{1+a}{1-a} \\ &\quad + \frac{2}{n(n+1)} P_n(a) \end{aligned} \right\} (22)$$

Quale caso particolare della (22) si ha la formola

$$\int_{-1}^1 P_n(x) \log(1+x) dx = (-1)^{n-1} \frac{2}{n(n+1)} \quad (23)$$

che è stata trovata per altra via del *Catalan* (*).

(*) *Sur les fonctions X_n de Legendre, premier Mémoire* (présenté à la classe des sciences dans la séance du 5 octobre 1879), pag. 58.

3. È noto che l'equazione differenziale

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + m(m+1)y = 0 \quad I'$$

è soddisfatta, per m intero e positivo, dalla funzione

$$P_m(x) \log \frac{1+x}{1-x} + R_{m-1}(x),$$

in cui $R_{m-1}(x)$ significa una funzione intera di x del grado $(m-1)$ la quale contiene le sole potenze pari o le sole potenze dispari di x . Perciò posto

$$\theta = P_m(x) \log \frac{1+x}{1-x} + R_{m-1}(x),$$

sarà

$$\psi = [n(n+1) - m(m+1)]^\theta,$$

e dall'equazione fondamentale II risulterà

$$\left. \begin{aligned} & (n-m)(n+m+1) \int_0^1 P_n(x) P_m(x) \log \frac{1+x}{1-x} dx + (n-m)(n+m+1) \int_0^1 P_n(x) R_{m-1}(x) dx \\ & = -P_n(0) [2P_m(0) + R'_{m-1}(0)] + P'_n(0) R_{m-1}(0) + 2 \end{aligned} \right\} (24)$$

Se ora supponiamo m dispari ed n pari e $> m-1$, sarà $R_{m-1}(x)$ una somma di termini della forma $C_r x^r$ con r pari e $< n$, epperò sarà eguale a zero il secondo integrale del primo membro; e si

conchiuderà

$$\int_0^1 P_n(x) P_m(x) \log \frac{1+x}{1-x} dx = \frac{2}{(n-m)(n+m+1)}. \quad (25)$$

S. La nota equazione

$$k(1-k^2) \frac{d^2y}{dk^2} + (1-3k^2) \frac{dy}{dk} - ky = 0,$$

soddisfatta dall'integrale ellittico completo di modulo k , si tras-

forma, colla sostituzione

$$k = \sqrt{\frac{1-x}{2}},$$

nella stessa I, quando vi si ponga $n = -\frac{1}{2}$. Perciò posto

$$\theta = K \left(\sqrt{\frac{1-x}{2}} \right),$$

si ottiene

$$\psi = \left(\frac{2n+1}{2} \right)^2 K \left(\sqrt{\frac{1-x}{2}} \right),$$

e dalla II si ricava

$$\left(\frac{2n+1}{2} \right)^2 \int_0^a P_n(x) K\left(\sqrt{\frac{1-x}{2}}\right) dx = -(1-a^2) \left[\frac{P_n(a) K'\left(\sqrt{\frac{1-a}{2}}\right)}{2\sqrt{2}\sqrt{1-a}} \right. \\ \left. + P'_n(a) K\left(\sqrt{\frac{1-a}{2}}\right) \right] + \frac{1}{2\sqrt{2}} P_n(0) K'\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + P'_n(0) K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Applicando ora la formola che dà la K' in funzione di K e di E , ed osservando che, dalla relazione

$$KE_1 + K_1 E - KK_1 = \frac{\pi}{2}$$

risulta

$$E\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{2} K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)},$$

la precedente diviene

$$\left. \begin{aligned} & \left(\frac{2n+1}{2} \right)^2 \int_0^a P_n(x) K\left(\sqrt{\frac{1-x}{2}}\right) dx = P_n(a) \left[\frac{1+a}{2} K\left(\sqrt{\frac{1-a}{2}}\right) \right. \\ & \left. - E\left(\sqrt{\frac{1-a}{2}}\right) \right] - (1-a)^2 P'_n(a) K\left(\sqrt{\frac{1-a}{2}}\right) + P_n(0) \frac{\pi}{4K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)} \\ & + P'_n(0) K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

e in particolare

$$\left(\frac{2n+1}{2}\right)^2 \int_0^1 P_n(x) K\left(\sqrt{\frac{1-x}{2}}\right) dx = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{P_n(0)}{K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)} + P'_n(0) K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

ossia

$$\int_0^1 P_n(x) K\left(\sqrt{\frac{1-x}{2}}\right) dx = \begin{cases} (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{\pi}{(2n+1)^2} \frac{1 \cdot 3 \dots (n-1)}{2 \cdot 4 \dots n} \frac{1}{K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{4}{(2n+1)^2} \frac{3 \cdot 5 \dots n}{2 \cdot 4 \dots (n-1)} K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{cases} \quad (27)$$

SOBRE OS COEFFICIENTES DA SERIE DE FOURIER

POR

J. BRUNO DE CABEDO

Professor da Universidade de Coimbra

Consideremos as formulas

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi} a_0 + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx) \quad (1)$$

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi} a'_0 + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} (a'_m \cos mx + b'_m \sin mx) \quad (2)$$

$$a_m = \int_{x_0}^X \varphi(x) \cos mx dx, \quad b_m = \int_{x_0}^X \varphi(x) \sin mx dx,$$

$$a'_m = \int_{x_0}^X \psi(x) \cos mx dx, \quad b'_m = \int_{x_0}^X \psi(x) \sin mx dx,$$

e supponhamos que as funcções $\varphi(x)$ e $\psi(x)$ satisfazem no intervallo (x_0, X) às condições de Dirichlet.

Se o segundo membro da primeira equação, por exemplo, for uniformemente convergente no intervallo considerado, attendendo

a que é finito o integral $\int_{x_0}^X |\psi(x)| dx$, vem immediatamente (*), multiplicando por $\psi(x)$ e integrando

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^X \varphi(x) \psi(x) dx = & \frac{1}{2\pi} a_0 \int_{x_0}^X \psi(x) dx + \frac{1}{\pi} \sum_1 \left[a_m \int_{x_0}^X \psi(x) \cos mx dx \right. \\ & \left. + b_m \int_{x_0}^X \psi(x) \sin mx dx \right] \end{aligned}$$

ou

$$\int_{x_0}^X \varphi(x) \psi(x) dx = \frac{1}{2\pi} a_0 a'_0 + \frac{1}{\pi} \sum_1 (a_m a'_m + b_m b'_m). \quad (3)$$

Se nenhum dos segundos membros de (1) e (2) é uniformemente convergente em todo o intervallo (x_0, X) , ainda tem lugar a relação que acabo de apresentar.

Com efeito, decomponha-se este intervallo em um determinado numero de intervallos (α, β) tales que o segundo membro de (1), por exemplo, seja uniformemente convergente nos dominios que se obtêm isolando um dos pontos extremos α e β .

Como, para as series de Fourier, esta decomposição é sempre possível, a generalidade da formula precedente acha-se demonstrada, fazendo ver que é

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \psi(x) dx = & \frac{1}{2\pi} a_0 \int_{\alpha}^{\beta} \psi(x) dx + \frac{1}{\pi} \sum_1 \left[a_m \int_{\alpha}^{\beta} \psi(x) \cos mx dx \right. \\ & \left. + b_m \int_{\alpha}^{\beta} \psi(x) \sin mx dx \right] \end{aligned}$$

(*) Gomes Teixeira, *Curso de Analyse*, tom. II, pag. 88.

ou, (*) designando por γ um dos numeros α e β , uniformemente convergente a serie

$$\frac{1}{\pi} a_0 \int_{\gamma}^t \psi(x) dx + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \left[a_m \int_{\gamma}^t \psi(x) \cos mx dx + b_m \int_{\gamma}^t \psi(x) \sin mx dx \right] \quad (4)$$

no dominio (α, β) da variavel t .

Para isto, note-se que existe um numero positivo A , independente de m e t , para o qual é (**)

$$\left| a_m, b_m \right| < \frac{A}{m}, \quad \left| \int_{\gamma}^t \psi(x) (\cos mx, \sin mx) dx \right| < \frac{A}{m}.$$

Logo, tem logar a relacao

$$\left| \frac{1}{\pi} \sum_n \left[a_m \int_{\gamma}^t \psi(x) \cos mx dx + b_m \int_{\gamma}^t \psi(x) \sin mx dx \right] \right| < \frac{1}{\pi} \sum_n \frac{2A^2}{m^2},$$

da qual se conclue a uniformidade de convergencia da serie (4) em toda a extensao do intervallo (α, β) .

Fazendo em (3) $\varphi(x) = \psi(x)$, vem a formula

$$\int_{x_0}^X \varphi^2(x) dx = \frac{1}{2\pi} a_0^2 + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} (a_m^2 + b_m^2)$$

(*) Gomes Teixeira, op. cit., tom. II, pag. 92.

(**) Picard, *Traité d'Analyse*, tom. I, pag. 233.

ou

$$\frac{1}{\pi} \int_{x_0}^X \varphi^2(x) dx - \frac{1}{4\pi^2} a_0^2 = \frac{1}{4\pi^2} a_0^2 + \frac{1}{\pi^2} \sum_1 (a_m^2 + b_m^2)$$

que dá o valor da serie formada pelos quadrados dos coeffientes de uma serie de Fourier.

BIBLIOGRAPHIA

E. Picard: Traité d'Analyse, t. II, Paris, G. Villars, 1893.

Quem observa o movimento scientifico moderno, na parte que se refere ás sciencias mathematicas, nota, com verdadeiros sentimentos de satisfação, que muitos dos geometras mais eminentes, que com suas descobertas e trabalhos originaes mais concorrem para o progresso d'aquellas sciencias, tomam sobre si tambem o encargo de em obras didacticas divulgar as suas descobertas e as dos outros geometras, fazendo assim á sciencia um serviço consideravel. É com estes sentimentos de satisfação que se abre a obra do sr. Picard.

Do 1.^o volume d'esta obra importante deu-se noticia na pagina 106 do t. x d'este jornal.

O volume 2.^o abre por douz capitulos muito interessantes, em que o auctor expõe a theoria das funcções de variaveis complexas pelo methodo de Riemann. Sabe-se que as funcões de variaveis reaes u e v que entram n'uma função analytica $u + iv$ de uma variavel complexa $x + iy$, satisfazem á equação ás derivadas parciaes de Laplace

$$\frac{d^2 U}{dx^2} + \frac{d^2 U}{dy^2} = 0$$

quando substituidas no logar de U . D'esta circumstancia resulta que as propriedades da função $u + iv$ podem ser deduzidas das propriedades dos integraes d'esta ultima equação. O sr. Picard estuda porisso as propriedades dos integraes d'esta equação, por um methodo analogo ao que tinha empregado para o estudo dos integraes da equação de Laplace a tres variaveis, no tomo I da mesma obra, e tira d'estas propriedades as propriedades da

funcção $u + iv$. N'estes mesmos capitulos são estendidos os resultados obtidos para a equação de Laplace a outras equações ás derivadas parciaes lineares de segunda ordem mais geraes. Com a doutrina d'estes capitulos está ligada a doutrina dos capitulos III e IV, onde são expostos os bellos e importantes trabalhos dos srs. Schwars e Poincaré sobre a resolução do problema de Dirichlet no caso do espaço a duas dimensões; no capitulo I tinha já sido dado o methodo de Neumann para o mesmo fim.

No capitulo V é estudada a theoria das funcções analyticas pelos methodos classicos de Cauchy. No capitulo VI faz o sr. Picard applicação do theorema de Cauchy, que serve de base á theoria dos residuos, á determinação de alguns integraes definidos, ao desenvolvimento das funcções em serie de funcções racionaes, á theoria das equações e á theoria das series periodicas. Esta ultima applicação constitue a parte mais importante d'este capitulo. O sr. Picard estuda ahi profundamente o methodo dado por Cauchy para obter a serie de Fourier e outras series analogas, dando-lhe todo o rigor e clareza.

No capitulo VII occupa-se o auctor da representação por integraes duplos do numero de raizes communs a duas equações simultaneas. N'elle expõe o sr. Picard os trabalhos de Kronecker e os seus proprios sobre este assumpto interessante.

No capitulo VIII é exposta com a maior clareza a theoria dos integraes das funcções não uniformes.

No capitulo IX são estudadas as funcções analyticas de muitas variaveis independentes. Assignaremos em especial n'este capitulo a extensão, devida ao sr. Poincaré, do theorema de Cauchy, relativo aos integraes tomados ao longo dos circuitos fechados, aos integraes multiplos de muitas variaveis.

No capitulo X é estudada a representação conforme, e é completada a exposição do methodo de Schwars para a resolução do problema de Dirichlet, o qual é fundado no problema da representação conforme.

Nos capitulos XI e XII são estudados os theoremas geraes sobre a existencia dos integraes das equações differenciaes. Encontram-se n'este capitulo as demonstrações dadas por Cauchy do theorema fundamental da theoria das equações differenciaes, e a demonstração, tão simples, d'este theorema, para o caso das variaveis reaes, que o auctor tinha encontrado pouco tempo antes da publicação d'este volume da sua obra.

Nos capitulos XIII a XVII é feito o estudo das funcções algebraicas, das superficies de Riemann, dos integraes abelianos, etc. Este estudo difficult é feito com a maior clareza e de modo a vêr-se que o papel que as superficies de Riemann representam na theoria das funcções multiformes é fundamental e não se reduz a simplificar a exposição da theoria das funcões algebraicas.

São estes, em resumo, os assumptos de que o sr. Picard se occupa no tomo II da sua obra. Só nos resta accrescentar que a elegancia da exposição, a profundeza com que são considerados os assumptos, a originalidade, quer no fundo, quer na forma, que se encontra em muitas passagens em que o auctor expõe os resultados das suas proprias descobertas, a feliz escolha dos assumptos considerados, todos interessantes pela variedade das combinações analyticas e profundeza de methodos a que dão origem, collocam a obra do eminent geometra entre as mais bellas obras d'Analyse.

*Ch. Méray : Leçons nouvelles sur l'Analyse infinitesimal, Paris,
G. Villars, 1894.*

N'um pequeno volume, publicado em 1872, com o titulo de *Nouveau Précis d'Analyse infinitesimal*, expoz o sr. Méray, de um modo muito differente do que então era usado, as theorias da Analyse infinitesimal. Seguindo uma ideia outr'ora apresentada por Lagrange, o auctor reduz toda a Analyse infinitesimal á theoria das funcões que podem ser desenvolvidas em series inteiras. As funcões que não estão n'estas condições são por elle systematicamente postas de parte, e para justificar esta exclusão funda-se na circumstancia de não terem ellas applicação alguma no estudo dos phenomenos physicos. Para constituir debaixo d'este ponto de vista a Analyse, estuda o auctor as propriedades das series inteiras e os diversos algorithmos que dão origem a funcões que possam ser desenvolvidas em series inteiras.

As ideias apresentadas no *Nouveau Précis* não chamaram a principio a attenção que mereciam, e foi necessario que passassem annos e que muitos pontos de vista apresentados pelo auctor d'este

opusculo fossem novamente encontrados por outros geometras para que fosse notado o trabalho do sr. Méray.

Aproveitando a corrente favoravel ás suas ideias, que se vae manifestando, e fortalecido por novos estudos feitos no longo intervallo de tempo que vae desde a publicação do seu opusculo até á epocha actual, o auctor vem de principiar a publicação de uma obra consideravel sobre a Analyse infinitesimal e suas applicações geometricas, onde as doutrinas serão expostas segundo o seu modo de considerar esta sciencia.

A obra constará de quatro volumes, dos quaes acaba de ser publicado o primeiro. N'elle são estudados os principios geraes da theoria das funcções e os algorithmos geraes que dão origem a funcões no sentido considerado pelo auctor, ficando para os volumes seguintes as applicações geometricas e o estudo das funcões especiaes. O estudo a que nos estamos referindo é sempre feito com a maior generalidade possivel, não separando o auctor o caso das variaveis reaes do caso das variaveis imaginarias, nem o caso de uma só variavel do caso de muitas variaveis.

Abre a obra por uma exposição muito clara da theoria dos numeros fraccionarios, dos numeros negativos, dos numeros irracionaes e dos numeros complexos. Estas diferentes especies de numeros são introduzidos como symbolos necessarios para tornar possiveis todas as operaçoes da Álgebra. O methodo empregado para a exposição da theoria dos numeros irracionaes coincide com o que se attribue a Heine; o auctor faz porém notar no prefacio que, antes de Heine, o havia elle já publicado na *Revue des Sociétés savantes*, em 1869.

Estuda em seguida o auctor as propriedades geraes das series e as propriedades especiaes das series inteiras, e munido com estes conhecimentos passa ao estudo das propriedades geraes das funcões consideradas no sentido a que já nos referimos, isto é, das funcões representaveis na vizinhança de cada ponto por series inteiras. Este estudo leva o auctor á noção importante de prolongamento de uma funcão definida por uma serie inteira fóra do circulo de convergencia d'esta serie, noção que os trabalhos do sr. Weierstrass tornaram classica, mas cuja primeira ideia parece pertencer ao sr. Méray.

As doutrinas a que nos estamos referindo ocupam a primeira metade do volume.

A outra metade é dedicada ao estudo das condições de exis-

tencia e propriades geraes das funcções dadas por integraes das equações differenciaes ou das equações ás derivadas parciaes, estudo que é feito de uma maneira muito completa e profunda. Um capitulo especial é consagrado tambem á theoria das funcções implicitas, cujo estudo o auctor liga com o estudo da theoria das equações differenciaes.

Terminando esta rapida noticia devemos dizer que, pelos pontos de vista novos que encerra e pelo modo largo e geral como são considerados os assumptos, a obra do sr. Méray parece-nos extremamente digna da attenção dos geometras.

Ch. Henry: Abrégé de la théorie des fonctions elliptiques, Paris, Nony, 1895.

Contém este opusculo um resumo da parte mais essencial da theoria das funcções ellypticas.

Na exposição do assumpto o auctor dá o primeiro logar ás notações de Weierstrass; não deixa porém de relacionar com ellas e de estudar depois as notações de Jacobi e Abel, habilitando d'este modo para a leitura dos trabalhos em que são empregadas umas e outras notações.

É dividido o opusculo em quatro partes, sendo na primeira estudados alguns principios geraes da theoria das funcções duplamente periodicas; na segunda as funcções pu , ζu , σu de Weierstrass; na terceira as funcções $sn u$, $cn u$, $dn u$; na quarta as funcões ϕ de Jacobi. De todas estas funcões são estudadas as propriedades mais importantes. Para introduzir a funcão pu , o auctor recorre á serie dupla de Weierstrass; as funcões ζu e $\log \sigma u$ são definidas por integrações de pn e ζu ; as outras funcões consideradas são definidas pelas suas relações com as anteriores.

A clareza com que está exposto o assumpto torna este opusculo muito proprio para o primeiro estudo dos principios mais essenciaes da theoria das funcões ellipticas.

E. Pascal: Lezioni di Calcolo infinitesimale, Milano, Hoepli, 1895.

A parte mathematica da importante collecção de manuaes publicados pela livraria Hoepli, de Milão, acaba de ser enriquecida com mais dous volumes. Um d'elles é dedicado ao Calculo differential, o outro ao Calculo integral e são devidos ao illustre professor na Universidade de Pisa, sr. E. Pascal.

Os assumptos que estes livros contêm são aquelles que o auctor ensina no seu curso, e são elles os que se costumam ensinar n'un curso regular de calculo infinitesimal. Percorrendo-os com cuidado vê-se que estão escriptos com a maior clareza e com aquelle rigor de que o auctor tem tão bons exemplos dentro do seu paiz nos trabalhos de Dini, Peano, etc. Todos os principios, todas as observações, que hoje se julgam indispensaveis para dar á Analyse infinitesimal o rigor que deve ter, são n'estes livros cuidadosamente apresentadas, e isto é feito de tal modo que nem a clareza nem a precisão são jámais sacrificadas.

O primeiro volume está dividido em seis capitulos dedicados aos assumptos seguintes :

I Funcções reaes de variaveis reaes (principios geraes, limite das funcções, continuidade, etc.). II Derivada das funcções. III Desenvolvimento das funcções em series. IV Estudo do andamento de uma função na vizinhança de um ponto (maximos e minimos, etc.). V Algumas applicações analyticas (indeterminações, determinantes funcionaes, etc.). VI Applicações geometricas (tangentes, curvatura, contato, envolventes, etc.).

O segundo volume contém os assumptos seguintes :

I Integraes definidos e indefinidos. II Integrabilidade das funcções. III Calculo dos integraes definidos e indefinidos. IV Integraes multiplos. V Integrações das differenciaes totaes. VII Equações diferenciaes.

G. Maupin : Questions d'Algèbre, Paris, 1895.

A collecção de questões d'Algebra, que acaba de publicar o sr. Maupin, offerece um interesse que não se encontra ordinaria-

mente nas collecções d'esta natureza. Este interesse resulta da boa escolha que o auctor fez das questões que apresenta (que são sempre relativas a assumptos que prendem a attenção e para obter muitas das quaes o auctor recorreu ás obras dos grandes mestres da sciencia), da elegancia das soluções e das informações historicas que acompanham muitas d'ellas. Todo o alumno que resolver todas as questões apresentadas, terá adquirido no fim grande desenvolvimento no manejo dos methodos da Algebra e grande copia de conhecimentos uteis. Os professores mesmo encontrarão decerto n'este livro informações e resultados que os interessarão.

Das questões apresentadas, cujo numero é superior a 1:300, muitas são resolvidas pelo auctor, outras são simplesmente enunciadas. Referem-se á analyse combinatoria, á theoria dos logarithmos, dos imaginarios, das series, dos infinitamente pequenos, das derivadas, dos maximos e minimos, dos determinantes, das fracções racionaes, á resolução numerica das equações, aos integraes definidos e indefinidos, ás applicações geometricas do Calculo infinitesimal, ás fracções continuas, á interpolação, á theoria das probabilidades, etc.

*B. Niewenglowski: Cours de Géométrie Analytique, t. I, Paris,
G. Villars, 1894.*

A obra, cujo titulo acabamos de indicar, constará de tres volumes, sendo o primeiro dedicado á linha recta, ao circulo e a uma parte da theoria das conicas, o segundo á theoria geral das curvas planas e á continuaçao da theoria das conicas e o terceiro á Geometria a tres dimensões.

O primeiro volume acaba de ser publicado. As doutrinas que encerra estão dispostas em vinte capitulos, onde são considerados os assumptos seguintes :

I Preliminares. II Linha recta. III Coordenadas homogeneas. Coordenadas trilineares. IV Invariantes. V Feixes de rectas. VI Circulo. VII Logares geometricos. VIII Curvas do segundo grau. IX Theoria do Centro. X. Theoria dos diametros. XI Reducção da equação do segundo grau, com eixos rectangulares,

XII Comprimento dos eixos de uma conica. Theorema de Apollonius. XIII Figuras homotheticas. Figuras semelhantes. XIV Theoria das tangentes e das normaes. XV Theoria das envelopentes. XVI Pólos e polares. XVII Curvas polares reciprocas. XVIII Curvas passando por pontos dados ou tangentes a rectas dadas. XIX Theoria dos fócos. XX Secantes communs a duas conicas.

Entre estes assumptos encontram-se todos os que fazem parte dos programmas de Geometria analytica das nossas escolas e muitos outros; por isso os alumnos do primeiro anno dos nossos cursos superiores de Mathematica encontrarão no livro que acaba de publicar o sr. Niewenglowski um excellente auxiliar para os seus estudos, os professores um excellente modelo para o seu ensino.

Z. G. de Galdeano: Geometria general, Zaragoza, 1895.

Está publicada a primeira parte d'esta obra, que é consagrada á exposição e critica dos theoremas e problemas fundamentaes em geometria e dos methodos geometricos. É um trabalho interessante, em que o illustre professor da Universidade de Saragoça expõe, debaixo de um ponto de vista ao mesmo tempo historico, philosophico e mathematico, tudo o que é fundamental na sciencia da extensão. Abre por uma introdução, em que o auctor segue rapidamente, debaixo do ponto de vista indicado, o movimento progressivo de aperfeiçoamento d'esta sciencia desde o tempo de Euclides até á actualidade. Vêm depois no livro 1.º estudos logico-mathematicos sobre os meios de raciocinar empregados em geometria e sobre a significação de certas palavras que esta sciencia vae buscar á Logica. Encontra-se aqui em particular um estudo da natureza dos methodos de indagação e de demonstração synthetico e analytico, estudo bastante desenvolvido na parte que se refere ao primeiro d'estes methodos, cujo papel no progresso da sciencia geometrica o auctor indica. No livro 2.º são estudados os diversos methodos de indagação geometrica. O auctor considera o metodo euclideano, o metodo trigonometrico, os methodos da geometria projectiva (methodos de Poncelet, de Möbius,

de Chasles, etc.), os methodos analytico geometricos (methodos de Argand, de Bellavitis, de Grassmann, de Hamilton, etc.).

V. Balbin: Tratado de Estereometria genetica, Buenos Ayres, 1895.

A Estereometria *genetica* é, como diz o auctor, uma extensão da geometria elementar no espaço, que ensina a gerar, segundo uma certa lei, todos os corpos geometricos elementares e muitos outros, e a calcular os seus volumes por meio de uma formula unica.

Ao corpo cujo estudo forma a base da Stereometria genetica chama o sr. Balbin *poliedroide*. Este corpo tem por base figuras situadas em planos paralelos; cada vertice (ou cada ponto) de uma das bases está ligado por meio de uma recta (ou por meio de uma curva de lei determinada) com o correspondente da outra base, ou com o correspondente e o contiguo a este; e as suas faces lateraes são geradas por uma recta que se move apoiando-se sobre duas arestas contiguas e conservando-se parallela aos planos das bases.

A Stereometria genetica tem sido unicamente estudada na Alemanha, onde têm sido publicados varios trabalhos a respeito d'ella. No presente volume expõe o auctor tudo o que de mais importante se tem publicado a este respeito, completando-o com as suas proprias indagações. Com esta publicação fez o sr. Balbin um bom serviço, tornando este ramo da geometria elementar accessivel a muitos que não conhecem a lingua alema.

V. Balbin: Geometria plana moderna, Buenos Ayres, 1894.

Este opusculo é a traducção de outro, publicado em inglez pelos srs. G. Richardson e A. Ramsey, com o titlno de *Modern plane geometry*. É uma continuaçao dos *Elementos* de Euclides e ao mesmo tempo um livro de preparaçao para o estudo da Geometria descriptiva das conicas e dos pontos imaginarios, redigido segundo um programma para o desenvolvimento do ensino da

Geometria plana, elaborado pela Associação Britannica. São estudados n'elle as propriedades do triangulo, do quadrilatero completo, de um ou mais circulos, os maximos e minimos geometricos, as relações inharmonicas, a involução, as polares reciprocas, a theoria das projecções, etc. Todos estes assumptos são considerados debaixo do ponto de vista elementar, de modo a poderem ser estudados pelos que conhecem sómente os Elementos de Geometria. É um livro de uma utilidade incontestável, pela natureza dos assumptos que encerra e pela clareza com que está escrito; por isso o sr. Balbin fez um bom serviço traduzindo-o para a lingua hespanhola.

Ch. Brisse : Cours de Géométrie descriptive à l'usage des élèves de l'enseignement secondaire moderne, Paris, G. Villars, 1895.

O presente livro é um guia excelente para principiar o estudo da Geometria descriptiva. Não contém todos os assumptos do programma para o ensino da Geometria descriptiva nas nossas Escolas Polytechnicas; todavia pôde ser consultado com grande vantagem pelos alumnos d'estas escolas, para o estudo da parte do programma que n'elle se encontra.

Está dividido o volume em duas partes. Na primeira parte são estudados, os principios geraes, o methodo das rotações e dos rebatimentos, e a Geometria descriptiva da recta e do plano. Na segunda parte são considerados o cone, o cylindro e as superficies de resolução. N'um appendice são apresentadas as primeiras noções de perspectiva.

As figuras estão dispostas no texto, o que facilita muito a leitura d'este volume.

F. Castellano : Lezioni di Meccanica razionale, Torino, 1894.

A litteratura mathematica italiana está sendo continuadamente enriquecida com obras didacticas excellentes, relativas aos diversos

ramos d'esta sciencia. Entre estas podemos collocar o *Manual de Mechanica racional*, que acaba de publicar o sr. Castellano, professor na Real Academia militar de Turin. Contém os assumptos que constituem o programma de um curso regular de Mechanica racional, e estes são n'elle expostos com a maior clareza e simplicidade.

Para dar uma ideia da natureza dos assumptos considerados n'esta obra e da sua disposição, vamos dizer o objecto de cada um dos vinte e um capitulos em que ella está dividida :

I Movimento de um ponto. Velocidade. Acceleração. II Cinematica dos systemas de fórmula invariavel. III Movimento de rotação de um corpo á roda de um ponto. IV Movimento composto. V Movimento geral de um corpo. VI Forças applicadas a um ponto. Statica do ponto. VII Dynamica do ponto livre. VIII Dynamica do ponto não livre. Movimento de um ponto sobre uma linha. IX Movimento do ponto sobre uma superficie. X Attrito. XI Systemas materiaes. Calculo da massa. XII Centros de gravidade. XIII Momentos de inercia. XIV Statica dos systemas materiaes. Equilibrio dos systemas de forças. XV Equivalencia e reducção dos systemas de forças. XVI Equilibrio dos systemas ligados. XVII Polygonos funiculares. XVIII Dynamica dos systemas. Equações geraes do movimento de um sistema. XIX Dynamica dos systemas rigidos. XX Theoria das forças instantaneas, da percussão e do choque. XXI Princípio das velocidades virtuaes.

Na exposição o auctor faz largo uso da theoria dos vectores, a qual é resumidamente exposta n'uma introducção.

Cada capítulo é seguido por uma lista de exercícios bem escolhidos.

X. Antomari : *Cours de Mécanique*, Paris, Nony, 1895.

N'este pequeno volume são expostos de uma maneira muito simples e muito clara os primeiros principios de Mechanica racional.

Abre por um capítulo onde são estudados alguns principios de Geometria analytica a tres dimensões, dos quaes o auctor faz depois uso. Segue-se a Stática, a Cinematica e finalmente a Dy-

namica. Da Statica vem a theoria da composição das forças e dos binarios, o estudo do equilibrio do ponto e do solido invariavel, a theoria dos centros de gravidade, e a theoria das machinas chamadas simples. Da Cinematica vem a parte que se refere ao movimento do ponto. Da Dynamica vêm a theoria do movimento do ponto, a applicação d'esta theoria ao movimento dos projecteis e algumas noções geraes relativas á theoria das machinas em movimento.

Este livro é destinado aos candidatos á Escola militar de *Saint-Cyr*, e contém por isso só os assumptos exigidos para a entrada na referida Escola.

X. Antomari et C. Laisant: Questions de Mécanique, Paris, Nony, 1895.

Esta excellente collecção de problemas é destinada aos alumnos que se querem familiarisar com os primeiros principios da Mechanica racional. Por isso os autores tiveram o cuidado de não apresentar problemas de grande dificuldade. Muitos d'elles têm sido propostos nos exames oraes para a entrada na Escola Polytechnica de Paris.

A classificação dos problemas é feita em capítulos, havendo em cada capítulo problemas que são acompanhados das respectivas soluções e outros que são simplesmente enunciados. Cada capítulo principia por um resumo das fórmulas e theoremas pertencentes á theoria a que os problemas que vão seguir se referem.

Termina o volume um resumo, muito bem feito, da Geometria vectorial, cuja importancia em Mechanica, hoje aliás reconhecida, os autores tornam evidente por meio de algumas applicações.

G. T.

BRITISH LIBRARY M.250.98203

universitate, a profesorului său în cadrul oamenilor
care au obținut o domeniu de cunoștință și
cercetare și care sunt cunoscute

într-o lume — lumina căreia este

o lume universala, în care nu există nicio diferență
între cunoștințele omului și cunoștințele lui Dumnezeu.

ARTICULATIILE CUM SE

Împărtășesc pe lângă ce unu

;

;

;

într-o lume — lumina căreia este

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Publica-se o *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* em fasciculos de 32 paginas. Cada 6 fasciculos formarão um volume de 192 paginas.

Preço de cada volume — 2\$400 réis.

A correspondencia relativa ao *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* deve ser dirigida para o Porto, rua de Costa Cabral.

F. GOMES TEIXEIRA

Curso de Analyse infinitesimal

Tomo I (Calculo diferencial);
Tomo II (Primeira parte do Calculo integral);
Tomo III (Segunda parte do Calculo integral).

Preço de cada volume — 2\$500 réis.

JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS
PUBLICADO

PELO


Dr. F. Gomes Teixeira

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo Professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.



VOL. XII—N.^o 4

COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1895



SOBRE LOS CIRCULOS RADICALES

POR

DON JUAN J. DURAN LORIGA

Comandante de Artilleria

Se sabe que el lugar geometrico de los puntos tales que sus potencias con relacion á dos circunferencias fijas guardan la relacion $\frac{m}{n}$ es una circunferencia, y si suponemos $m = -n$, esta linea tambien será el lugar de los puntos que tienen respecto á otras dos de esta clase potencias iguales y de signos contrarios, que la analogia nos conduce á llamarla *circunferencia radical* (*) de las propuestas. Es muy facil determinar su centro y radio.

Llamemos P_0 y P_0' las potencias de un punto P del plano respecto á las circunferencias O y O' . Se tendrá $P_0 = -P_0'$ ó lo que es lo mismo, llamando l y l' las distancias de P á los centros y

(*) Algunos autores, en particular los ingleses, llaman «circulo radical» (radical circle) al que corta ortogonalmente á otras tres pero nos parece preferible la denominacion muy usada de «circulo ortotomico» y llamar circulo radical al que es objeto de este estudio.

d la distancia OO' ,

$$l^2 - R^2 = R'^2 - l'^2 \text{ es decir } l^2 + l'^2 = R^2 + R'^2.$$

El centro de la circunferencia que buscamos será por consiguiente el medio de OO' y su radio será

$$\rho = \frac{1}{2} \sqrt{2(R^2 + R'^2) - d^2}.$$

Para que la circunferencia radical exista, es preciso que se tenga

$$d < \sqrt{2(R^2 + R'^2)};$$

esta condicion se cumple siempre, cuando las circunferencias son tangentes (ya exteriores ó interiores), secantes ó interiores, pero si son exteriores podrá existir ó no la circunferencia radical.

Cuando las circunferencias son secantes, teniendo evidentemente que pasar la circunferencia radical por los dos puntos de corte (de potencia cero), podrá describirse inmediatamente.

Cuando son tangentes exteriores, la circunferencia radical será tangente interior á la de mayor radio y en el punto de tangencia de las dadas (puesto que este punto tiene potencia cero respecto á ambas) y como su centro es en todos los casos el medio de la linea de centros, es tambien su trazado inmediato. Si se quiere numericamente determinar su radio sin recurrir al hecho visto á priori, se hará $d = R + R'$ en el valor de ρ y resulta como es consiguiente $\rho = \frac{1}{2}(R - R')$.

Si son tangentes interiores, tambien resultará la circunferencia

radical tangente á las dadas y su radio será $\rho = \frac{1}{2} (R + R')$.

Si las circunferencias son concéntricas, tambien lo será con ellas la radical y su radio se obtendrá haciendo $d = 0$ en el valor de ρ , con lo que resulta

$$\rho = \frac{1}{2} \sqrt{2(R^2 + R'^2)}.$$

Para el trazado grafico de la circunferencia radical de dos exteriores (cuando existe) ó de dos interiores, se utilizaran las consideraciones que vamos á exponer.

Consideremos tres circunferencias O , O' y O'' , llamemos $\pi_{00'}$ la circunferencia radical de O y O' y $\pi_{00''}$ la de O y O'' ; si estas circunferencias se cortan, se tendrá en los puntos de intersección

$$\begin{cases} P_0 = -P_{0'} \\ P_0 = -P_{0''} \end{cases} \text{ por consiguiente } P_{0'} = P_{0''}$$

es decir que el eje radical de O' y O'' lo es tambien de $\pi_{00'}$ y $\pi_{00''}$.

Cuando las circunferencias radicales no se cortan, tambien es facil dar una demonstracion geometrica, y aun mas sencillo demonstralo analiticamente, como haremos mas adelante.

Esta observacion sugiere el medio de encontrar la circunferencia radical de dos exteriores (si existe) ó de dos interiores O y O' . Cortense por una tercera O'' , determine la circunferencia radical de O y O'' y el eje radical de O' y O'' y se tendrá uno ó dos puntos de la circunferencia que se quiere determinar y de la que el centro es conocido.

La circunferencia O'' debe elegirse de un modo conveniente para que se corten el eje y circunferencia radical auxiliares, lo cual es facil conseguir.

Puede verse graficamente si existe la circunferencia radical en el caso de ser las dadas exteriores (unico caso en que puede haber

imposibilidad) por la siguiente construccion (*). Levantase en el extremo del radio OA la perpendicular AB igual al radio R' de la otra circunferencia, unase O con B , trácese la perpendicular $BC = OB$ y si la circunferencia descrita con el radio OC envuelve el centro O' la circunferencia radical existe.

La sencillez de esta construcción evita otras explicaciones.

Cuando dos circunferencias son ortogonales, se ve claramente que la radical pasa por los centros de ellas, como se deduce también del valor de ρ , pues siendo $R^2 + R'^2 = OO'^2$, resulta $\rho = \frac{1}{2} OO'$.

La reciproca es también cierta, como se ve fácilmente.

La consideración de circunferencias radicales permite resolver inmediatamente el siguiente problema:

Se tienen dos circunferencias tangentes, por ejemplo interiores, O y O' de radios respectivos R y R' por el punto de tangencia p se trazan secantes, tales como pam y se toma en sentido contrario una longitud $am' = am$. ¿Cuál es el lugar geométrico de el punto m' ?

Tracemos la circunferencia O'' que tenga por circunferencia radical respecto á la O , la O' y se tendrá en valor absoluto $ap \cdot am = ap \cdot am'$ y por lo tanto $am' = am$; el lugar buscado es por consiguiente la circunferencia O'' . Para determinar su radio x , notemos que se tiene $R' = \frac{1}{2} (R - x)$, de donde se deduce $x = R - 2R'$. La circunferencia encontrada es tangente exterior ó interior á la O según sea $R - 2R' \geq O$. Si la circunferencia O' pasa por el punto O , el lugar geométrico se reduce al punto p lo cual es evidente.

Hemos dicho anteriormente que si se tienen tres circunferencias O , O' y O'' y se determinan las radicales de dos grupos OO' y OO'' por ejemplo, el eje radical de estas circunferencias radicales es el mismo que el de las del tercer grupo.— Esto permite demostrar con gran sencillez que las circunferencias descritas sobre las medianas de un triángulo como diámetros, tienen de dos en dos

(*) Se ruega al lector haga las figuras.

por eje radical las alturas de dicho triangulo. Observemos en efecto que si sobre los lados de un triangulo como diametros se describen circunferencias, las radicales de estas son las trazadas sobre las medianas (asi p. e. la correspondiente á las descritas sobre b y c es la que tiene por diametro la mediana relativa al lado a); resulta pues, en virtud de nuestra observacion, que los ejes radicales de las ultimas seran los mismos que los correspondientes á las primeras, es decir las alturas del triangulo. Tenemos pues seis circunferencias que tienen por centro radical comun el ortocentro del triangulo dado.

Si consideramos ahora las circunferencias descritas desde los medios de los lados como centros con un radio igual á las medianas correspondientes y á las que hemos llamado por ciertas razones, que en otra ocasion espusimos, circunferencias potenciales (vease nuestra nota del Progreso matematico, tomo v, pag. 70), es evidente que dichas circunferencias son las descritas tomando como diametros las medianas del triangulo anticomplementario, pero por otra parte, en virtud de lo anteriormente dicho, estas circunferencias son las radicales de las descritas sobre los lados de este último triangulo, podemos en consecuencia decir que las circunferencias descritas desde los vertices de un triangulo como centros con radios iguales á los lados opuestos tienen por circunferencias radicales las potenciales de dicho triangulo, y que por lo tanto su centro radical es el ortocentro del triangulo anticomplementario del propuesto.

Tenemos pues un segundo grupo de seis circunferencias que tienen el mismo centro radical.

Hemos dicho que, cuando dos circunferencias son ortogonales, la circunferencia radical tiene por diametro la linea de centros y, como el circulo de Longchamps es ortotomico de los descritos desde los vertices como centros con radios iguales á los lados opuestos, resulta que las circunferencias que tienen por diametros las rectas que unen el ortocentro de un triangulo con el de su complementario son las radicales del circulo de Longchamps y de los otros tres de que hemos hecho merito.

El mismo criterio puede servir para encontrar las circunferencias radicales de algunas otras del triangulo, pero en todos los casos puede recurrirse á la geometria analitica, es en efecto evidente que si $C = O$ y $C' = O$ son las ecuaciones de dos circunferencias, la de la radical será $C + C' = O$ ya se trate de coorde-

nadas cartesianas ó trilineales; así la circunferencia radical de las representadas por las ecuaciones

$$x^2 + y^2 + 2Ax + 2By + C = 0,$$

$$x^2 + y^2 + 2A'x + 2B'y + C' = 0,$$

es la siguiente:

$$x^2 + y^2 + (A + A')x + (B + B')y + \frac{1}{2}(C + C') = 0,$$

y si en particular se toma por eje de las X la linea de centros y una de ellas tiene el suyo en el origen (suponemos rectangular el sistema) la circunferencia radical será:

$$\left(x - \frac{\alpha}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{2(R^2 + R'^2) - \alpha^2}{4},$$

resultado que comprueba lo que anteriormente hemos dicho, que para que la circunferencia radical exista tiene que ser la distancia de centros menor que $\sqrt{2(R^2 + R'^2)}$. Si esta distancia es $\sqrt{2(R^2 + R'^2)}$, la circunferencia se reduce á un punto situado en la linea de centros, interiormente á la circunferencia de mayor radio y á una distancia de su centro igual á la anterior cantidad radical dividida por dos.

Si se trata de coordenadas baricentricas y las circunferencias dadas son

$$\sum \alpha \times \sum ux - \sum a^2 \gamma = 0$$

$$\sum \alpha \times \sum u'x - \sum a^2 \gamma = 0$$

la circunferencia radical es

$$\sum \alpha \cdot \sum (u + u') \alpha - 2 \sum \alpha^2 \gamma = 0.$$

Es muy facil probar analiticamente un hecho que anteriormente hemos consignado y es que si tenemos tres circunferencias O, O', O'' y las agrupamos de dos en dos, el eje radical de las circunferencias radicales de dos grupos lo es del tercer grupo. Tenemos en efecto llamando

$$C = O \dots C' = O' \dots C'' = O''$$

las ecuaciones de las tres circunferencias dadas

$$\begin{array}{l} \text{La circunferencia radical de } \left\{ \begin{array}{l} C = O \\ C' = O \end{array} \right. \text{ es } C + C' = O \quad \left. \begin{array}{l} C + C' = O \\ C + C'' = O \end{array} \right\} \text{ Eje radical de } \left\{ \begin{array}{l} C + C' = O \\ C + C'' = O \end{array} \right. \text{ es } C' - C'' = O \\ \text{La } \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \text{ de } \left\{ \begin{array}{l} C = O \\ C'' = O \end{array} \right. \text{ es } C + C'' = O \quad \left. \begin{array}{l} C' = O \\ C'' = O \end{array} \right\} \text{ Eje } \quad \rightarrow \quad \text{ de } \left\{ \begin{array}{l} C' = O \\ C'' = O \end{array} \right. \text{ es } C' - C'' = O \end{array}$$

Si despues de encontrar las circunferencias radicales de tres dadas operamos lo mismo (cuando es posible) con las que sucesivamente vamos obteniendo, podran resultar series triples de circulos sometidos á ciertas ligazones cuyo estudio puede ser curioso.

La consideracion de circunferencias radicales en la geometria del triangulo relacionando las relativas á circulos notables de este,

con otros circulos, rectas y puntos ligados al mismo, podrá quizas dar lugar á resultados interesantes, pero faltos hoy de tiempo para hacer un estudio detenido solo hemos apuntado ideas, que nos proponemos desarrollar en otra ocasion.

La Coruña, Junio, 1895.

RÈGLE D'ANALOGIES DANS LE TRIANGLE
OU TRANSFORMATION CONTINUE ET TRANSFORMATION
ANALYTIQUE CORRESPONDANTE

PAR

E. LEMOINE

On rencontre nombreuses propriétés du triangle ayant entre elles des analogies évidentes; pour n'en citer que l'exemple le plus simple: à chaque propriété où entre le cercle inscrit correspondent des propriétés analogues pour chaque cercle ex-inscrit, mais toutes les fois qu'un géomètre trouve une proposition nouvelle, il ne peut arriver à décerner les propositions analogues qu'après certains tâtonnements; nous nous proposons d'indiquer une loi qui donne explicitement sans aucun calcul, pour un très grand nombre de formules ou de théorèmes, les formules ou les théorèmes analogues.

Nous appellerons A, B, C, a , b , c , p , $p-a$, $p-b$, $p-c$, S, R, r_a , r_b , r_c , r , δ , δ_a , δ_b , δ_c , ω etc. les angles, les cotés, le demi-périmètre, les quantités

$$\frac{b+c-a}{2}, \quad \frac{c+a-b}{2}, \quad \frac{a+b-c}{2},$$

la surface, le rayon du cercle circonscrit, les rayons des 3 cercles

ex-inscrits, le rayon du cercle inscrit, les quantités

$$4R + r, \quad 4R - r_a, \quad 4R - r_b, \quad 4R - r_c,$$

l'angle de *Brocard*, etc.

Théorème :

Si dans une formule entre les éléments du triangle on change A, B, C, a, b, c, p, (p-a), (p-b), (p-c), S, R, r_a, r_b, r_c, r, δ, δ_a, δ_b, δ_c, ω etc., respectivement en -A, π-B, π-C, a, -b, -c, -(p-a), -p, (p-c), (p-b), -S, -R, r, -r_c, -r_b, r_a, -δ_a-δ, -δ_c, -δ_b, -ω, etc., on aura une formule exacte, quelquefois identique à la première, quelquefois différente.

Cela revient, au fond, à ceci, qui est évident :

Si l'on a l'identité

$$f(a, b, c) = 0$$

on aura aussi l'identité

$$f(a, -b, -c),$$

mais les conséquences sont extrêmement fécondes pour la Géométrie du triangle.

Si l'on a démontré par exemple la formule :

$$a^2 r_a + b^2 r_b + c^2 r_c = 4p^2 (R - r)$$

on en tire immédiatement

$$-a^2 r + b^2 r_c + c^2 r_b = 4(p-a)^2 (R + r_a),$$

de même de

$$\Sigma (b-a)^2 (c-a)^2 = (p^2 - 3r\delta)^2$$

on deduit :

$$(b+a)^2(c+a)^2 + (b+a)^2(b-c)^2 + (c+a)^2(b-c)^2 = \\ = [(p-a)^2 + 3r_a \delta_a]^2$$

formules qu'il eût été impossible de deviner à priori.

Nous appelons cette transformation la transformation continue en A, à cause de la manière dont nous y sommes primitivement parvenus en considérant un triangle ABC et en cherchant ce que deviennent par continuité les éléments en faisant mouvoir A sur BA dans les sens BA après que A est poussé à l'infini. Il y a évidemment aussi la transformation continue en B et la transformation continue en C.

Le même ordre d'idées donne lieu à une transformation analytique fort curieuse.

Soient x, y, z les coordonnées normales absolues d'un point M relatives à un triangle de référence ABC, coordonnées que nous supposons fonctions des éléments du triangle.

Soit K une expression quelconque fonction de ces éléments; nous désignerons par K_a ce que devient l'expression K lorsque l'on fait subir à ses éléments la transformation continue en A.

Cela posé, on démontre : il y a un point M_a dont les coordonnées normales absolues sont : — x_a, y_a, z_a ; c'est le transformé continu en A du point M.

Si maintenant

$$(1) \quad f(x, y, z, K, K'...) = 0$$

représente un certain lieu dépendant de M, lieu correspondant

par conséquent à une propriété P de M

$$(2) \quad f(-x, y, z, H_a K' a \dots) = 0$$

représentera le lieu que l'on obtiendrait en transformant continument en A la propriété P , propriété nouvelle que j'appelle P_a .

Nous dirons que (2) est la transformée continue en A de l'équation (1).

Conséquence :

Si une propriété P a été établie par une série de calculs ou de raisonnements, on trouvera immédiatement la série de calculs (ou de raisonnements) qu'il faudrait faire pour établir directement P_a , en transformant continument en A chacune des équations qui forment le calcul qui conduit à P .

Il n'est du reste nullement besoin de repasser par ces intermédiaires et de P on déduit immédiatement P_a .

Exemples :

1.^o Si H , O , O_a , K sont le point de concours des hauteurs, le centre du cercle inscrit, le centre du cercle ex-inscrit tangent au côté BC et au prolongement des deux autres, le point de Lemoine d'un triangle, on a :

$$\text{Surface } HOK = \frac{(c-a)(c-b)(b-a)}{24p \cot \omega};$$

on en déduit immédiatement :

$$HO_a K = \frac{(b-c)(a+c)(a+b)}{24(p-a) \cot \omega}.$$

2.^o L'hyperbole H_a qui a pour foyers B et C et passe en A

a pour équation :

$$(p-b)(p-c)(b^2y^2+c^2z^2)-bcyz[(p-c^2)^2+(p-b)^2] + \\ + abc(c-b)x(y-z)=0.$$

La transformation continue en A reproduit le même résultat, mais la transformation en B donne l'ellipse E_a , qui a pour foyers B et C et passe en A

$$p(p-a)(b^2y^2+c^2z^2)+bcyz[p^2+(p-a)^2] + \\ + abc(c+b)x(z+y)=0.$$

Nous ne pouvons entrer ici dans de plus longs détails, que l'on trouvera par exemple dans les comptes rendus des congrès de l'Association française pour l'avancement des Sciences; disons seulement en terminant que la transformation continue s'applique au tétraèdre et que, si a et a' , b et b' , c et c' sont les groupes d'arêtes opposées du tétraèdre ABCD, la transformation continue en D revient à changer a , b , c , a' , b' , c' en a , b , c , $-a'$, $-b'$, $-c'$.

SOBRE UMA FÓRMULA DE ANALYSE

POR

JOÃO AREZ

O sr. dr. F. Gomes Teixeira deu no tomo xviii do jornal do sr. Battaglini uma demonstração da fórmula (*)

$$(a) \dots y^n = \sum \frac{n!}{\alpha! \beta! \dots \lambda! x^\alpha' \beta'! \dots \lambda'! x^{\dots}} \frac{d^m f}{du_1^a du_2^b \dots} (u'_1)^a \binom{n}{2!} \\ \dots \left(\frac{u_1^{(n)}}{n!} \right)^l (u'_2)^{\alpha'} \left(\frac{u_2''}{2!} \right)^{\beta'} \dots \left(\frac{u_2^{(n)}}{n!} \right)^{l'} \dots$$

onde $y^{(n)}$ é a derivada da ordem n de y em ordem a x , sendo

$$y = f(u_1, u_2, \dots, u_l), \quad u_1 = \varphi_1(x), \quad u_2 = \varphi_2(x), \quad u_l = \varphi_l(x),$$

(*) Vide tambem o *Calculo differencial* do sr. G. Teixeira, 2.^a edição, pag. 215.

onde o sommatorio se refere a todas as soluções inteiras e positivas da equação

$$\alpha + 2\beta + \dots + n\lambda + \alpha' + 2\beta' + \dots + n\lambda'$$

$$+ \dots + \alpha^{(l-1)} + 2\beta^{(l-1)} + \dots + n\lambda^{(l-1)} = m$$

e onde é

$$\alpha + \beta + \dots + \lambda = a, \quad \alpha' + \beta' + \dots + \lambda' = b, \dots, \text{etc.}$$

e

$$a + b + c + \dots = m.$$

É esta a fórmula que pretendemos aqui deduzir como aplicação da fórmula de Taylor.

Com efeito a fórmula de Taylor pode escrever-se

$$f(u_1 + h_1, u_2 + h_2, \dots) - f(u_1, u_2, \dots)$$

$$= \sum \frac{h_1^a}{a!} \cdot \frac{h_2^b}{b!} \cdots \frac{d^m f}{d^a u_1 du^b u_2 \cdots}$$

onde

$$m = a + b + c + \dots$$

as quantidades h_1, h_2, \dots, h_l sendo dadas pelas relações

$$h_1 = \varphi_1(x+h) - \varphi_1(x) = \sum u_1^{(i)} \frac{h^i}{i!},$$

$$h_2 = \varphi_2(x+h) - \varphi_2(x) = \sum u_2^{(i)} \frac{h^i}{i!},$$

.....

$$h_l = \varphi_l(x+h) - \varphi_l(x) = \sum u_l^{(i)} \frac{h^i}{i!}.$$

Mas por ser por hypothese y uma função de x , temos

$$f(u_1 + h_1, u_2 + h_2, \dots) - f(u_1, u_2, \dots) = \sum \frac{h^n}{n!} y^{(n)}.$$

Logo será

$$\sum \frac{h^n}{n!} y^{(n)} = \sum \frac{d^m f}{du_1^a du_2^b \dots} \times \frac{\left(\sum u_1^{(i)} \frac{h^i}{i!} \right)^a}{a!} \times \frac{\left(\sum u_2^{(i)} \frac{h^i}{i!} \right)^b}{b!} \dots$$

desenvolvendo as potencias do 2.^o membro d'esta igualdade, tere-

mos de effectuar as operações n'elle indicadas

$$\sum \frac{h^n}{n!} y^{(n)} = \sum \frac{d^m f}{du_1^a du_2^b \dots} .$$

$$\sum \frac{h^{\alpha+2\beta+\dots+n\lambda+a'+2\beta'+\dots+n\lambda'+\dots}}{\alpha! \beta! \dots l! \alpha'! \beta'! \dots l'! \dots} (u'_2)^{\alpha} \left(\frac{u''_2}{2!} \right)^{\beta} \dots \left(\frac{u^{(n)}}{n!} \right)^{\lambda} (u'_2)^{\alpha'} \dots$$

onde é

$$\alpha + \beta + \dots + \lambda = a$$

$$\alpha' + \beta' + \dots + \lambda' = b$$

Equalando os coeffientes das mesmas potencias de h em ambos os membros d'esta ultima egualdade e notando que para isso basta pôr

$$\alpha + 2\beta + \dots + n\lambda + \alpha' + 2\beta' + \dots + n\lambda' + \dots + \alpha^{(l-1)}$$

$$+ 2\beta^{(l-1)} + \dots + n\lambda^{(l-1)} = n$$

achamos a fórmula (a) que pretendiamos demonstrar.

NOTE SUR LA GÉOMÉTROGRAPHIE
OU ART DES CONSTRUCTIONS GÉOMÉTRIQUES

PAR

E. LEMOINE

M. Haton de la Goupilli re a pr sent  pour nous   la s ance de l'Acad mie des Sciences de Paris du 16 juillet 1888 une note sur un mode d' valuation de la simplicit  dans les constructions g om triques; le sujet s'est beaucoup  tendu depuis nos premi res  tudes et ce sont les r sultats obtenus dans cette voie que nous nous proposons de signaler. Nous rappelons que R_1 , R_2 repr sentent respectivement l'op ration qui consiste   faire passer le bord de la r gle par un point plac  et l'op ration qui consiste   tracer la droite; que C_1 , C_2 , C_3 repr sentent respectivement l'op ration qui consiste   mettre une pointe du compas en un point du plan, l'op ration qui consiste   mettre une pointe du compas en un point indtermin  d'une ligne trac e et l'op ration qui consiste   tracer le cercle. Il y a encore avec le compas une autre op ration lementaire possible, c'est celle qui consiste   fixer en b sur une ligne trac e une des pointes B du compas — lorsque la pointe A est fix e elle m me en un point a — pour tracer un cercle de rayon ab sans se servir autrement de b , ou pour fixer la pointe A ou un point d'une ligne trac e.

Cela se pr senterait par exemple dans le probl me suivant : *Prendre une longueur qui soit k fois une longueur donn e*, mais nous n'avons pas ajout  un symbole sp cial pour cette op ration parce que cela aurait, sans ayantages   notre avis, compliqu  la m thode.

Toute construction effectuée par la règle et le compas peut donc se représenter par le symbole

$$op : (m_1 R_1 + m_2 R_2 + n_1 C_1 + n_2 C_2 + n_3 C_3),$$

nous appellons : *simplicité* ou coefficient de simplicité, le nombre total : $m_1 + m_2 + n_1 + n_2 + n_3$ des opérations élémentaires R_1 , R_2 , C_1 , C_2 , C_3 et : *Exactitude* ou coefficient d'exactitude le nombre $m_1 + n_1 + n_2$; l'exactitude variable de la construction ne dépendant évidemment en somme que des opérations de préparation m_1 , n_1 , n_2 et non, à proprement parler, des opérations de tracé

Il ne serait pas exact de dire que $m_1 + m_2 + n_1 + n_2 + n_3$ est une *mesure* de la simplicité, en donnant au mot mesure le sens ordinaire du mot en mathématiques, car les opérations élémentaires R_1 , R_2 , C_1 , C_2 , C_3 sont des unités différentes. Mais ce mot de mesure est commode à employer et la pratique de la méthode montre bien qu'il correspond réellement au but que l'on se propose quand on décompose une construction en ses *opérations élémentaires*. Il faut encore remarquer que nos évaluations ne peuvent suivre exactement la pratique, car des opérations théoriquement identiques sont rendues soit impossibles quelquefois soit très difficiles à cause des longueurs des rayons des cercles, des positions des droites, etc. Ce que nous faisons c'est une *évaluation rationnelle*, rien de plus, mais qui, toutes proportions gardées, est à une évaluation réelle, impossible je crois, ce que la mécanique rationnelle est aux applications de l'industrie.

Nous n'avions eu d'abord que l'idée d'évaluer la *simplicité* des constructions, mais comme la notion de la *durée* des opérations nécessaires à une construction n'entre pas directement dans notre évaluation, nous avons été bientôt conduit à évaluer *théoriquement* l'exactitude; là encore nous avons évidemment aussi une évaluation seulement *rationnelle* puisque nous ne tenons pas compte des angles sous lesquels les lignes se coupent, etc.; enfin l'application que nous avons faite de notre méthode à de nombreux exemples nous a conduit à trois résultats principaux dont le premier est tout à fait inattendu :

1° Presque toutes, pour ne pas dire toutes—tant il y a peu

d'exceptions — les constructions données séculairement dans les *Traité de Géométrie* pour les constructions fondamentales sont trop compliquées ; même : *mener par un point donné une parallèle à une droite donnée*. Les unes un peu trop comme celle que nous citons, les autres de plus de moitié, comme : *construire la moyenne proportionnelle entre deux longueurs données* et nous en avons donné de plus simples. La chose tient à ce que les Grecs, de qui nous tenons la Géométrie, la traitaient uniquement au point de vue spéculatif, ils ne faisaient point d'épures, et nous avons continué leurs routes.

2.^o Il y a un art propre des constructions géométriques que nous avons appelé la *Géométragraphie* et qui a ses méthodes et son élégance particulières.

3.^o La simplicité didactique de l'exposition géométrique n'a aucun rapport avec la simplicité et par suite avec la probabilité d'exactitude de la construction effectuée.

Celle-ci doit être étudiée à part au moyen de la *Géométragraphie*; nous n'en citerons que deux exemples. La solution si élégante (et donnée dans tous les traités de Géométrie analytique) de *Charles* pour trouver en grandeur et en position les axes d'une ellipse dont on connaît deux diamètres conjugués en grandeur et en position est plus compliquée à construire que d'autres moins continues.

L'admirable solution de *Gergonne* et de *Bobillier* du problème d'*Apollonius* : mener les cercles tangents à trois cercles donnés conduit à une construction de beaucoup la plus compliquée parmi celles du même problème que nous avons analysées.

En résumé, c'est la simplicité spéculative et didactique que les Géomètres ont toujours considérée jusqu'ici. La *Géométragraphie* s'occupe au contraire uniquement de la simplicité de la construction effectuée.

La règle et le compas sont les seuls instruments que la *Géométragraphie* pure admet et elle s'occupe alors sur un point de vue des problèmes spéculatifs que les Grecs appellent les questions résolubles par la droite et le cercle, ce qui contient évidemment la Géométrie de la règle seule et la Géométrie du compas. Si on applique la *Géométragraphie* aux épures de la Géométrie descriptive on est conduit à admettre l'usage d'un autre instrument : l'équerre, on n'a pour cela qu'à ajouter à R_1 , R_2 , C_1 , C_2 , C_3 le symbole E qui désigne l'opération consistant à faire glisser l'e-

querre le long de la règle jusqu'à ce que son bord passe par un point donné.

Si on applique la *Géométriegraphie* aux constructions de la Mécanique ou à la Statique graphique, il faut admettre l'emploi des règles divisées ce qui introduit l'idée générale du *nombrer*, c'est à dire l'arithmologie, mais il n'y a pas besoin de nouveaux symboles et l'opération de prendre entre les branches d'un compas un certain nombre donné de divisions sera $2C_1$ comme cela serait pour prendre une longueur donnée, seulement la différence théorique est essentielle. Ainsi : diviser une droite donnée dans le rapport de deux longueurs données est un problème de *Géométriegraphie pure* qui se résout aisément ; et diviser une droite donnée dans le rapport de deux nombres donnés m et n est un problème qui pour trouver sa solution générale la plus simples possible quels que soient m et n , conduirait par la géométriegraphie pure à une question d'arithmologie que je ne crois pas résolue car il faudrait d'abord savoir résoudre la suivante : *trouver, le plus simplement possible, une longueur qui soit k fois une longueur donné* et l'on verra facilement que cette dernière revient à une question tout à fait analogue à celle-ci : *quel est le nombre minimum de multiplications nécessaires pour éléver un nombre A à la puissance p*, question non résolue. L'emploi de la règle divisée s'impose pratiquement donc en statique Graphique pour la construction des centres de gravité de n points, etc.

Nous ne pouvons traiter ici en détail les questions dont nous venons de parler et nous renvoyons à notre mémoire développé qui a paru dans les comptes rendus du Congrès de Pau de l'Association Française pour l'avancement des sciences, 1892.

BIBLIOGRAPHIA

F. Porro : Astronomia sferica elementarmente exposta, Roma, 1894.

O presente livro foi escripto pelo sr. Porro, professor de Astronomia na Universidade de Turin, não só para servir aos seus discípulos a fim de aprenderem os primeiros elementos d'esta sciencia, necessarios para estudarem depois os pontos mais elevados d'ella que fazem parte do curso, mas ainda áquelles que se queiram preparar com os conhecimentos astronomicos necessarios para o estudo da Geographia, da Geodesia, da Physica, da Meteorologia, da Engenharia e da Navegação.

Nem sempre os livros de Astronomia apresentam esta sciencia debaixo de fórmula attrahente que concorde com a beleza d'ella. Ao livro que acaba de publicar o illustre professor italiano não se pôde fazer este reparo; lê-se com prazer e com proveito. É pequeno no formato, mas contém muito assumpto, e este é muito bem escolhido e muito bem exposto. N'esta exposição o auctor leva as suas referencias até aos trabalhos mais modernos e acompanha cada doutrina considerada de notas historicas cheias de interesse.

Os assumptos estão dispostos em dez capítulos, onde são consideradas as materias seguintes :

I A esphera celeste e o seu movimento diurno. II O movimento annual do Sol. III Transformações das coordenadas. IV A medida do tempo. V O movimento da Lua. VI A parallaxe diurna e a refracção. VII As variações dos planos fundamentaes. VIII A aberração e a parallaxe annual. IX A reducção dos logares estelares e os movimentos proprios. X O sistema solar.

E. Lucas : Récréations mathématiques, t. iv, Paris, G. Villars, 1894.

Quando démos noticia do apparecimento do tomo III das *Récréations mathématiques*, no volume anterior d'este jornal, dissémos que E. Lucas publicou em vida dous tomos d'esta obra e que, depois da sua morte, foram encontrados nos seus papeis dous tomos promptos para serem impressos. O 2.^o d'estes volumes, o 4.^o da obra, acaba de ser publicado e é, como os anteriores, vivamente interessante. Eis os titulos dos recreios que contém :

- I O calendario perpetuo e o calendario automatico dos residuos.
- II A Arithmetica em bolas.
- III A Arithmetica em paus.
- IV O jogo das palhetas no seculo 13.^o
- V Os quadrados magicos de Fermat.
- VI A Geometria das rôdes e o problema dos dominós.
- VIII A Geometria das regiões, o problema geographicoo das quatro côres e as rôdes de pontos triplos.
- VIII A machina para marchar.

Johann G. Hagen : Synopsis der hoeheren Mathematik, t. II (Geometrie der algebraischen Gebilde), Berlin, Felix L. Damas, 1894.

Deu-se no tomo x, pagina 109 d'este jornal, uma breve noticia a respeito do 1.^o volume d'esta obra importante. Ahi dissémos que é ella uma vasta encyclopedia mathematica, em que são apresentados, segundo a ordem logica, os diferentes assumptos que fazem parte das sciencias mathematicas.

O 2.^o volume, que acaba de ser publicado, é consagrado á Geometria. N'elle são considerados todos os ramos da Geometria, a respeito dos quaes são enunciadas as mais importantes proposições, fórmulas, methodos, regras, etc., que têm sido apresentadas pelos geometras, tudo disposto segundo a ordem logica dos assumptos e acompanhado de indicações bibliographicas preciosas. Para o estudo de cada questão o auctor recorreu aos trabalhos dos geometras mais eminentes de todos os paizes, e principalmente áquelles que são considerados como fundamentaes ; por isso a obra está inteiramente á altura do estado actual da sciencia que considera.

O volume considerável de que estamos dando noticia está divi-

dido em treze partes, onde são respectivamente estudados os fundamentos da Geometria, a Geometria projectiva, os diversos sistemas de coördenadas, os sistemas de linhas de 1.^o e 2.^o grau, a Geometria vectorial (methodos de Argand, Grassmann, Hamilton, etc.), a theoria geral das curvas planas, as curvas planas de segunda ordem, as curvas planas de terceira ordem, as curvas planas de quarta ordem, a theoria geral das curvas empenadas e das superficies, as curvas empenadas e as superficies de segunda ordem, as superficies de terceira ordem, as superficies de quarta ordem.

Como o anterior, este volume revela no auctor uma erudição admiravel, tal é a quantidade de factos geometricos que, a respeito de cada um dos assumptos que acabamos de enunciar, elle contém.

A *Synopsis der hoehren Mathematik* é uma obra de grande utilidade, que deve fazer parte da bibliotheca de todo o mathematico, que de certo terá frequentes vezes occasião de a consultar, para saber a respeito de cada assumpto as principaes proposições conhecidas, quaes os auctores que as estudaram, etc.

Répertoire bibliographique des sciences mathématiques (fiches 1 à 100), Paris, Gauthier Villars et Fils, 1894.

No volume IX d'este jornal deu-se noticia da resolução, tomada pelo Congresso de Mathematica que teve logar em Paris em 1889, de publicar um Repertorio bibliographic das sciencias mathematicas, contendo os titulos de todos os trabalhos mathematicos publicados em todos os paizes desde o principio d'este seculo. Hoje temos o prazer de annunciar que uma primeira serie de 100 folhas do Repertorio acaba de ser publicada.

Contém esta serie a indicação de perto de mil trabalhos mathematicos, publicados em diversos paizes, entre os quaes bastantes dos publicados nas collecções periodicas do nosso paiz.

É desnecessario indicar a importancia de semelhante publicação, tão evidente ella é. Todos os que trabalham sobre sciencias mathematicas sabem que a cada passo lhes apparece occasião de necessitarem conhecer o que sobre algum ponto d'estas sciencias tem sido publicado.

Por meio do Repertorio bibliographico obtém immediatamente as indicações que necessitam.

Devemos observar que, para fazer uso do Repertorio bibliographico é necessário possuir o *index* d'esta publicação. D'este *index* foram publicadas já duas edições, sendo a ultima publicada em 1893. Eis o seu título:

Index du Répertoire bibliographique des sciences mathématiques, Paris, G. Villars, 1893.

D. F. G. Arias : Colección de problemas, teoremas, etc., destinados á estudios de aplicación de las enseñanzas de Geografía y Física, Barcelona, 1894.

Contém esta obra dous volumes. O primeiro volume é consagrado a problemas, exercicios e notas relativas á Cosmographia, á Geographia e á Nautica. O segundo contém tambem problemas, exercicios e notas relativas á Mechanica e á Physica. Os problemas são na sua maior parte simples, elementares e de utilidade practica.

S. Pincherle : Delle funzioni ipergeometriche e di vari questioni ad esse attinenti (Giornale di Matematiche de Battaglini, t. XXXII).

Contém esta excellente memoria uma parte consideravel de um curso, que sobre as funcções hypergeometricas fez o sr. Pincherle na Universidade de Bolonha, no anno lectivo de 1893 a 1894. N'ella o sabio geometra italiano faz derivar de uma fonte commum varias theorias relativas a estas funcções, anteriormente apresentadas como distinctas, e sem ligação alguma. A exposição d'este assumpto dá-lhe occasião de applicar alguns resultados importantes a que chegou em trabalhos anteriores. A simplicidade com que é tratado o assumpto e os elementos que o auctor apresenta, para facilitar a sua comprehensão, tornam este trabalho muito proprio

para se fazer um estudo assaz desenvolvido da theoria das funcções hypergeometricas.

R. Perrin : Sur le sous-discriminant (ou covariant biquadratique lié à l'avant-dernier terme de l'équation aux carrés des différences, (Journal des mathématiques, 4.^a serie, t. x).

Sendo U a fórmula binaria geral de ordem n e V a equação aos quadrados das diferenças das raizes de U, cada coefficiente de V é origem de um certo covariante de U. O covariante do qual é origem o penultimo coefficiente de V, é o objecto de que se occupa o sr. Perrin n'esta importante memoria.

N'ella estuda o auctor as propriedades d'este covariante, ensina um methodo para o calcular e faz applicação d'este methodo ás fórmulas binarias de 3.^a, 4.^a, 5.^a e 6.^a ordem.

E. Picard : Sur l'application des méthodes d'approximations successives à l'étude de certaines équations différentielles ordinaires (Journal des mathématiques, 4.^a serie, t. LX).

N'esta memoria apresenta o eminent geometra francez um methodo importante de approximação, que permite obter os integraes dos systemas de equações diferenciais de 2.^a ordem, quando estes integraes têm valores dados para douos valores da variavel, e faz d'este methodo applicações interessantes.

M. d'Ocagne : Mémoire sur les suites récurrentes (Journal de l'Ecole Polytechnique de Paris, 1894).

O auctor d'esta bella memoria simplifica consideravelmente a

theoria das series recorrentes, reduzindo todas as series, que têm a mesma escala, a uma d'ellas, a que dá o nome de *fundamental*, e que escolhe de modo a simplificar as formulas de transformação, e substituindo á formula conhecida de Lagrange, que dá o integral das series recorrentes no caso de a equação generatriz ter raízes multiplas, outra que não exige a distincção do grão de multiplicidade das raízes d'aquelle equação. A memoria contém uma exposição da theoria das series recorrentes feita no sentido que acabamos de indicar e ainda muitos resultados novos relativos a estas series, de que não podemos dar notícia em pequeno espaço.

Lia Predella: Sulle soluzioni singolari delle equazioni differenziali ordinarie di 1.º ordine (Giornale di Mathematiche, t. XXXIII).

Abre esta bella Memoria por uma notícia rápida, mas muito completa, dos trabalhos que têm sido publicados a respeito das soluções singulares das equações diferenciais de 1.^a ordem. Assim a auctora refere-se rapidamente aos trabalhos de Taylor, Euler, Lagrange, etc., e aos trabalhos modernos de Darboux, Cayley, Casorati, Kapteyn, Hamburger, etc. Depois, entrando no objecto principal do seu trabalho, a auctora, fazendo notar que nenhum geometra fez ainda uma exposição completa da theoria das soluções singulares, encarrega-se ella d'esta exposição, reunindo os resultados espalhados por diferentes memorias, coordenando-os, preenchendo as lacunas, fazendo a critica dos resultados, etc.

Não se limita porém Lia Predella a uma exposição do que é conhecido a respeito do assumpto de que se occupa. Ha pelo contrario muitos pontos em que ella apresenta os resultados das suas proprias indagações.

A memoria está dividida em duas partes.

A primeira parte é consagrada ao estudo das soluções singulares das equações diferenciais do gráu n relativamente á derivada que n'elle entra. N'esta parte a auctora completa algumas proposições relativas aos discriminantes da equação differential relativamente á derivada e da equação integral relativamente á constante arbitrária, dá demonstrações novas de alguns theoremas de Cayley, continua os estudos de Workman sobre a soperpo-sição dos logares singulares, etc.

Na segunda parte são estudadas primeiramente as equações do 1.^o grão relativamente á derivada; depois as equações do 2.^o grão relativamente á mesma derivada, a respeito das quaes a auctora expõe os trabalhos de Casorati, simplificando-os e aperfeiçoando-os; finalmente um grupo de equações do 3.^o grão relativamente á derivada ao qual Lia Predella pôde estender alguns theoremas que até agora só eram demonstrados para o caso das equações do 2.^o grão.

Por esta rapida noticia vê-se que o nome de Lia Predella é mais um a juntar á lista, não muito numerosa, das mulheres que cultivavam com sucesso as sciencias mathematicas.

E. Pascal : Un capitolo di Calcolo differenziale (Rivista di Matematica, 1895).

Refere-se esta nota á expressão do resto da serie de Taylor dada por Cauchy :

$$R_n = \frac{h^n (1-\theta)^{n-1}}{(n-1)!} f^n(x + \theta h).$$

Mostrou Pringsheim que, apezar de θ ser função de n , é condição necessaria para que a serie de Taylor converja para $f(x)$ que esta expressão, sendo considerada como função de duas variaveis independentes θ e n , tenda para 0 quando n tende para o infinito e θ varia entré 0 e 1. É este resultado que E. Pascal demonstra no seu interessante artigo.

E. Pincherle : Sulle operazioni funzionali distributive (Rend. della R. Acad. dei Lincei, 1895).

— *Sulle operazioni distributive commutabili con una operazione data (Atti delle R. Acad. di Torino, 1895).*

E. Guallart : *Apuntes de Analisis infinitesimal*, Zaragoza, 1895.

M. Lerch : *Über eine arithmetische Relation* (*Sitzungsberichte der K. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag*, 1894).

Annuaire pour l'an 1895 publié par le Bureau des Longitudes, Paris, G. Villars.

Contém este volume as informações que é uso apresentar esta interessante e útil publicação periódica e além disso as notícias seguintes :

- 1.^o *Ondas atmosféricas lunares*, por M. Bouquet de la Grye;
 - 2.^o *Sobre o Congresso geodesico d'Insprück*, por M. Tisserand ;
 - 3.^o *O Observatorio do Monte Branco*, por M. Janssen ;
 - 4.^o *A Photometria photographica*, por M. Janssen ;
 - 5.^o *Relatorio sobre a unificação dos dias astronomico e civil*, por M. Poincaré.
-

D. Besso : *Sopra alcune equazioni differenziali ipergeometriche* (*Rend. della R. Accademia dei Lincei*, 1894).

G. Peano : *Estensione di alcuni teoremi di Cauchy sui limiti* (*Atti della R. Accademia di Torino*, 1894).

E. Weyr : Über einen symbolischen Calcul auf Trägern vom Geschlechte Eins und seine Anwendung (Sitzungsber. der K. Akademie der Wissenschaften in Wien, 1894).

J. Deruyts : Sur les formes à plusieurs séries de variables (Bulletins de l'Académie R. de Belgique, 1894).

D. André : Sur les permutations alternées (Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1894).

*E. Carvallo : Perfectionnements à la méthode de M. Mouton pour l'étude du spectre calorifique (Journal de Physique, Paris, 1893).
— Spectres calorifiques (Annales de Chimie et de Physique, 1895).
— Cas paradoxal de réflexion cristalline (Journal de Physique, 1895).
— Théorie du pied équilibriste du Gyroscope Gervat (Bulletin de la Société mathématique de France, 1895).
— Théorèmes de Mécanique (Nouvelles Annales de Mathématiques, 1895).
— Nouveau théorème de Mécanique (Item).
— Sur les surfaces minimes (Bulletin des sciences math., 1894).
— Intégration des équations de la lumière dans les milieux transparents et isotropes (Comptes rendus de l'Acad. de Paris, 1894).*

E. Cesàro : *Sulla Geometria intrinseca delle congruenze* (*Rend. della R. Accademia di Napoli*, 1894).

G. Eneström: *Om reppkomsten af tecknen + och - samt de matematiska termerna PLUS och MINUS* (*Bulletin da Acad. de Stockholm*, 1894).

— *Om Taylors och Nicoles imbördes förtjänster beträfande differentialkalky lens första utbildande* (Item).

H. G. Zeuthen : *M. Maurice Cantor et la Géométrie supérieure de l'antiquité* (*Bulletin des Sciences math.*, 1894).

E. Picard : *Sur la détermination des intégrales des équations aux dérivées partielles du second ordre par certaines conditions aux limites* (*Bulletin de la Société math. de France*, 1894).

— *Sur une classe de transcendentes nouvelles* (*Acta mathematica*, t. 18).

— *Remarques sur les équations différentielles* (Item, t. 17).

— *De l'équation $\Delta u = ke^u$ sur une surface de Riemann fermée* (*Journal des mathématiques*, 4.^e série, t. IX).

D. Z. G. de Galdeano : *El concepto del imaginarismo en la ciencia matematica*, Zaragoza, 1894.

G. B. Guccia: Richerche sui sistemi lineari di curve algebriche piane dotati di singolarità ordinarie (Rend. del Circolo matematico di Palermo, 1894).

— *Sulle involuzioni di specie qualunque dotate di singolarità ordinarie (Item).*

R. Guimarães: O Congresso de Caen (Rev. de Educação e ensino, 1894).

P. Mansion: Notice sur les recherches de M. de Tilly en Metageométrie (Revue des questions scientifiques, 1895).

G. T.

ANESTHESIA AND SEDATION

anesthesia and sedation. The author has collected
and analyzed data on 5000 patients. The following are
the main findings:

1. The incidence of respiratory depression is about 1%.

2. The incidence of hypotension is about 10%.

3. The incidence of bradycardia is about 5%.

4. The incidence of hypertension is about 2%.

5. The incidence of tachycardia is about 1%.

6. The incidence of arrhythmias is about 1%.

7. The incidence of hypoxemia is about 1%.

8. The incidence of hypotension is about 1%.

9. The incidence of bradycardia is about 1%.

10. The incidence of tachycardia is about 1%.

11. The incidence of arrhythmias is about 1%.

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Publica-se o *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* em fasciculos de 32 paginas. Cada 6 fasciculos formarão um volume de 192 paginas.

Preço de cada volume — 2\$400 réis.

A correspondencia relativa ao *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* deve ser dirigida para o Porto, rua de Costa-Cabral.

F. GOMES TEIXEIRA

Curso de Analyse infinitesimal

Tomo I (Calculo differencial);

Tomo II (Primeira parte do Calculo integral);

Tomo III (Segunda parte do Calculo integral).

Preço de cada volume — 2\$500 réis.

JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS

PUBLICADO

PELO

Dr. F. Gomes Teixeira

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo Professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.




VOL. XII—N.º 5

COIMBRA

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE

1896



CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Publica-se o *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* em fasciculos de 32 paginas. Cada 6 fasciculos formarão um volume de 192 paginas.

Preço de cada volume — 2\$400 réis.

A correspondencia relativa ao *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* deve ser dirigida para o Porto, rua de Costa-Cabral.

F. GOMES TEIXEIRA

Curso de Analyse infinitesimal

Tomo I (Calculo differencial);

Tomo II (Primeira parte do Calculo integral);

Tomo III (Segunda parte do Calculo integral).

Preço de cada volume — 2\$500 réis.

SUR DIVERSES FORMULES D'ARITHMÉTIQUE

PAR

M. LERCH

(à Prague)

Représentons, comme il est d'usage, par $E(x)$ ou $[x]$ le plus grand nombre entier ne surpassant pas la quantité positive x , et posons $E(x) = 0$ lorsque x est négative. Nous aurons d'abord la formule

$$(1) \quad \sum_{\alpha=1}^{\infty} E\left(\frac{m}{u+\alpha} - v\right) = \sum_{\alpha=1}^{\infty} E\left(\frac{m}{v+\alpha} - u\right),$$

dans laquelle m, u, v représentent des quantités positives quelconques. On l'obtient aisément par la voie géométrique en observant que les deux membres expriment le nombre des points aux coordonnées entières et positives, contenus dans l'aire limitée par les axes et par l'hyperbole équilatère

$$(u+x)(v+y) = m.$$

La démonstration purement arithmétique, équivalente au fond au raisonnement géométrique, est aussi facile : Il est clair que la

quantité $E\left(\frac{u}{u+\alpha} - v\right)$ représente la totalité des nombres entiers positifs β , pour lesquels $\frac{m}{u+\alpha} - v \geq 0$ ou bien $m \geq (u+\alpha)(v+\beta)$. Le premier membre dans (1) représente donc le nombre des combinaisons α, β ($\alpha, \beta = 1, 2, 3, \dots$) qui satisfont à l'inégalité $m \geq (u+\alpha)(v+\beta)$. Il est clair que le même nombre est esprimable par le deuxième membre de l'équation (1), qui se trouve ainsi démontrée.

Dans cette équation prenons $m = n - \sigma a$, $u = ra$, $v = sa$, où a, r, s, n sont des entiers positifs, et faisons la somme pour $\sigma = 0, 1, 2, \dots$ Dans l'équation qui résulte

$$\sum_{\sigma=0}^{\infty} \sum_{\alpha=1}^{\infty} E\left(\frac{n - a^2rs - (\sigma + as)a}{ra + \alpha}\right)$$

$$= \sum_{\sigma=0}^{\infty} \sum_{\alpha=1}^{\infty} E\left(\frac{n - a^2rs - (\sigma + r\alpha)a}{sa + \alpha}\right)$$

transformons les deux membres en introduisant comme les indices des quantités $ra + \alpha$, $s\alpha + \sigma$, respectivement $sa + \alpha$, $r\alpha + \sigma$, ce qui donne

$$(2) \quad \sum_{\alpha=ra+1}^{\infty} \sum_{\sigma=s\alpha}^{\infty} E\left(\frac{m - \sigma a}{\alpha}\right) = \sum_{\alpha=sa+1}^{\infty} \sum_{\sigma=r\alpha}^{\infty} E\left(\frac{m - \sigma a}{\alpha}\right)$$

où m est un entier positif quelconque, remplaçant l'expression $n - a^2rs$.

Les conditions sommatoires dans le premier membre étant $\alpha > ra$, $\sigma \geq s\alpha$ ou bien $ra < \alpha \leq \left[\frac{\sigma}{s}\right]$, $\sigma > ras$, la quantité consi-

derée s'écrit

$$\sum E\left(\frac{m-\sigma a}{\alpha}\right), \left(\sigma > rsa, ra < \alpha \leq \left[\frac{\sigma}{s}\right]\right),$$

et nous aurons l'égalité

$$(2^a) \quad \sum E\left(\frac{m-\sigma a}{\alpha}\right) = \sum E\left(\frac{m-\sigma' a}{\alpha'}\right),$$

les conditions sommatoires étant

$$\sigma > rsa, \quad ra < \alpha \leq \left[\frac{\sigma}{s}\right], \quad sa < \alpha' \leq \left[\frac{\sigma}{r}\right].$$

Changeons m en $m-1$ et retranchons, il vient

$$\begin{aligned} & \sum_{\sigma > rsa} \sum_{ra < \alpha \leq \left[\frac{\sigma}{s}\right]} \left\{ E\left(\frac{m-\sigma a}{\alpha'}\right) - E\left(\frac{m-\sigma a-1}{\alpha}\right) \right\} \\ &= \sum_{\sigma > rsa} \sum_{sa < \alpha' \leq \left[\frac{\sigma}{r}\right]} \left\{ E\left(\frac{m-\sigma' a}{\alpha'}\right) - E\left(\frac{m-\sigma' a-1}{\alpha}\right) \right\}. \end{aligned}$$

Cela étant, remarquons que la différence

$$E\left(\frac{m-\sigma a}{\alpha}\right) - E\left(\frac{m-\sigma a-1}{\alpha}\right)$$

ne diffère de zero que lorsque α est un diviseur de $m - \sigma a$, dans ce cas sa valeur étant l'unité, et que par conséquent la somme

$$\sum_{\substack{ra < \alpha \\ ra \leq \left[\frac{\sigma}{s} \right]}} \left\{ E\left(\frac{m - \sigma a}{\alpha}\right) - E\left(\frac{m - \sigma a - 1}{\alpha}\right) \right\}$$

équivaut au nombre des diviseurs de la quantité $m - \sigma a$ qui sont supérieurs à ra et ne surpassent pas $\left[\frac{\sigma}{s} \right]$.

Si nous représentons par $\psi(p, q)$ le nombre des diviseurs de p supérieurs à q , notre quantité s'écrira $\psi(m - \sigma a, ra) - \psi\left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{s}\right)$,
et il s'ensuit que nous aurons l'équation

$$\sum_{\sigma > rsa} \left\{ \psi(m - \sigma a, ra) - \psi\left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{s}\right) \right\}$$

$$= \sum_{\sigma > rsa} \left\{ \psi(m - \sigma a, sa) - \psi\left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{r}\right) \right\}$$

ou bien

$$(3) \quad \sum_{\sigma} \left\{ \psi\left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{r}\right) + \psi(m - \sigma a, ra) \right\}$$

$$= \sum_{\sigma} \left\{ \psi\left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{s}\right) + \psi(m - \sigma a, sa) \right\}, (\sigma > rsa).$$

On obtient un résultat de forme différente en prenant pour point de départ l'équation (2), dans le cas de $s = 0$, où elle ne cesse

pas d'être vraie :

$$\sum_{\sigma=0}^{\infty} \sum_{\alpha=ra+1}^{\infty} \left(\frac{m-\sigma a}{\alpha} \right) = \sum_{\alpha=1}^{\infty} \sum_{\sigma=r\alpha}^{\infty} E\left(\frac{m-\sigma a}{\alpha}\right).$$

Remarquons que les conditions sommatoires dans le second membre peuvent s'écrire $\sigma > 0$, $0 < \alpha \leq \left[\frac{\sigma}{r} \right]$, et que par conséquent

$$\sum_{\sigma, \alpha} E\left(\frac{m-\sigma a}{\alpha}\right) = \sum_{\sigma', \alpha'} E\left(\frac{m-\sigma' a}{\alpha'}\right), \quad \begin{cases} \sigma \geq 0, \sigma' > 0, \\ \alpha > ra, 0 < \alpha' < \left[\frac{\sigma'}{r} \right] \end{cases}.$$

En y changeant m en $m-1$ et retranchant les résultats, il vient

$$\sum_{\sigma, \alpha} \left\{ E\left(\frac{m-\sigma a}{\alpha}\right) - E\left(\frac{m-\sigma a-1}{\alpha}\right) \right\}.$$

$$= \sum_{\sigma', \alpha'} \left\{ E\left(\frac{m-\sigma' a}{\alpha'}\right) - E\left(\frac{m-\sigma' a-1}{\alpha'}\right) \right\}.$$

Le premier membre est évidemment égal à la somme

$$\sum \psi(m-\sigma a, ra), (\sigma = 0, 1, 2, \dots)$$

et le deuxième sera donné par l'expression

$$\sum_{\sigma'} \chi \left(m - \sigma' a, \frac{\sigma'}{r} \right), (\sigma' > 0),$$

en convenant de représenter par $\chi(p, q)$ le nombre des diviseurs de p ne surpassant pas q . Nous aurons donc l'équation

$$\sum_{\substack{\sigma > \\ = 0}} \psi(m - \sigma a, r a) = \sum_{\sigma' > 0} \chi \left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{r} \right).$$

Retranchons les deux membres de l'identité

$$\sum_{\substack{\sigma > \\ = 0}} \Theta(m - \sigma a) = \psi(m, 0) + \sum_{\sigma' > 0} \Theta(m - \sigma' a),$$

où $\Theta(k) = \psi(k, 0)$ représente le nombre total des diviseurs de k ; il vient de la sorte, en employant l'identité évidente $\chi(p, q) + \psi(p, q) = \Theta(p)$:

$$\sum_{\substack{\sigma > \\ = 0}} \chi \left(m - \sigma a, r a \right) = \psi(m, 0) + \sum_{\sigma' > 0} \psi \left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{r} \right),$$

ou bien

$$(4) \quad \sum_{\sigma} \psi \left(m - \sigma a, \frac{\sigma}{r} \right) = \sum_{\sigma} \chi \left(m - \sigma a, r a \right); (\sigma = 0, 1, \dots, \left[\frac{m-1}{a} \right]).$$

C'est le cas de $r = 1$ que nous avons considéré antérieurement (*), à savoir

$$(5) \quad \sum_{\sigma=0}^{\left[\frac{m-1}{a} \right]} \psi(m - \sigma a, \sigma) = \sum_{\sigma=0}^{\left[\frac{m-1}{a} \right]} \chi(m - \sigma a, a);$$

il est intéressant de remarquer que, inversement, l'équation (4) se déduit aisément de (5). Soit en effet r un entier supérieur à un; nous pouvons prendre $\sigma = \mu r + \rho$, où $\rho = 0, 1, 2, \dots, r-1$; on a ainsi

$$\sum_{\sigma} \left(\psi(m - \sigma a, \frac{\sigma}{r}) \right) = \sum_{\rho=0}^{r-1} \sum_{\mu=0, 1, 2, \dots} \psi(m - \rho a - \mu r a, \mu),$$

et à cause de l'équation (5) cette quantité peut s'écrire

$$\sum_{\rho=0}^{r-1} \sum_{\mu=0, 1, 2, \dots} \chi(m - \rho a - \mu r a, r a),$$

ou bien

$$\sum_{\sigma} \chi(m - \sigma a, r a),$$

ce qui en effet coïncide avec le second membre de (4).

(*) Au sujet des fonctions ψ et φ v. deux notes dans le Bulletin de M. Darboux, année 1888, puis trois articles parus dans le Bulletin de la Société des Sciences de Bohême, 1894.

À titre d'exemple considérons l'équation (5) dans les cas de $a=2$; les nombres $\chi(m-2\sigma, 2)$ seront égaux à 2 ou à 1 suivant que m est pair ou impair. Lorsque m est pair, le deuxième membre sera alors $\frac{m}{2} \cdot 2 = m$, lorsque m est impair, il sera égal à $\frac{m+1}{2}$; on a donc

$$\sum_{\sigma=0, 1, 2, \dots} \psi(m-2\sigma, 2) = \frac{3m+1}{4} + (-1)^m \frac{m-1}{4}.$$

SOBRE UM THEOREMA DE GEOMETRIA SUPERIOR

POR

JORGE FREDERICO DE ÁVILLEZ

(Visconde de Reguengo)

Se dividirmos n'um mesmo numero de partes equaes os tres lados d'um triangulo, e tirarmos pelos pontos de divisão de cada um d'estes lados perpendiculares sobre os outros dois, as rectas que unem os pés d'essas perpendiculares envolvem tres parabolias tangentes duas a duas nos vertices do triangulo.

Seja ABC o triangulo dado; imaginemos dividido em n partes o lado BC e por cada ponto de divisão tiremos perpendiculares sobre os outros dois. Os pontos assim obtidos dividem os lados AB e AC em partes proporcionaes, logo as rectas que unem os pontos homologos situados sobre estes dois lados envolvem uma parabola P_1 , que passa pelos pontos B e C e é tangente n'esses pontos ás perpendiculares BH_2 e CH_3 , tiradas sobre AC e AB.

Effectuando o mesmo em relação a cada um dos outros lados, obteremos mais duas parabolias, uma P_2 passando por A e C e cujas tangentes n'esses pontos são AH_1 e CH_3 , e outra P_3 passando por A e B, e cujas tangentes são AH_1 e BH_2 .

A recta AH_1 é tangente commun ás parabolias P_2 e P_3 , BH_2 é tangente commun ás parabolias P_1 e P_3 , e CH_3 ás parabolias P_1 e P_2 ; as tres parabolias serão pois tangentes duas a duas nos vertices do triangulo dado.

D'este theorema conclue-se immediatamente que, *as tangentes communs ás tres parabolias, nos vertices do triangulo, cortam-se no orthocentro H d'este triangulo.*

As equações das tangentes ás tres parabolás, serão pois (*)

$$x \cos A = y \cos B = z \cos C$$

e as coordenadas triangulares do ponto em que elles se cortam são evidentemente, sendo S a área do triângulo ABC,

$$x = \frac{abc}{2S} \cos B \cos C,$$

$$y = \frac{abc}{2S} \cos C \cos A,$$

$$z = \frac{abc}{2S} \cos A \cos B.$$

Se unirmos H com os meios dos lados do triângulo, os pontos l, m, n , que dividem ao meio as rectas $A'H, B'H, C'H$, pertencem respectivamente ás parabolás P_1, P_2, P_3 , e as tangentes tiradas por elles ás conicas são paralelas respectivamente aos lados BC, AC e AB.

Podemos obter os fócos e as directrizes das tres parabolás pelo methodo de d'Ocagne ou pelo de Rouché. Applicando este ultimo (**), o fóco F_1 da parabola P_1 é o segundo ponto de intersecção de dois círculos, dos quaes um passa por B e toca em H a recta HC e o outro passa por C e toca em H a recta HB. Os fócos F_2 e F_3 das outras duas parabolás determinam-se do mesmo modo.

Segundo o methodo de Rouché, obtém-se a directriz da parabolá P_1 , tirando por H e B perpendiculares a HC, e por H e C perpendiculares a HB; estas rectas formam um parallelogrammo;

(*) Koehler, *Exercices de Géométrie Analytique et Géométrie Supérieure*, t. I.

(**) Rouché et De Comberousse, *Traité de Géométrie*, t. II.

a diagonal d'este parallelogrammo, que não passa por H, será a directriz da parabola P_1 .

Como temos porém já a posição do fóco F_1 , a directriz obtem-se mais facilmente construindo os pontos symetricos de F_1 , em relação ás tangentes BH_2 , CH_3 ; a recta que passa por elles é a directriz Δ_1 da parabola P_1 .

Da mesma forma construindo os pontos symetricos de F_2 e F_3 com relação ás tangentes AH_1 , CH_3 e AH_1 , BH_2 , obtemos as directrizes Δ_2 , Δ_3 das outras duas parabolias.

As perpendiculares E_1 , E_2 , E_3 tiradas dos fócos sobre as directrizes respectivas são os tres eixos das parabolias P_1 , P_2 , P_3 .

Como já dissémos as tres rectas T , T' , T'' são tangentes ás tres parabolias e paralelas aos lados do triangulo dado; estas tres rectas formam um triangulo $A_1 B_1 C_1$, cujos vertices estão sobre as alturas do triangulo fundamental, que tem por orthocentro o ponto H e cujas alturas são evidentemente eguaes a metade das alturas do triangulo ABC. Os lados do triangulo $A_1 B_1 C_1$ tambem são eguaes a metade dos lados de ABC; os dois triangulos são pois homotheticos, e temos, representando por S_1 a area de $A_1 B_1 C_1$,

$$S = 4S_1.$$

Unindo os pontos A' com B_1 , C' com A_1 e B' com C_1 , obtemos tres rectas que são evidentemente paralelas ás alturas CH_3 , BH_2 , AH_1 ; o triangulo $\alpha\beta\gamma$ formado por ellas é pois semelhante ao triangulo fundamental e circumscreto ao triangulo $A_1 B_1 C_1$, tangente ás tres parabolias.

Os pontos A' , B' , C' , H_1 , H_2 , H_3 , A_1 , B_1 , C_1 estão sobre o circulo dos nove pontos do triangulo ABC, cuja equação em coodenadas triangulares normaes (*) é

$$x^2 \operatorname{sen} 2A + y^2 \operatorname{sen} 2B + z^2 \operatorname{sen} 2C - 2yz \operatorname{sen} A -$$

$$- 2zx \operatorname{sen} B - 2xy \operatorname{sen} C = 0$$

(*) Koeler, Ibidem.

e em coordenadas tangenciaes, entrando o seu raio,

$$\lambda \operatorname{sen} A \cos (B-C) + \mu \operatorname{sen} B \cos (C-A) + \gamma \operatorname{sen} C \cos (A-B) =$$

$$= \frac{abc}{4S} \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B \operatorname{sen} C.$$

O triangulo formado pelos tres arcos de parabola AB, BC, CA, tem os seus lados tangentes aos do triangulo $A_1 B_1 C_1$. Da mesma forma os triangulos $B_1 H C_1$, $A_1 H C_1$, $A_1 H B_1$ têm os seus lados tangentes ás parabolás P_1 , P_2 , P_3 . O orthocentro do primeiro d'estes triangulos é evidentemente o ponto A_1 , e da mesma forma os orthocentros dos triangulos $A_1 H C_1$ e $A_1 H B_1$ são os pontos B_1 e C_1 .

Podemos pois dizer que : *o circulo dos nove pontos do triangulo fundamental é o circulo circumscreto ao triangulo $A_1 B_1 C_1$, cujos lados são tangentes ás tres parabolás, e a circumferencia d'este circulo passa pelos orthocentros dos tres triangulos, cujos lados são tangentes a cada uma das tres parabolás P_1 , P_2 , P_3 .*

Tambem se vê immediatamente que : *o circulo dos nove pontos do triangulo $A_1 B_1 C_1$ é o circulo circumscreto ao triangulo lmn cujos vertices estão sobre as tres conicas.*

BIBLIOGRAPHIA

H. Faye: Sur l'origine du monde. Théories cosmogoniques des anciens et des modernes, 5.^o ed., Paris, G. Villars, 1896.

A obra de que vamos dar notícia é altamente interessante, já pela natureza do assumpto, já pela forma elegante e superior como está redigida. N'ella considera o eminente sabio francez as theorias cosmogonicas que têm sido apresentadas pelos primeiros sabios tanto da antiguidade como dos tempos modernos, terminando-a pela exposição da sua propria theoria, tão bella e interessante. É consagrada á memoria do illustre Arago, o mestre do auctor, que o introduziu na carreira astronomica, e na verdade tão bellas paginas são dignas do nome a que são consagradas.

Abre o livro por uma pequena introducção sobre a ideia que se deve fazer de Deus á face da sciencia, á qual se segue a *primeira parte*, que é consagrada ás ideias cosmogonicas dos primeiros tempos, ideias expostas por Moyses no *Genesis*, o mais antigo monumento da sciencia primitiva.

A *segunda parte* da obra é destinada á exposição das ideias cosmogonicas dos antigos, as quaes, graças á influencia das viagens e dos observatorios construidos nos templos para a observação dos astros, se foram aperfeiçoando, passando-se da concepção da terra como um vasto disco chato, coberto por uma aboboda solidia, á concepção da terra como um corpo redondo immovel, cercado por uma aboboda formada por sete espheras solidas transparentes, encaixadas umas nas outras, movendo-se á roda da terra e arrastando consigo a lua, as estrellas e os cinco planetas então conhecidos. Estas ideias cosmogonicas dominaram até ao seculo xvi, em que, com Copernico e Kepler, a Astronomia entrou na sua phase scientifica.

Todavia, como faz observar o sr. Faye, já um dos maiores philosophos da antiguidade, Pythagoras, ensinava aos seus discípulos, na intimidade da escola, a rotação da terra á roda do seu eixo e

a sua translação á roda do sol, expondo comtudo ao publico as ideias correntes da epocha, provavelmente para não ferir suscep-tibilidades religiosas. N'esta parte da obra são tambem expostas, em capitulos especiaes, as ideias de Platão, Aristotéles, Cicero, Lucrecio, Ovidio e Virgilio a respeito do mundo, sendo transcri-petas e analysadas as passagens das obras d'estes homens celebres onde as suas ideias são expostas.

A terceira parte do livro é consagrada ás theorias cosmogonicas dos modernos. Abre pela exposição das ideias de Copernico e de Kepler, em que principia o triumpho das ideias pythagoricas, e apresenta depois em quatro formosos capitulos as ideias cosmo-gonicas de Descartes, Newton, Kant e Laplace.

A quarta parte da obra occupa quasi metade do volume e é consagrada ás theorias cosmogonicas do seculo ix e especialmente á bella hypothese imaginada pelo proprio auctor da obra. Antes de a expor, menciona o sr. Faye quaes as descobertas scientificas modernas a que se deve attender para formar uma theoria cosmo-gonica, descreve n'um largo capitulo o que se conhece a respeito dos mundos, que compõem o universo, e estuda finalmente n'outro largo capitulo a constituição physica do sol.

Preparado o leitor com estes elementos, expõe-lhe no capitulo seguinte a sua theoria cosmogonica, explicando como, com mate-ria, que primitivamente estava no estado cahotico, se formaram as estrellas isoladas, as estrellas duplas, o systema solar, os anneis circulares, os planetas, os satellites e os cometas. N'um outro capitulo mostra-se a concordancia da theoria exposta com a geo-logia. O capitulo seguinte, ultimo da obra, é consagrado ás hypo-theses relativas á existencia da vida nos corpos celestes e ao des-tino final do mundo actual.

Terminaremos esta rapida noticia repetindo que a leitura da obra do sr. Faye é das mais agradaveis, e acrescentando que está escripta de modo a poder ser lida por quem possue aspenas uma instrucçao geral regular.

*H. Vogt : Leçons sur la résolution algébrique des équations, Paris⁴
Nony, 1895.*

A theoria das equações algebricas, da qual foram fundadores

Lagrange, Gauss, Abel e Galois, é uma theoria difficil e extremamente interessante, que tem dado logar a trabalhos do mais alto interesse da parte de alguns dos maiores geometras modernos, como Kronecker, Netto, Jordan, etc. Expôr didacticamente esta theoria e indicar o que ha de mais essencial nas memorias que a respeito d'ella têm sido publicadas é o objecto principal do livro interessante e util que vem de publicar o sr. Vogt. N'un livro que tem este destino, as duas qualidades que principalmente se devem apreciar são, além da boa escolha dos assumptos, a clareza e a concisão; estas qualidades tem-as na verdade a nova obra, e por isso é ella muito propria para servir para o primeiro estudo da doutrina a que é consagrada.

Eis os assumptos dos treze capitulos em que o livro está dividido :

I Dos grupos de substituição. II Dos sob-grupos. Grupos simples e compostos. III Das funcções racionaes de muitas variaveis independentes. IV Relações algebricas entre as funcções racionaes de muitas variaveis. V Das funcções cyclicas e metacyclicas de muitas variaveis. VI Dominio de racionalidade. Reductibilidade das funcções inteiras. VII Das funcções racionaes das raizes d'uma equação. Grupo d'uma equação algebrica. VIII Das equações do segundo, terceiro e quarto grão. Indagações de Lagrange. IX Da resolução algebrica das equações. X Das equações abelianas. XI Das equações da divisão do circulo. XII. Das equações resolueis irreductiveis do grão primo. XIII Do grupo d'uma equação.

H. Laurent : Traité d'Algèbre (Complements), Paris, G. Villars, 1894.

N'este opusculo o auctor estuda as propriedades fundamentaes das funcções inteiras de muitas variaveis, a theoria das funcções symetricas e a theoria da eliminação. A fórmula empregada para estudar estas theorias, fundada n'un theorema importante de Jacobi, demonstrado no primeiro capitulo, é muito clara e simples. Os assumptos estão distribuidos por cinco capitulos, cujos titulos são : I Theorema de Jacobi. II As funcões symetricas e a eli-

minação. III Equações homogeneas. IV Propriedades das soluções. V Equivalencias algebricas.

B, Niewenglowski : *Cours de Géométrie analytique*, t. II, Paris, G. Villars, 1895.

Deu-se na pagina 91 d'este volume uma breve noticia a respeito do tomo I d'este excellento curso. O volume presente é consagrado á construcão das curvas planas e ao complemento da theoria das conicas.

Nos primeiros septe capitulos considera o auctor diversos assumptos de Geometria infinitesimal relativos á theoria geral das curvas planas, principalmente das algebricas. N'elles são estudadas a theoria dos pontos de inflexão, a theoria dos pontos multiplos e dos pontos singulares, a theoria da curvatura, a theoria das asymptotas, os theoremas de Newton, Maclaurin e Carnot relativos ás transversaes que cortam uma curva algebrica qualquer, as regras para a construcão das curvas, etc.

Os capitulos VIII e IX são destinados o primeiro ao estudo geral das curvas unicursaes e o segundo ao estudo de algumas curvas notaveis (cubicas unicursaes, ovaes de Cassini, hypocycloide com tres reversões, etc.).

Em todas as questões anteriores o auctor usa das coordenadas cartesianas e algumas vezes das coordenadas trilineares. No capitulo X são consideradas as coordenadas polares e applicadas ao estudo das principaes questões anteriormente consideradas e ainda a algumas outras onde estas coórdenadas são de preferencia usadas.

Os capitulos XI a XV são respectivamente consagrados a completar a theoria da ellipse, da hyperbole e da parabola, cujo estudo havia sido principiado no tomo anterior. N'elles é estudada a curvatura das conicas, a theoria das normaes a estas curvas, a theoria dos diametros, as propriedades focaes, a determinação das conicas por meio de condições dadas, etc.

O capitulo XVI é consagrado á resolução graphica das equações e finalmente o capitulo XVII á applicação dos imaginarios á geometria analytica.

Todos os assumptos considerados n'esta obra são expostos com

muita clareza, rigor e desenvolvimento. São além d'isso acompanhados por muitos exemplos e exercícios muito bem escolhidos. Por todos estes motivos recomendal-a-hemos vivamente aos professores e alumnos das nossas escolas, que terão n'ella um auxiliar excellente os primeiros para o seu ensino, os segundos para o seu estudo.

*G. Papelier : Leçons sur les coordonnées tangentialles, t. II, Paris,
Nony, 1895.*

Deu-se na pag. 52 d'este volume uma rapida noticia a respeito do tomo I d'esta obra, no qual é considerada a Geometria plana, e n'esse logar apreciamos a utilidade de uma tal publicação. No volume presente occupa-se o auctor da Geometria no espaço, distribuindo por onze capitulos os assumptos de que tracta, como vamos ver.

O capitulo I é consagrado aos primeiros principios da theoria que é o objecto do volume, isto é ao estudo da representação do ponto, do plano e da recta por meio de coordenadas tangenciaes e á resolução de diversos problemas fundamentaes, em que figuram sómente estas tres entidades geometricas, por meio d'estas coordenadas.

O capitulo II é destinado á exposição da theoria geral das curvas e das superficies. N'ella occupa-se o sr. Papelier da representação das curvas e das superficies por meio de equações entre coordenadas tangenciaes, mostra que as superficies planificaveis são representadas por duas equações e que as curvas e as superficies empenadas são representadas por uma só equação, acha a condição para que uma equação entre coordenadas tangenciaes represente uma curva, estuda a transformação das coordenadas punctuaes para coordenadas tangenciaes, determina a classe das curvas, etc. Depois no capitulo III são estudadas as superficies planificaveis, e é estendida ao espaço a theoria, tão fecunda, da dualidade, que no tomo anterior tinha sido com muito cuidado estudada no caso da Geometria plana.

No capitulo IV são considerados diversos problemas relativos aos planos tangentes e aos planos normaes, que aparecem habitualmente nos livros de Geometria analytica.

Expostos os principios geraes da theoria das curvas e das superficies, são elles, nos capitulos seguintes, applicados á theoria das quadricas, que são estudadas com grande desenvolvimento, sendo o capitulo v consagrado á sua classificação, o capitulo vi á theoria dos pólos e das polares, o capitulo vii á theoria dos centros, diametros, planos diametraes e eixos, o capitulo viii ao estudo da redução da equação geral do 2.^o grão, o capitulo ix ao estudo das coordenadas tetraedricas, o capitulo x á theoria dos fócos e das superficies homogeneas, o capitulo xi ao estudo das propriedades dos systemas de duas quadricas.

Terminando diremos ainda que a redacção de toda a obra está feita com grande cuidado e que, pela clareza com que está escrita, a sua leitura é extremamente facil.

G. Pesci: Trattato elementare di Trigonometria piana e sferica, Livorno, 1895.

Contém este livro excellente um tractado bastante extenso de Trigonometria plana e espherica, escrito com muita clareza e bom methodo.

Abre por uma introduçao, onde o auctor expõe de uma maneira rapida e simples algumas noções relativas á medida dos arcos e dos angulos, ao uso dos signaes na medida dos segmentos, e ao uso das coordenadas para determinar os pontos de um segmento, de uma circumferencia e d'uma esphera.

Segue depois a parte primeira da obra, que é consagrada á exposição da theoria das funcções trigonometricas. Estas funcções são definidas por meio das coordenadas cartesianas das extremidades dos arcos, meio o mais simples para as definir e para representar na memoria as suas variações.

A parte segunda é destinada á exposição da resolução dos triangulos planos e a parte terceira á resolução dos triangulos esphericos. Na exposição d'estes assumptos o auctor emprega, quanto possível, o mesmo methodo para tractar as questões de Trigonometria plana e as de Trigonometria espherica que são analogas.

Em todas estas partes da sua obra o sr. Pesci faz com todo o

cuidado as discussões das questões, que vae considerando, e apresenta muitas observações sobre as circumstancias a que é necessário attender para bem applicar os resultados obtidos. Além d'isso não apresenta sómente as formulas de Trigonometria mais usadas; apresenta tambem algumas de uso mais especial. Contém ainda a obra a que nos estamos referindo, além dos exemplos que vêm no fim de cada doutrina para a esclarecer, uma collecção de 2027 exercícios, dispostos gradualmente segundo a ordem da sua dificuldade, que augmentam o seu interesse, tornando-a muito util para os alumnos e professores.

Termina o volume por um appendice, onde é estudada com suficiente desenvolvimento a doutrina relativa aos calculos numericos sobre numeros approximados, de que se faz uso em Trigonometria, o meio de empregar as taboas trigonometricas e as precauções a tomar para obter os resultados do calculo com approximação determinada, etc.

Terminando diremos que a obra do sr. Pesci, assaz desenvolvida, debaixo do ponto de vista theorico, é completa debaixo do ponto de vista pratico.

C. A. Laisant : Recueil de problemes de Mathématiques (Algèbre. Théorie des nombres. Probabilités. Géométrie de situation), Paris, G. Villars, 1896.

Deu-se em alguns numeros anteriores d'este jornal noticia dos quatro volumes d'esta importante collecção de problemas, até agora publicados, e disse-se que ella contém os enunciados dos problemas que têm sido propostos nos jornaes de mathematica que apresentam aos leitores questões a resolver. Os problemas publicados no presente volume referem-se á Algebra, á theoria dos numeros, á theoria das probabilidades e á Geometria de situação, e estão dispostos em 15 capitulos classificados do modo seguinte:

I Calculo algebrico. II Derivadas, series, limites. III Equações. IV Funcções. V Identidades e desigualdades. VI Problemas diversos. VII Numeração decimal. VIII Decomposição dos numeros em sommas. IX Divisibilidade arithmetica. X Numeros primos. XI Analyse indeterminada. XII Propriedades de numeros

• •

particulares. XIII Series, identidades, questões diversas. XIV Calculo das probabilidades. XV Geometria de situação.

De novo recommendaremos esta collecção de problemas, que são quasi todos interessantes e muitos devidos a geometras eminentes, devendo ainda notar-se que bastantes d'estes problemas não foram ainda resolvidos e outros podem dar logar a novas investigações (uns e outros são indicados); o sr. Laisant encarrega-se de mandar publicar as soluções que lhe forem enviadas dos problemas que estão nas circumstancias precedentes).

Ed. Brahy : Exercices méthodiques de Calcul intégral, Paris, G. Villars, 1895.

Esta collecção de problemas é muito propria para os alumnos se exercitarem nos methodos e regras de Calculo integral, porque os problemas apresentados estão dispostos de uma maneira muito bem graduada, principiando pelos exercícios que são uma simples applicação das regras de cálculo e seguindo-lhes outros cada vez menos faceis, sem jámais attingirem um grão de difficuldade que os torne impropios para as pessoas a quem são destinados. Todos estes exercícios estão dispostos em 18 capitulos, que abrangem os assumptos que fazem parte de um curso regular de Calculo integral, principiando cada capítulo por um resumo do theorema ou metodo que vae ser applicado nos exercícios que contém o capítulo. Os assumptos d'estes capitulos são :

I Integração immediata. II Integração por transformações algebraicas. III Integração por partes. IV Integração das fracções rationaes. V Racionalisação. VI Integraes definidos. VII Quadratura das superficies planas. VIII Rectificação das curvas. IX Volumes. X Quadraturas das superficies curvas. XI Integração das funções explicitas de muitas variaveis independentes. XII Integração das equações diferenciaes de primeira ordem a duas variaveis. XIII e XIV Integração das equações lineares de ordem superior á primeira. XV Integração das equações não lineares de ordem superior á primeira. XVI Integração das equações lineares

simultaneas com coefficientes constantes, XVII Integração das equações ás derivadas parciaes. XVIII Integração por series.

Terminando diremos que este livro mereceu o elogio do illustre geometra E. Catalan, que diz d'elle : *il est fort bien fait et pourra rendre de grands services.*

B. d'Engelhardt : Observations astronomiques, t. III, Dresde, 1895.

Demos já noticia n'este jornal dos dois primeiros volumes d'esta obra importante, que contém as observações astronomicas feitas pelo eminente astronomo sr. B. d'Engelhardt no seu observatorio particular, situado em Dresde.

O terceiro volume, que vem de ser publicado, abre por uma serie de observações micrometricas de satelites de Saturno, feitas no principio d'anno de 1890. Seguem-se depois observações do eclipse de sol de 17 de junho de 1890, do eclipse da lua de 23 de maio de 1891, das occultações de Jupiter e seus satellites pela lua de 7 de agosto de 1889, de passagem de Mercurio sobre o disco do sol de 9 de maio de 1891, etc.

Vêm depois muitas observações de cometas feitas no intervallo de tempo que vae desde 1889 até 1894 e algumas observações dos planetas Themis e Diana feitas no mesmo intervallo.

Os volumes anteriores continham uma grande collecção de observações de nebulosas. No presente volume continua o sr. B. d'Engelhardt estas observações, constituindo assim um catalogo com as posições de 421 nebulosas, que foram por elle determinadas por meio de 1126 observações de ascenções rectas e 1107 observações de declinação. A estas observações segue-se a lista das estrellas que serviram para comparação.

Termina o volume uma grande collecção de medidas micrometricas de estrellas com movimento proprio, feitas no intervallo de 1871 a 1874, e uma collecção de novas medidas micrometricas de estrellas de Bradley, que são a continuação de outras publicadas no volume anterior.

A. J. da Silva Basto: Sobre a equação de Laplace a tres variáveis, Coimbra, 1895.

A equação de Laplace

$$\frac{d^2V}{dx^2} + \frac{d^2V}{dy^2} + \frac{d^2V}{dz^2} = 0$$

é uma das que figuram na lista das equações particulares de maior importancia, que se consideram no Calculo integral, já por causa do seu uso em Physica mathematica, já por causa dos bellos e profundos trabalhos a que tem dado logar. Por isso foi muito feliz a ideia que teve o sr. Silva Basto escolhendo-a para objecto da sua Dissertação inaugural, que constitue uma boa monographia, onde está exposto com elegancia e clareza o que de mais importante se tem escripto a respeito d'esta equação celebre.

No primeiro capítulo são estudadas as propriedades geraes dos integraes da equação de Laplace, que são uniformes, finitos e continuos n'um volume dado, as quaes são obtidas por meio da formula de Green. No capítulo segundo são estes integraes desenvolvidos em serie.

No capítulo terceiro são dadas as primeiras indicações sobre o problema de Dirichlet, isto é, sobre o problema que tem por fim determinar uma função que nos pontos de um volume dado represente um integral da equação de Laplace e que tome valores dados nos pontos da superficie que limita este volume; n'este mesmo capítulo é resolvido este problema no caso da esphera.

O objecto do capítulo quarto é a transformação da equação de Laplace por meio de um sistema de coordenadas curvilineas, devido a Lamé, e a resolução de um problema celebre considerado por este grande geometra, que o sr. Basto^s estuda de uma maneira mais rigorosa do que a que é habitualmente empregada.

Os tres ultimos capitulos são consagrados o primeiro á representação conforme no espaço, o segundo á exposição do methodo dado por C. Neumann para resolver o problema de Dirichlet e finalmente o terceiro ao methodo dado para o mesmo fim por Poincaré, o qual o auctor simplifica muito.

A. dos Santos Lucas: Transformações de contacto, Coimbra, 1895.

A teoria das transformações de contacto é uma teoria toda moderna, que tomou em poucos annos um grande desenvolvimento, graças aos trabalhos successivos do seu fundador, Sophus Lie, e dos discípulos d'este geometra eminentíssimo. Por isso bem fez o sr. Lucas em publicar o seu trabalho, onde é exposta de um modo resumido e claro a parte fundamental d'esta doutrina.

O opusculo está dividido em quatro capítulos. No primeiro é estudada, em alguns casos particulares, a equação diferencial de Pfaff

$$F_1 dx_1 + \dots + F_n dx_n = 0,$$

onde F_1, \dots, F_n representam funções das variáveis x_1, \dots, x_n , e são apresentadas algumas noções preliminares de que se faz uso na teoria considerada. No capítulo segundo dá o autor a definição das transformações de contacto e as suas propriedades fundamentais. No capítulo terceiro continua o estudo das propriedades das transformações de contacto e expõe um processo para a determinação d'estas transformações, que é independente de qualquer integração. Finalmente no capítulo quarto vêm as aplicações da doutrina exposta nos capítulos anteriores ao problema da integração das equações às derivadas parciais de primeira ordem com qualquer número de variáveis independentes e ao problema de Pfaff.

Antonio Cabreira: Analyse geometrica de duas espiraes, Lisboa, 1895.

O autor d'este interessante opusculo estuda n'ele as espiraes definidas pela equação

$$r = \sqrt[n]{\frac{n\theta}{\pi}},$$

ás quaes dá o nome de espiraes parabolicas de ordem n , considerando mais especialmente as espiraes de primeira e segunda ordem, das quaes apresenta um grande numero de propriedades. Os resultados achados são applicados á solução approximada do problema que tem por fim a quadratura do circulo e a cubatura da esphera.

D. Zoel G. de Galdeano : Discurso leido en la Universidad de Zaragoza en la solemne apertura del curso academico de 1895 à 1896, Zaragoza, 1895.

Contém este opusculo o bello discurso inaugural do anno academico de 1895 a 1896, pronunciado pelo sr. Galdeano na Universidade de Saragossa, o qual versa sobre o caracter e o estado das mathematicas na epocha presente. É um trabalho ao mesmo tempo historico e philosophico, em que o distincto professer hespanhol examina a origem dos diversos ramos que constituem as sciencias mathematicas e as relações que elles têm uns com os outros. Contém ainda o opusculo 16 notas em que o auctor dá informações interessantes sobre alguns pontos que no seu discurso apenas pôde indicar.

Annuaire pour l'an 1896 publié par le Bureau des longitudes, Paris, G. Villars.

Foi publicado em 1795 o primeiro volume d'esta importante e bem conhecida collecção de annuarios e desde então até hoje nem um só anno deixou de ser publicado o volume respectivo. O volume d'este anno vem, como nos annos anteriores, muito interessante. Contém, além das informações que todos os annos apresenta, as seguintes notícias scientificas :

- 1.^a *As forças a distancia e as ondulações*, por M. A. Cornu.
- 2.^a *Os trabalhos de Fresnel em Óptica*, por M. A. Cornu.
- 3.^a *Sobre a construcção das nossas cartas magnéticas do globo*, por M. Bernardières.
- 4.^a *Sobre uma terceira ascenção ao observatorio do vertice do*

Monte Branco e os trabalhos executados em 1895 n'esta montanha, por M. J. Janssen.

5.^a *Noticia sobre a vida e os trabalhos do contra-almirante Fleuriaux,* por M. Bernardières.

6.^a *Discursos pronunciados nos funeraes de M. Brunner,* por MM. Janssen e Tisserand.

Statuts de la Société belge d'Astronomie, Bruxelles, 1895.

Com o titulo de *Société belge d'Astronomie* foi fundada em Bruxellas uma sociedade, que tem por sim a vulgarisação e o ensino mutuo de Astronomia e das sciencias que têm relação com ella. No Conselho geral d'esta Sociedade figuram muitos dos principaes astronomas belgas.

Bulletin de Mathématiques élémentaires.

O jornal interessante que com este titulo principiou este anno a publicar-se em Paris é dirigido pelo sr. Niewenglowski, inspetor da Academia de Paris, e pelo sr. L. Gérard. A publicação é feita pela *Société des éditions scientifiques* em fasciculos que aparecem nos dias 1 e 15 de cada mez. Os assumptos considerados são aquelles que constituem o programma das mathematicas que se ensinam nos nossos lyceus. Em todos os numeros são propostas questões, cujas soluções aparecem nos numeros seguintes.

D. E. Guallart Elias : Pantógrafo planimetro, Madrid, 1895.

N'este opusculo é descripto pelo auctor um instrumento engenhoso que serve ao mesmo tempo para a reducção ou amplificação de um desenho e para determinar o valor das areas planas.

Este instrumento tem, como mostra o auctor, algumas vantagens sobre o planimetro de Amsler.

A. R. Forsyth : Obituary Notice. Arthur Cayley (Proceedings of the Royal Society, vol. 58).

Contém este opusculo uma noticia muito desenvolvida e muito interessante sobre a vida e os trabalhos do grande geometra inglez A. Cayley, do qual um excellente retrato adorna a primeira pagina.

Cayley nasceu em Richmond em 16 de agosto de 1821 e morreu em 26 de janeiro de 1895. Cultivou todos os ramos da Mathematica e em todos elles deixou vestigios do seu genio profundo. O numero de memorias que publicou é consideravel e são todas de um alto valor. Na noticia dada pelo sr. Forsyth encontram-se a respeito d'ellas valiosas informações.

A. Bassani : Sulle funzioni determinanti e generatrici di Abel (Atti della R. Accademia delle Scienze di Napoli, série 2.^a, vol. vii).

N'esta memoria importante estuda o auctor a dependencia e as propriedades das duas funcções ligadas pela equação.

$$\varphi(x) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\lambda} e^{-xz} F(z) dz,$$

o integral sendo tomado ao longo da curva fechada λ . Como applicação determina alguns integraes definidos e alguns desenvolvimentos de funcções analyticas em serie d'outras funcções. Acompanha o assumpto um resumo da historia das indagações a que tem dado logar a equação precedente.

Emory McClintock : Theorems in the Calculus of Enlargement (American Journal of Mathematics, vol. XVII).

O novo ramo de calculo, que é objecto da presente memoria, foi exposto pelo auctor n'uma memoria importante publicada no vol. II do *American Journal of Mathematics*. Este calculo é uma extensão do calculo das diferenças finitas e constitue uma especie de algebra formal na qual a theoria da differenciação corresponde á theoria dos logarithmos na algebra ordinaria. Na presente memoria o auctor apresenta as series que no novo calculo correspondem ás series de Lagrange e Laplace para o desenvolvimento das funcções implicitas.

Emory McClintock : A Method for Calculating Simultaneously all the Roots of an Equation (American Journal of Mathematics, vol. XVII).

N'esta memoria é apresentado pelo auctor um methodo para determinar simultaneamente todas as raizes de uma equação algebrica qualquer dada. Para esse fim apresenta o auctor series ás quaes chega por meio do calculo a que nos referimos na noticia anterior. Assim, por exemplo, para resolver a equação

$$x^6 = -1 - x,$$

apresenta a serie

$$x = \omega + \frac{1}{6} \omega^2 - \frac{1}{24} \omega^3 + \frac{1}{81} \omega^4 - \dots$$

onde ω representa as seis raizes de -1 .

R. Marcolongo : Deformazione di una sfera isotropa (Annali di Matematica, serie 2.^a, t. XXIII).

Depois de algumas noções historicas a respeito do estudo da

deformação de uma esphera isotropa, o auctor resolve douos novos problemas relativos a esta questão, supondo a esphera solicitada por forças quaesquer e que não são dadas, sobre a superficie limite, nem todas as componentes do deslocamento nem todas as componentes das forças. Na segunda parte da sua bella e importante memoria dá o sr. Marcolongo ás equações em coordenadas polares do equilibrio de um corpo elastico isotropo uma fórmula nova muito simples, por meio da qual demonstra e generalisa as formulas dadas por Borchardt para resolver por meio de integraes definidos o problema da deformação da esphera e os desenvolvimentos em series dados por Chree para resolver o mesmo problema.

S. Pincherle : L'Algebra delle forme lineari alle differenze (Memorie delle R. Accademia delle Scienze di Bologna, serie 5.^a, t. v).

O assumpto d'esta memoria pertence ao calculo a que o auctor chama *Calculo funcional*, isto é a um genero de calculo em que as funcões representam o papel que os numeros representam nas operaçoes da Algebra ordinaria. A presente memoria é o primeiro d'alguns trabalhos que o eminentge geometra italiano tenciona consagrar ao estudo das opéraçoes funcionaes, que gosam da propriedade distributiva, e n'ella é considerada a mais simples d'estas operaçoes, isto é, aquella cujo effeito sobre uma função é augmental-a de uma unidade. Esta operaçao é designada por θ , de modo que temos

$$\theta f(x) = f(x + 1), \quad \theta^a(fx) = f(x + a),$$

e dá logar a fórmulas lineares

$$F = a_0 + a_1 \theta + a_2 \theta^2 + \dots + a_m \theta^m,$$

onde a_0, a_1, a_2, \dots são funcões de x , que representam a ope-

ração por meio da qual a função $f(x)$ se converte em

$$a_0 f(x) + a_1 f(x+1) + \dots + a_m f(x+m),$$

as quais são estudadas tanto no caso de m ser finito como no caso de ser infinito.

M. Lerch : Bemerkungen über eine classe arithmetischer Lehrsätze (Sitzungsberichte der konigl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1894).

— *Zur Theorie der Kronecker, schen Doppelreihe Ser (ξ, ζ, u, v, w) (Monatsheft für Mathematik, t. v).*

Gutzmer : Ueber den analytischen Ausdruck des Huygenschen Prinzip (Journal für die reine und angewandte Mathematik, t. 114).

— *Zur Theorie der linearen homogenen Differentialgleichungen (Item, t. 115).*

M. d'Ocagne : Solution géométrique complète de la troisième partie du problème d'admission à l'École Polytechnique (Nouvelles Annales, 3.^e série, t. XIV).

— *Sur la composition des lois de probabilité des erreurs de situation d'un point sur un plan (Bulletin de la Société mathématique de France, t. XXIII).*

— *Sur une application de la théorie de la probabilité des erreurs aux nivelllements de haute précision (Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1895).*

C. A. Laisant : Note sur les invariants des polynômes entiers (Rend. del Circolo matematico di Palermo, t. VII).

— *Extension de l'expression de la dérivée logarithmique d'un polynôme entier (Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Caen, 1894).*

Pirondini : Quelques propriétés de l'hyperbole (Mathesis, 2.^e série, t. III).

— *Di alcune superficie che ammettono un sistema di linnee eguali o simili (Annali di Matematica, 1894).*

E. Pascal : Sulle funzioni ellittiche pari (Rend. del R. Ist. Lomb, 1895).

E. Carvallo : Sur la dépolarisation de la lumière dans le voisinage des axes optiques des cristaux biaxes (Journal de Physique, 5.^e série, t. IV).

E. Lemoine : Étude sur le triangle et sur certains points de Géométrie (Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, vol. XIII).

C. Buralli-Forti : Sul limite delle classi variabili (Atti della R. Accademia di Torino, 1895).

G. Pesci : Errori prodotti dalla interpolazione semplice nell' uso delle tavole logarithmo-trigonometriche (Rivista maritima, 1895).

G. Vivanti : Preliminari per lo studio delle funzioni di due variabili (Rend. del Circolo matematico di Palermo, t. IX).

— *Über gewisse der Ikosaederirrationalität analoge Irrationalitäten (Monatshefte für Mathematik, t. VI).*

— *Sulle superficie a curvatura media costante (Rend. del R. Ist. Lombardo, 1895).*

Macfarlane : On the units of light and radiation (American Institute of Electrical Engineers, 1895).

D. Besso : Di una formula relativa all' integrale ellittico completo di prisma specie, contenuta in una precedente Nota (Rend. delle R. Accademia dei Lincei, 1895).

G. B. Guccia : Sur une question concernant les points singuliers des courbes gauches algébriques (Comptes rendus de l' Académie des Sciences de Paris, 1895).

— *Sur les points doubles d'un faisceau de surfaces algébriques (Item).*

— *Sur une expression du genre des courbes gauches algébriques douées de singularités quelconques (Bulletin de la Société mathématique de France, 1895).*

G. Peano : Sopra lo spostamento del polo sulla terra (Atti della R. Accademia di Torino, 1895).

Gino Loria : Per Lean Battista Alberti (Bibliotheca mathematica de Eneström, 1895).

G. T.

JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS

PUBLICADO

PELO

Dr. F. Gomes Teixeira

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.

VOL. XII—N.^o 6

COIMBRA

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE

1896

JORNAL
1860

G. Pinto - Sociedade de Astronomia e Matemática
SCIENTIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS

PUBLICADO

nao. 1, 1860, Rio de Janeiro, Brazil (Biblioteca Nacional
de Brasília, 1860)

verso

D. F. Gomes Teixeira

Editor da Academia Imperial das Ciências
da Impélio Português da Província da Guanabara, e
socio da Academia Imperial das Ciências da Província do Brasil

VOL. XII - N.º 8

COLUNA
NOTÍCIAS DA CNAE/BRASIL
1860

SUR UN CAS PARTICULIER DU MOUVEMENT
D'UN CORPS SOLIDE DANS UN LIQUIDE INDÉFINI

PAR

R. MARCOLONGO

(Professeur à l'Université de Messina)

Les équations du mouvement d'un corps solide dans un liquide indéfini, données par Kirchhoff (Jorn. Crelle T. 71), ont été transformées par Clebsch (Math. Ann. T. III) dans les suivantes :

$$1) \quad \begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= x_3 \frac{\delta T}{\delta y_2} - x_2 \frac{\delta T}{\delta y_3}; \text{ etc.} \\ \frac{dy_1}{dt} &= x_3 \frac{\delta T}{\delta x_2} - x_2 \frac{\delta T}{\delta x_3} + y_3 \frac{\delta T}{\delta y_2} - y_2 \frac{\delta T}{\delta y_3}; \text{ etc.} \end{aligned}$$

T est la force vive du liquide et du corps et est une fonction homogène quadratique positive des six variables x, y .

C'est un système de six équations différentielles du premier ordre, dont on connaît le dernier multiplicateur, égal à l'unité, et les intégrales :

$$2T = l; \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = m^2; \quad x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = n.$$

Le problème est résolu si l'on peut trouver une quatrième intégrale indépendante du temps. Clebsch cherche si le système 1) admet une intégrale linéaire en x et y et il trouve que cela est possible seulement dans un cas ; et puis si le même système admet une intégrale fonction homogène du second ordre en x et y ; ce qui est possible dans deux cas, dans lesquels l'intégration se fait par les fonctions hyperelliptiques. Ces cas ont été traités par M. Weber (Math. Ann., T. XIV) et puis par M. Kötter F. (Journ. Crelle, cix).

Il y a cependant un autre cas échappé à l'analyse de Clebsch et signalé par M. Stekloff (Math. Ann., T. XLII).

Dans le premier cas la quatrième intégrale est : $y_3 = \text{const.}$

Alors il faut que :

$$x_2 \frac{\delta T}{\delta x_1} - x_1 \frac{\delta T}{\delta x_2} + y_2 \frac{\delta T}{\delta y_1} - y_1 \frac{\delta T}{\delta y_2} = 0.$$

Donc T est une fonction de :

$$x_1^2 + x_2^2; \quad y_1^2 + y_2^2; \quad x_1 y_1 + x_2 y_2;$$

et encore de x_3 et y_3 ; on doit donc pouvoir donner à T la forme :

$$\begin{aligned} 2T = & p(x_1^2 + x_2^2) + p' x_3^2 + 2q(x_1 y_1 + x_2 y_2) + 2q' x_3 y_3 + \\ & + r(y_1^2 + y_2^2) + r' y_3^2, \end{aligned}$$

où p, p', r, r', q, q' sont des constantes ; les quatres premières sont positives.

C'est ce qu'on prouve en effet par un choix convenable des axes.

Dans ce cas l'intégration se fait par les fonctions elliptiques ; Halphen (Fonct. Ellipt. T. II) le traite avec sa superiorité habituelle, et puis déduit, d'une manière assez pénible, le cas particu-

lier où l'on a $p = p'$, très intéressant pour les analogies qu'il présente avec le mouvement d'un corps grave de révolution suspendu par un point de son axe.

Je me propose de traiter directement ce cas; beaucoup des simplifications obtenues peuvent aussi s'obtenir dans le cas général.

Soient $(x_0 \ y_0 \ z_0)$ les axes fixes; $(x_1 \ y_1 \ z_1)$ les axes mobiles avec le corps; u_1, v_1, w_1 les composantes sur les axes mobiles de la translation du corps; p_1, q_1, r_1 les composantes, sur les mêmes axes, de la rotation instantanée du liquide par rapport au corps. Si l'on se rappelle que :

$$p_1 = \frac{\delta T}{\delta y_1}, \quad q_1 = \frac{\delta T}{\delta y_2}, \quad r_1 = \frac{\delta T}{\delta y_3},$$

les trois premières équations du système 1) montrent aussitôt que x_1, x_2, x_3 sont proportionnelles respectivement à :

$$\cos(x_1 z_0); \cos(y_1 z_0); \cos(z_1 z_0).$$

De sorte que :

$$x_1 = m \cos(x_1 z_0); \quad x_2 = m \cos(y_1 z_0); \quad x_3 = m \cos(z_1 z_0).$$

Le système 1) peut être remplacé par le suivant :

$$2) \quad \frac{d \log(x_1 + ix_2)}{dt} = i(q' - q)x_3 + ir'y_3 - irx_3 \frac{y_1 + iy_2}{x_1 + ix_2}$$

$$\frac{dx_3}{dt} = r(x_2 y_1 - x_1 y_2)$$

$$\frac{y_1 + iy_2}{x_1 + ix_2} = \frac{(y_1 + iy_2)(x_1 - ix_2)}{m^2 - x_3^2} = \frac{y_3 \left(n_1 - x_3 - \frac{i}{ry_3} \frac{dx_3}{dt} \right)}{m^2 - x_3^2};$$

$$n_1 = \frac{n}{y_3}.$$

• •

On a cette propriété : après avoir déterminé x_3 en fonction du temps, l'intégration du système s'achève par une quadrature.

En effet la troisième équation nous donnera $\frac{y_1 + iy_2}{x_1 + ix_2}$; et la première, avec une quadrature, $x_1 + ix_2$; $x_1 - ix_2$ se déduira tout de suite aussi, car on connaît $x_1^2 + x_2^2 = m^2 - x_3^2$; et puisque de l'intégrale $2T = l$ on tire

$$y_1^2 + y_2^2 = \frac{2(q' - q)y_3}{r} (m_1 - x_3)$$

où m_1 est constante, de la valeur de $y_1 + iy_2$, on déduira celle de $y_1 - iy_2$.

La deuxième équation nous donne

$$\frac{1}{r^2} \left(\frac{dx_3}{dt} \right)^2 = (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2) - (x_1 x_2 + y_1 y_2);$$

c'est à dire

$$(3) \quad \frac{1}{r^2} \left(\frac{dx_3}{dt} \right)^2 = \frac{(q' - q)y_3}{2r} \left\{ 4(x_3^2 - m^2)(x_3 - m_1) - \right.$$

$$\left. - \frac{2ry_3}{q' - q} (x_3 - m_1)^2 \right\}.$$

Donc x_3 est une fonction elliptique du temps.

Disons 3h le coefficient de x_3^2 dans le polinôme entre paren-

thèse, ρ la constante d'homogénéité ; si nous posons :

$$u = \frac{i\rho ry_3}{s} t + \text{const} ;$$

$$s = i \sqrt{\frac{2y_3 \rho r}{q' - q}}$$

l'on a :

$$x_3 = -\frac{1}{4} h + \rho pu.$$

Soient a, a_1, a_2 , trois constantes telles que :

$$x_3^2 - m^2 = \rho^2 (pu - pa) (pu - pa_1); \quad x_3 - m_1 = \rho (pu - pa_2);$$

h, m, m_1 , s'expriment au moyen de a, a_1, a_2 , par les formules

$$h = 2\rho (pa + pa_1); \quad 2m = \rho (pa - pa_1); \quad 2m_1 = \rho (2pa_2 - pa - pa_1)$$

Par conséquent

$$x_3 - m = \rho (pu - pa); \quad x_3 + m = \rho (pu - pa_1),$$

$$x_3 = -\frac{\rho}{2} \frac{\sigma^2 a_1 \sigma(u-a) \sigma(u+a) + \sigma^2 a \sigma(u-a_1) \sigma(u+a_1)}{\sigma^2 a \sigma^2 a_1 \sigma^2 u},$$

$$x_3^2 - m^2 = \rho^2 \frac{\sigma(u-a) \sigma(u+a) \sigma(u-a_1) \sigma(u+a_1)}{\sigma^2 a \sigma^2 a_1 \sigma^4 u}.$$

L'équation (3) se transforme ainsi :

$$p'^2 u - \frac{s^2}{\wp^4} [(x_3 - n_1)^2] = 4 (pu - pa) (pu - pa_1) (pu - pa_2).$$

Faisons

$$\varphi(u) = p'u - \frac{s}{\wp^2} (x_3 - n_1),$$

et nous aurons

$$\varphi(u) \varphi(-u) = -4 (pu - pa) (pu - pa_1) (pu - pa_2).$$

Le premier membre est une fonction entière de pu ; elle a les zéros $\pm a; \pm a_1; \pm a_2$ et l'infini sextuple $u=0$; donc $\varphi(u)$ a les zéros $-a, -a_1, a_2 = a + a_1$; d'où il suit que :

$$\varphi(u) = \frac{2}{\sigma a \sigma a_1 \sigma(a+a_1)} \frac{\sigma(u+a) \sigma(u+a_1) \sigma(u-a-a_1)}{\sigma^3 u},$$

$$\varphi(-u) = \frac{2}{\sigma a \sigma a_1 \sigma(a+a_1)} \frac{\sigma(u-a) \sigma(u-a_1) \sigma(u+a+a_1)}{\sigma^3 u}.$$

Mais $\varphi(u)$ a aussi la forme

$$Ap u + Bp'u + C,$$

et avec les méthodes connues on trouve

$$A = \frac{p'a_1 - p'a}{pa_1 - pa}; \quad B = 1;$$

$$C = \frac{pa p'a_1 - pa_1 p'a}{pa - pa_1}.$$

On peut donc aussi exprimer les deux constantes s, n_1 au moyen de a et a_1 . Ainsi :

$$\frac{p'a_1 - p'a}{pa_1 - pa} = 2 |\zeta(a + a_1) - \zeta a - \zeta a_1| = -\frac{s}{\rho}.$$

Enfin, observons que :

$$x_3 - m_1 = -\rho \frac{\sigma(u - a - a_1) \sigma(u + a + a_1)}{\sigma^2 u \sigma^2(a + a_1)},$$

$$y_1^2 + y_2^2 = -\frac{4\rho^2 y_3^2}{s^2} \frac{\sigma(u - a - a_1) \sigma(u + a + a_1)}{\sigma^2 u \sigma^2(a + a_1)}.$$

Comme il a été observé, il faut exprimer $\frac{y_1 + iy_2}{x_1 + ix_2}$ en fonction de u . Or :

$$(y_1 + iy_2)(x_1 - ix_2) = y_3 \left\{ \frac{\rho^2}{s} p'u - (x_3 - n_1) \right\} = \frac{\rho^2 y_3}{s} \varphi(u),$$

$$(y_1 - iy_2)(x_1 + ix_2) = -\frac{\rho^2 y_3}{s} \varphi(-u),$$

d'où :

$$\frac{y_1 + iy_2}{x_1 + ix_2} = \frac{2y_3}{s} \frac{\sigma a \sigma a_1}{\sigma(a+a_1)} \frac{\sigma u \sigma(u-a-a_1)}{\sigma(u-a)\sigma(u-a_1)}.$$

Maintenant on peut déterminer $x_1 + ix_2$; en effet la première équation du système 2) devient :

$$\frac{d(\log(x_1 + ix_2))}{du} + \frac{2\rho}{s} pu = \frac{\rho}{s} (pa + pa_1) + \frac{sr'}{\rho r} -$$

$$-(2pu - pa - pa_1) \frac{\sigma a \sigma a_1 \sigma u \sigma(u-a-a_1)}{\sigma(a+a_1) \sigma(u-a) \sigma(u-a_1)}.$$

Il s'agit de décomposer le second membre, qui est une fonction rationnelle de pu et $p'u$, en éléments simples. Les pôles sont : 0, a , a_1 ; elle a donc la forme

$$\alpha + A\zeta(u-a) + A_1\zeta(u-a_1) + B\zeta u.$$

Les valeurs des constantes se trouvent aisément; elles sont :

$$A = A_1 = 1; B = -2;$$

$$\alpha = \zeta a + \zeta a_1 + \frac{\rho}{s} (pa + pa_1) + \frac{s(r' - r)}{\rho r}.$$

Donc :

$$\frac{d \log(x_1 + ix_2)}{du} = -\frac{2\rho pu}{s} + \alpha + \frac{d}{du} \log \frac{\sigma(u-a)\sigma(u-a_1)}{\sigma^2 u}.$$

En intégrant et disposant convenablement de la constante, on a :

$$x_1 + ix_2 = \rho E \frac{\sigma(u-a)\sigma(u-a_1)}{\sigma a \sigma a_1 \sigma^2 u} e^{\left(\frac{2\rho}{s}\zeta u + \alpha u\right)}.$$

Les formules suivantes s'en déduisent aussitôt :

$$x_1 - ix_2 = -\frac{\rho}{E} \frac{\sigma(u+a)\sigma(u+a_1)}{\sigma a \sigma a_1 \sigma^2 u} e^{-\left(\frac{2\rho}{s}\zeta u + \alpha u\right)}$$

$$y_1 + iy_2 = \frac{2\rho y_3 E}{s} \frac{\sigma(u-a-a_1)}{\sigma(a+a_1)\sigma u} e^{\left(\frac{2\rho}{s}\zeta u + \alpha u\right)}$$

$$y_1 - iy_2 = -\frac{2\rho y_3}{s E} \frac{\sigma(u+a+a_1)}{\sigma(a+a_1)\sigma u} e^{-\left(\frac{2\rho}{s}\zeta u + \alpha u\right)}.$$

Pourachever la solution il faut déterminer les composantes de la rotation, les cosinus des angles des axes mobiles, les coordonnées

de l'origine en fonction de u . Puisque :

$$p_1 = qx_1 + ry_1;$$

$$q_1 = qx_2 + ry_2;$$

$$r_1 = q'x_3 + r'y_3$$

et :

$$p_1 + iq_1 = q(x_1 + ix_2) + r(y_1 + iy_2)$$

la détermination des composantes de la rotation n'offre de difficulté. Pour les cosinus observons que :

$$\cos(x_1 z_0) \pm i \cos(y_1 z_0) = \frac{1}{m} (x_1 \pm ix_2).$$

Donc :

$$\begin{aligned} & \cos(x_1 z_0) + i \cos(y_1 z_0) = \\ &= \frac{2E \sigma a \sigma a_1}{\sigma(a_1 + a)\sigma(a_1 - a)} \frac{\sigma(u - a)\sigma(u - a_1)}{\sigma^2 u} e^{(\frac{2\sigma}{s}\zeta u + \alpha u)} \\ & \quad \cos(x_1 z_0) - i \cos(y_1 z_0) = \\ &= - \frac{2\sigma a \sigma a_1}{E \sigma(a_1 + a)\sigma(a_1 - a)} \frac{\sigma(u + a)\sigma(u + a_1)}{\sigma^2 u} e^{-(\frac{2\sigma}{s}\zeta u + \alpha u)} \\ & \quad \cos(z_1 z_0) = \frac{2pu - pa - pa_1}{pa - pa_1}. \end{aligned}$$

Rappelons maintenant la formule :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \log (\cos x_0 z_1 + i \cos y_1 z_0) = & -\frac{i}{2} \left\{ \frac{(\cos z_0 x_1 + i \cos z_0 y_1)(p_1 - iq_1)}{1 + \cos z_0 z_1} + \right. \\ & \left. + \frac{(\cos z_0 x_1 - i \cos z_0 y_1)(p_1 + iq_1)}{1 - \cos z_0 z_1} \right\}. \end{aligned}$$

Le second membre est égal à :

$$\begin{aligned} & -\frac{i}{2} \left\{ \frac{x_1 + ix_2}{m + x_3} [q(x_1 - ix_2) + r(y_1 - iy_2)] + \frac{x_1 - ix_2}{m - x_3} [q(x_1 + ix_2) + \right. \\ & \left. + r(y_1 + iy_2)] \right\}. \end{aligned}$$

ou encore à :

$$-iqm - \frac{ir\rho y_3}{2s} \left\{ \frac{\varphi(u)}{pu - pa} - \frac{\varphi(-u)}{pu - pa_1} \right\}.$$

Considérons la fonction :

$$\frac{1}{2} \frac{\varphi(u)}{pu - pa} = -\frac{\sigma a}{\sigma a_1 \sigma(a + a_1)} \frac{\sigma(u + a_1) \sigma(u - a - a_1)}{\sigma(u - a) \sigma u},$$

Les pôles étant 0, a , les zéros $-a_1$, $a+a_1$, on la met sous la forme :

$$\zeta a_1 - \zeta(a+a_1) - \zeta(u-a) - \zeta u$$

et par conséquent :

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \log (\cos z_0 x_1 + i \cos z_0 y_1) = \\ & = -iqm - \frac{ir\varphi y_3}{s} \left\{ \zeta a_1 - \zeta a - \frac{d}{du} \log \frac{\sigma(u-a)\sigma(u+a_1)}{\sigma^2 u} \right\}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} & \cos z_0 x_1 + i \cos z_0 y_1 = \\ & = \frac{2E e^{-iqmt}}{\sigma(a-a_1)\sigma(a+a_1)} \frac{\sigma(u-a)\sigma(u+a_1)}{\sigma^2 u} e^{(\zeta a - \zeta a_1)u}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos z_0 x_1 - i \cos z_0 y_1 = \\ & = - \frac{2e^{-iqmt}}{E\sigma(a-a_1)\sigma(a+a_1)} \frac{\sigma(u+a)\sigma(u-a_1)}{\sigma^2 u} e^{-(\zeta a - \zeta a_1)u}. \end{aligned}$$

Représentons enfin par X, Y, Z les coordonnées de l'origine des

axes mobiles. Kirchhoff a prouvé que :

$$X = \frac{1}{m} \left\{ y_1 \cos(x_1 y_0) + y_2 \cos(y_1 y_0) + y_3 \cos(z_1 y_0) \right\},$$

$$Y = -\frac{1}{m} \left\{ y_1 \cos(x_1 x_0) + y_2 \cos(y_1 z_0) + y_3 \cos(z_1 x_0) \right\},$$

d'où :

$$X + iY =$$

$$= -\frac{i}{m} \left\{ y_1 (\cos x_1 x_0 + i \cos x_1 y_0) + y_2 (\cos y_1 x_0 + i \cos y_1 y_0) + y_3 (\cos z_1 x_0 + i \cos z_1 y_0) \right\}.$$

Or on a :

$$(\cos x_1 x_0 + i \cos x_1 y_0) + i (\cos y_1 x_0 + i \cos y_1 y_0) =$$

$$= \frac{(\cos z_1 x_0 + i \cos z_1 y_0) (\cos x_1 z_0 + i \cos y_1 z_0)}{1 + \cos z_1 z_0},$$

$$(\cos x_1 x_0 + i \cos x_1 y_0) - i (\cos y_1 x_0 + i \cos y_1 y_0) = -$$

$$- \frac{(\cos z_1 x_0 + i \cos z_1 y_0) (\cos x_1 z_0 - i \cos y_1 z_0)}{1 - \cos z_1 z_0}.$$

Donc :

$$X + iY = -\frac{i}{2m} (\cos z_1 y_0 + i \cos z_1 y_0) \left\{ \frac{(\cos x_1 z_0 + i \cos y_1 z_0)(y_1 - iy_2)}{1 + \cos z_1 z_0} \right.$$

$$\left. - \frac{(\cos x_1 z_0 - i \cos y_1 z_0)(y_1 + iy_2)}{1 - \cos z_1 z_0} + 2y_3 \right\}.$$

On pourra donc regarder comme connus les binômes $X \pm iY$; la recherche de Z n'offre de difficulté.

Si l'on rapproche les formules qui donnent $\cos z_0 z_1; \cos z_0 x_1 \pm i \cos z_0 y_1$, avec les formules analogues dans le mouvement d'un corps grave de révolution suspendu par un point de son axe de symétrie, on conclut que le mouvement de l'axe du corps dans un liquide et de l'axe d'un corps grave de révolution diffèrent par une rotation uniforme dont la vitesse est mq .

Messina : mars 1896.

BIBLIOGRAPHIA

*F. Klein : Leçons sur certaines questions de Géométrie élémentaire.
Redaction française par J. Griss, Paris, Nony, 1896.*

Contém este opusculo uma serie de conferencias feitas pelo eminente professor da Universidade de Gottingen, F. Klein, durante as ferias da Paschoa de 1894, n'aquelle Universidade.

O objecto d'estas conferencias, vivamente interessante e magistralmente tratado pelo auctor, é o estudo de alguns problemas de Geometria elementar que se tornaram celebres em virtude dos esforços empregados pelos geometras antigos para os resolverem. São elles :

- 1.º O problema da duplicação do cubo, tambem chamado problema de Délos ;
- 2.º O problema da trisecção do angulo ;
- 3.º A quadratura do círculo.

A respeito de cada um d'estes problemas o auctor examina as condições da possibilidade ou impossibilidade de uma solução geometrica, e para esse fim não emprega outros meios que os puramente elementares, isto é os que possuem os alumnos das nossas escholas superiores de mathematica no fim do 1.º anno.

Os geometras antigos procuraram resolver os problemas, a que vimos de nos referir, por meio da régua e do compasso ordinário, isto é por meio do traçado de rectas e círculos, sem o poderem conseguir. A falta de sucesso dos esforços empregados para os resolver por este meio levou depois os geometras a considerar como provável a impossibilidade de um tal modo de solução, sem todavia a demonstrarem, continuando por isso a haver quem se occupasse d'elles. Só modernamente foi esta impossibilidade demonstrada, e é a esta questão que é principalmente consagrado o livro de Klein.

Para conseguir este fim, estabelece primeiramente o auctor que é condição necessária e suficiente para que uma expressão ana-

lytica possa ser construida por meio da régua e do compasso, que ella se deduza das grandezas conhecidas por meio de operações racionaes ou por meio de raizes quadradas em numero finito. Depois mostra que esta condição não se verifica nos problemas enunciados.

Contém o livro a que nos estamos referindo uma introducção e dez capitulos.

Na introducção menciona o auctor resumidamente o objecto do seu trabalho.

No capitulo I são apresentadas algumas proposições, tiradas da theoria das equações algebricas, as quaes são relativas á resolução d'estas equações por meio de radicaes. Estas proposições são usadas no capitulo II para se demonstrar a impossibilidade de resolver por meio da régua e do compasso o problema da duplicação do cubo (construcção d'um cubo duplo d'um cubo dado) e o problema da trissecção do angulo.

O capitulo III é dedicado ao theorema celebre de Gauss, segundo o qual é condição necessaria e suficiente para que o circulo possa ser dividido em p partes iguaes por meio da régua e do compasso, p representando um numero primo, que este numero seja da forma $2^{2^m} + 1$. O caso de ser $m = 2$, isto é o caso da divisão do circulo em 17 partes iguaes, é desenvolvidamente estudado no capitulo IV, onde é exposto o meio de executar esta divisão.

No capitulo V apresenta o auctor algumas generalidades sobre a construcção das expressões algebricas por meio de conicas e por meio de curvas de ordem superior, quando o problema não pôde ser resolvido por meio de rectas e circumferencias.

Passa depois o auctor a estudar o problema da quadratura do circulo. Para preparar para este estudo, demonstra em primeiro logar a existencia de numeros transcendentes. Demonstra depois o theorema de Hermite, segundo o qual o numero e , base dos logarithmos neperianos, é transcidente, e finalmente o theorema a que Lindemann foi levado por uma extensão da demonstração dada por Hermite do theorema precedente, segundo o qual o numero π é tambem transcidente. Para demonstrar estas proposições notaveis, emprega Klein um methodo muito elementar, devido a Gordan. Como consequencia do theorema de Lindemann resulta que o numero π não pôde ser construido com régua e compasso, nem portanto por meio d'estes instrumentos pôde ser resolvido o problema da quadratura do circulo. Termina o livro

um rapido exame d'um instrumento inventado por um engenheiro russo, Abdank-Akakanowicz, por meio do qual se pôde traçar, por um movimento continuo, uma curva transcendente que determina o numero π .

Todas as questões tratadas no bello livro de Klein são acompanhadas de informações historicas do maior interesse.

E. Goursat : Leçons sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du second ordre, Paris, t. 1, A. Hermann, 1896

Ha alguns annos publicou o sr. Goursat um volume importante sobre a integração das equações ás derivadas parciaes, no qual se occupava unicamente das equações de 1.^a ordem.

No volume actual continua o sabio geometra os seus trabalhos sobre este assumpto importante, considerando agora as equações de 2.^a ordem, das quaes promette continuar ainda a ocupar-se n'um segundo volume.

O auctor dividiu o seu bello e importante trabalho em quatro capitulos, do assumpto dos quaes vamos dar uma noticia resumida.

No capitulo I são consideradas em primeiro logar as equações ás derivadas parciaes das superficies geradas pelas curvas d'um complexo ou envolvidas pelas superficies d'um complexo. Em seguida é considerada a questão que tem por fim determinar uma superficie integral d'uma equação ás derivadas parciaes $F(x, y, z, p, q, r, s, t) = 0$ dada, que passa por uma curva dada e é tangente ao longo d'esta curva a uma superficie planificavel tambem dada, questão a què o auctor dá o nome de *problema de Cauchy*, por estar ligada com a theoria da existencia dos integraes, considerada por este grande geometra. Fundado nos resultados d'este problema, define o auctor com precisão o que se deve intender por *integral geral* das equações ás derivadas parciaes de 2.^a ordem.

No capitulo II estuda o sr. Goursat desenvolvida e profundamente a equação $Hr + zKs + Lt + M + N(rt - s^2) = 0$, (H, K, L, M, N representando funcões de x, y, z, p, q), conhecida pelo nome de equação de Monge e Ampère, por ter sido considerada primeiramente por Monge, no caso de ser $N=0$, e em seguida

por Ampère em duas memorias celebres publicadas no Jornal da Escola Polytechnica de Paris. A respeito d'esta equação o auctor considera o problema de Cauchy, os methodos de integração de Monge e Ampère, a applicação d'estes methodos á integração da equação das superficies minimas, etc. Para dar mais generalidade ás theorias expostas, o auctor estende a definição de integral, seguindo o caminho aberto por S. Lie para o caso das equações de 1.^a ordem.

No capitulo III faz o auctor muitas applicações interessantes dos methodos expostos nos capitulos anteriores. Assim, determina as *superficies de Joachimsthal*, isto é as superficies em que as linhas de curvatura d'um dos systemas são curvas planas, cujos planos passam por uma recta fixa; determina as *superficies de Monge*, isto é as superficies em que as linhas de curvatura d'um dos systemas estão situadas sobre espheras concentricas; determina as superficies para as quaes a representação espherica d'um dos systemas de linhas de curvatura se compõe de circulos passando por douos pontos fixos da esphera; procura as superficies que admitem uma representação espherica dada, etc.

No ultimo capitulo o auctor extende a noção de *caracteristica*, primeiramente definida só para a equação de Monge e Ampère, a equações de fórmia qualquer, estuda profundamente esta noção e d'este estudo tira consequencias do maior interesse para a theoria a que o livro é consagrado.

Todos os assumptos d'esta obra importante são tratados com muita elegancia, clareza e originalidade.

P. Painlevé : Leçons sur le frottement, Paris, Hermann, 1895.

Contém este volume algumas bellas lições feitas na Faculdade das Sciencias de Paris pelo sr. P. Painlevé. N'ellas se occupa este illustre geometra do movimento dos systemas dotados de attricto, considerando os systemas formados por pontos materiaes isolados e os systemas formados por corpos continuos, cuja posição só depende d'um numero finito de parametros.

As primeiras 57 paginas do volume são destinadas á exposição

da theoria. Encontram-se n'estas paginas a definição das forças de attricto e as suas leis e propriedades, o estudo da combinação, compatibilidade e superabundancia das ligações dos systemas, a enumeração das ligações simples entre solidos, etc.

As 54 restantes paginas do volume são consagradas ás applicações. N'ellas é considerado o movimento d'um ponto sobre uma curva em diversas circumstancias; o movimento dos systemas cujo centro de gravidade descreve uma curva dada; o movimento dos systemas que comprehendem uma curva movel sobre a qual escorrega um ponto do sistema; o movimento d'um ponto sobre uma superficie em diversas circumstancias; o movimento dos systemas cujo centro de gravidade descreve uma superficie; o movimento dos systemas que encerram uma superficie solida movel sobre a qual escorrega um ponto do sistema; o movimento dos systemas de solidos cujas reacções dependem das leis do attricto, etc. Exemplos muito bem escolhidos contribuem para esclarecer alguns dos assumptos considerados.

Ch. Méray : Leçons nouvelles sur l'Analyse infinitésimale et ses applications géométriques (Deuxième partie), Paris, G. Villars, 1895.

Deu-se em um dos numeros anteriores d'este jornal uma noticia a respeito do 1.^º volume d'esta obra importante. Como dissemos, n'elle occupa-se o auctor dos principios, methodos e theoremas geraes da theoria das funcções, deixando para o volume seguinte o estudo das funcções particulares. Hoje temos o prazer de annunciar que o volume consagrado a estas funcções particulares, complemento indispensavel do anterior, está já publicado, e que graças ao desenvolvimento e generalidade com que foram tratadas as doutrinas expostas no volume 1, se marcha rapidamente na leitura dos assumptos mais particulares expostos no presente volume.

Dividiu o sr. Méray o 2.^º tomo da sua obra em 13 capitulos, de cujo assumpto vamos dar uma noticia resumida.

O capitulo 1 é consagrado á theoria das funcções a que o auctor dá o nome de *olotropas* (*funcções holomorphas*), funcções cuja

theoria é a continuaçāo da theoria das funcções algebricas inteiras. Nota-se n'este capitulo uma demonstraçāo engenhosa do theorema fundamental da theoria das equações inteiras.

No capitulo ii occupa-se o auctor da theoria das funcções *meromorphas*, doutrina que é o seguimento natural da doutrina relativa ás fracções racionaes, que se estuda em Algebra.

No capitulo iii são estudadas as funcções definidas por um radical simples. Este estudo é feito sem a intervenção de considerações trigonometricas, que o auctor considera como estranhas á Analyse pura.

O capitulo iv é consagrado ao estudo das funcções implicitas definidas por uma equação unica. N'elle estende o auctor ás raizes das equações olotropas a theoria celebre de Puiseux relativa ás funcções algebricas.

No capitulo v são considerados o logarithmo e a exponencial.

O logarithmo é definido pela equação differencial $\frac{du}{dx} = \frac{1}{x}$ e pela condiçāo de ser $u = 0$ quando $x = 1$. A exponencial é definida como função inversa do logarithmo.

O estudo das funcções circulares é o objecto dos capitulos vi e vii. Este estudo é feito sem a intervenção de considerações geometricas, recorrendo o auctor para as definir á inversão dos integraes em que a differencial é composta racionalmente da variavel de integração e da raiz quadrada d'um trinomio do segundo grāo.

A theoria das funcções ellipticas é estudada nos capitulos viii a xii. O ponto de partida para introduzir estas funcções é a consideraçāo da equação differencial primitivamente empregada pelos geometras para este fim. Para preparar o leitor para este modo de exposição, tinha já o sr. Méray, nos capitulos anteriores, empregado, como vimos, para iniciar o estudo das funcções logarithmicas e circulares, a consideraçāo das equações diferenciaes a que ellas satisfazem.

O capitulo xiii, ultimo do livro, é consagrado á theoria das funcções eulerianas.

No modo de tratar os assumptos que são considerados ha, n'este volume da obra, uma grande originalidade, como a havia a n'hem, já o dissemos, no volume anterior.

E. Pascal: Teoria delle funzioni ellittiche, Hoepli, Milano, 1896.

Este volume faz parte da importante collecção de manuaes publicado pela casa Hoepli de Milão, a que por varias vezes nos temos referido n'este jornal. Contém elle uma exposição muito bem feita da theoria das funcções ellipticas, onde se acha o que ha de mais essencial n'esta importante doutrina.

O ponto de partida do auctor é a theoria das funcções θ de Jacobi, ás quaes liga depois as funcções p e σ de Weierstrass e as funcções $sn u$, $cn n$, $dn u$.

O livro está dividido em seis capitulos, onde são considerados os assumptos seguintes:

No capitulo i estuda o auctor as quatro funcões θ de Jacobi. Define-as por meio das series periodicas descobertas por este eminentgeometra, procura as relações entre elles, determina as equações differenciaes a que satisfazem, desenvolve-as em produtos infinitos, etc.

No capitulo ii estuda o sr. Pascal as funcões ellipticas $sn u$, $cn u$, $dn u$ e as relações d'estas funcões com as funcões θ .

O capitulo iii é consagrado ao estudo das funcões σ de Weierstrass, que são definidas pelas suas relações com as funcões θ .

No capitulo iv occupa-se o auctor da função $p(u)$ de Weierstrass, que é definida pela equação que a liga á função $\sigma(u)$.

O capitulo v é destinado ao estudo dos integraes ellipticos de 1.^a, 2.^a e 3.^a especie e ás suas relações com as funcões ellipticas. N'este capitulo, e depois no capitulo vi, encontram-se resultados do mais alto interesse a respeito d'un integral introduzido na theoria das funcões ellipticas por Klein.

Terminaremos dizendo que, pela clareza com que está escrito, pelo bom methodo de exposição e pelo ponto de vista moderno em que o auctor se collocou, é este excellente livro muito proprio para se estudar a parte essencial da theoria das funcões ellipticas.

E. Rouché et Ch. de Comberousse: Leçons de Géométrie. Première partie. Paris, G. Villars, 1896.

— *Solutions détaillées des exercices et problèmes énoncés dans les leçons de Géométrie. Première partie. Paris, G. Villars, 1896.*

Os programmas para o *ensino secundario moderno*, em França, sendo diferentes dos programmas para o *ensino secundario clasico*, os srs. Rouché e Comberousse vêm de publicar os dous volumes a que acima nos referimos, para servir de texto aos alumnos que seguem o primeiro d'estes ensinos. A estes volumes, que são destinados aos alumnos de 4.^a classe, seguir-se-hão outros destinados aos alumnos de 3.^a, 2.^a e 1.^a classe.

O primeiro dos volumes anunciados está dividido em trinta lições onde são considerados os assumptos seguintes: I Introduçao (primeiras noções). II Angulos. Angulos verticalmente opostos. III Rectas perpendiculares. Igualdade dos angulos rectos. IV Triangulos. V Egualdade dos triangulos. VI Outras propriedades dos triangulos. VII Perpendiculares e obliquas. VIII Egualdade dos triangulos rectangulos. IX Logares geometricos. X e XI Parallelas. XII Angulos cujos lados são respectivamente paralelos ou perpendiculares. XIII Somma dos angulos d'un triangulo, d'un polygono convexo. XIV Pontos de intersecção notaveis no triangulo. XV Propriedades dos parallelogrammos. XVI Figuras symetricas relativamente a uma recta ou a um ponto. XVI Uso da régua e do compasso. XVIII Circumferencia do círculo. Intersecção d'uma recta e d'uma circumferencia. XIX Propriedades dos arcos e das cordas. Diametros perpendiculares a uma corda. XX Tangente e normal á circumferencia. Parallelas no círculo. XXI Tres pontos não em linha recta determinam uma circumferencia. Posições relativas de duas circumferencias. XXII Recordações das noções de Arithmetica relativas á medida das grandezas. XXIII Medida dos angulos. XXIV Logar dos pontos d'onde se vê uma recta debaixo d'un angulo dado. Quadrilatero inscripitivel. XXV Uso da régua e do compasso. Construcção dos angulos. Divisão da circumferencia. XXVI, XXVII e XXVIII Problemas elementares. XXIX Círculos circumscriertos e inscriptos. XXX Tangentes communs a duas circumferencias.

No fim de cada lição vem uma collecção de exercícios correspondentes, dispostos segundo a ordem da sua dificuldade. No segundo dos livros anunciados vêm as soluções d'estes exercícios. Para obrigar os alumnos a um trabalho proprio e ao mesmo tempo auxiliar-o n'este trabalho, são apenas esboçadas as soluções dos exercícios simples e completamente indicadas as soluções dos exercícios mais dificeis.

A respeito das qualidades dos livros mencionados não é neces-

sario dizer cousa alguma. Os livros de Geometria publicados anteriormente pelos srs. Rouché e Comberousse são, com effeito, muito conhecidos e apreciados pelos professores e os actuaes em nada são inferiores áquelle.

E. Carvallo : Methode pratique pour la résolution numérique des équations algébriques ou transcendentales, Paris, Nony, 1896.

O fim d'este trabalho importante é completar o metodo inventado por Graff em 1839 e continuado por Encke em 1841, para resolver as equações numericas. Graff limitou-se a determinar as raizes reaes e os módulos das raizes imaginarias, quando estas raizes não têm módulos iguaes. Encke completou este metodo determinando as raizes imaginarias, mas o meio que para isso empregou, theoricamente exacto, não tem nada de pratico. Na sua Memoria o sr. Carvallo, estudando profundamente o metodo de Graff, mostra como elle pôde dar immediatamente e sem novos calculos tanto as raizes imaginarias, quer tenham quer não módulos iguaes, como as raizes reaes. Além d'isso estende este metodo ás equações transcendentais.

O auctor trata o assumpto com toda a clareza e rigor, de modo a concorrer para que este metodo notavel seja introduzido no ensino, e além d'isso insiste sobre as observações de caracter pratico proprias para simplificar a applicação do metodo. Para esclarecer as considerações que expõe e para mostrar quanto o metodo é pratico, são resolvidas no trabalho, a que nos estamos referindo, algumas equações.

E. Picard : Sur les groupes des transformations des équations différentielles linéaires (Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1894).

O auctor estende n'este trabalho importante a theoria de Galois, relativa ás equações algebricas, ás equações differenciaes lineares.

E. Carvallo : Principe d'Huygens dans les corps isotropes (Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1895).

Como as demonstrações conhecidas do principio de Huygens são baseadas em algumas hypotheses que o tornam inaplicável a algumas teorias d'Optica, o auctor dá uma nova demonstração d'este principio, em que se não recorre a estas hypotheses.

L. F. Marrecas Ferreira : Estudo sobre o planímetro de Amsler (Revista de obras publicas, t. xxv).

Neste artigo, muito útil e interessante, o auctor expõe de uma maneira clara, simples e completa a teoria do planímetro de Amsler, hoje muito empregado pelos engenheiros. Parte para isso do esboço d'essa teoria, apresentado por Resal no tomo III do seu importante *Traité de Mécanique générale*, que examina com atenção e que corrige em alguns pontos.

C. A. Laisant : Note relative aux asymptotes et aux cercles de courbure (Bulletin de la Société mathématique de France, t. xxIII).

O auctor demonstra que, se uma curva plana C tiver uma asymptota e transformarmos a figura por inversão relativamente a um ponto O do plano, a curva transforma-se n'outra curva C_1 , que passa pelo ponto O , e a transformada da asymptota é o círculo de curvatura da curva C_1 no ponto O . Esta proposição muito interessante estabelece uma ligação entre a teoria da curvatura e a teoria das asymptotas.

G. Lazzeri : Sulla teoria delle equivalenze geometriche (Periodico di Matematica, t. x).

O auctor expõe a theoria da equivalencia geometrica, para as tres classes de grandezas constituidas por polygonos planos, polygonos esphericos de uma mesma esphera e prismas, independentemente de qualquer postulado especial para esta theoria, da consideração de áreas negativas e de noções arithmeticas ou algebraicas, evitando assim postulados ou considerações estranhas ao assumpto, empregadas pelos auctores que se têm ocupado d'esta theoria.

M. d'Ocagne : Abaque en points isoplèthes de l'équation de Kepler
(Bulletiu de la Société mathématique de France, 1894).

O auctor applica á equaçao de Kepler

$$u - e \operatorname{sen} u = nt$$

as doutrinas expostas na obra importante intitulada *Nomographie*, da qual se deu noticia n'um dos volumes anteriores d'este jornal.

P. Mansion : Principes fondamentaux de la géométrie non euclidienne de Riemann, Paris, G. Villars, 1895.

A memoria que é o objecto principal d'este opusculo foi apresentada pelo auctor no Congresso scientifico internacional dos catholicos. Está escripta com muita simplicidade e clareza, e é por isso muito propria para o primeiro estudo da Geometria de Riemann. Contém ainda o opusculo quatro notas muito interessantes, a primeira relativa á historia da Geometria não euclideana, que n'elle é resumidamente exposta, a segunda ás indagações de Schering sobre a Metageometria, a terceira relativa ao alcance philosophico da Metageometria, o quarto relativo aos primeiros principios d'esta sciencia.

J. L. V. Jensen: Sur une expression simple du reste dans la formule d'interpolation de Newton (Bulletin de l'Académie des Sciences de Danemark, 1894).

Seja $F(x)$ uma função da variável real ou complexa x e $g(x)$ uma função inteira do grão n , que se torne igual a $F(x)$ quando x toma os valores x_1, x_2, \dots, x_n . A fórmula demonstrada pelo sr. Jensen é a seguinte :

$$\begin{aligned} F(x) = g(x) + \lambda \frac{(x-x_0)\dots(x-x_n)}{(n+1)!} F^{(n+1)}[\theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \dots \\ + \theta_n x_n + \theta_{n+1} x], \end{aligned}$$

onde λ representa uma quantidade cujo módulo é inferior à unidade e $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{n+1}$ são números positivos menores do que a unidade. O modo como a ella chega o ilustre geometra dinamarquez é muito simples.

E. Carvallo : Sur l'intégration d'une équation aux dérivées partielles de la Physique mathématique (Bulletin de la Société mathématique de France, 1894).

A equação estudada pelo auctor é a seguinte :

$$\frac{d^2U}{dt^2} - \frac{d^2U}{dx^2} - U = F(x, t),$$

anteriormente estudada pelo sr. Poincaré no caso particular de ser nullo o segundo membro.

J. M. Colaw : Alexandre Macfarlane (The american mathematical Monthly, 1895).

Biographia d'este illustre physico e mathematico, de cujos trabalhos temos dado noticia em diversos numeros d'este jornal.

Stouff: Sur les rapports entre la théorie des équations aux dérivées partielles du second ordre et la théorie des surfaces (Annales de l'École Normale supérieure de Paris, 1896).

O objecto d'esta interessante memoria é a applicação da formula de Taylor á solução do problema de Plateau generalisado para uma equação ás derivadas parciaes qualquer de segunda ordem. As indagações n'ella contidas têm relação com os trabalhos de Schwartz relativos ás superfícies minimas e com os trabalhos de Darboux relativos á theoria das características das equações ás derivadas parciaes de segunda ordem.

S. Pincherle: Sopra alcune equazioni simboliche (Memorie delle R. Accademia di Bologna, 1895).

O auctor chama operação funcional distribuitiva a operação que, sendo applicada a uma função analytică, dá outra função analytică e que é tal que sendo representada por A, gosa das propriedades

$$A(\varphi + \psi) = A(\varphi) + A(\psi), \quad A(a\varphi) = aA(\varphi),$$

a representando uma constante e φ e ψ duas funções analyticas; chama derivada funcional de A a operação A' determinada pela

equação

$$A'(\varphi) = A(t\varphi) - xA(\varphi),$$

t representando a variavel que figura em φ e ψ , e chama equação diferencial symbolica toda a equação em que entram estas operações e suas derivadas. O objecto da presente memoria é dar as propriedades e as soluções d'algumas d'estas equações diferenciaes symbolicas.

— *Della validità effettiva di alcuni sviluppi in serie di funzioni*
(Rend. della R. Accademia dei Lincei, 1896).

E. Pascal : *Sopra dne relazioni rimarchevoli fra i valori delle derivate delle funzioni θ ellittiche per argumento zero* (Annali di Matematica, 1895).

A. Botelho : *Estudo sobre os sistemas de forças girantes*, Lisboa, 1894.

O objecto d'este trabalho é o estudo da rotação das forças em volta dos seus pontos de applicação, ao qual o nosso eminentíssimo geometra, Daniel A. da Silva, consagrhou uma bella e importante Memoria, cheia de originalidade, que foi publicada nas collecções da Academia Real das Sciencias de Lisboa. No presente trabalho o sr. Botelho expõe com clareza a parte principal d'esta theoria importante, fundando-se principalmente nos trabalhos d'aquelle geometra. O livro está dividido em cinco capítulos, sendo os dous primeiros consagrados ás configurações planas, os tres seguintes ás configurações no espaço, e sendo em cada um d'estes casos considerados os sistemas em que ha resultante e os sistemas em que a não ha.

F. Gerbaldi : *Sulle serie di funzioni analitiche* (*Rivista di Matematica*, 1896).

— *Un teorema sulle singularità della jacobiana di quattro superficie algebriche* (*Rend. del Circolo Matematico di Palermo*, 1896).

Guldberg : *Sur l'intégration des équations différentielles ordinaires* (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, 1895).

— *Om differentialluguinger, derbesidder ferste fundamental-integraler*, *Christiania*, 1895.

E. Carvallo : *Absorption de la lumière par les cristaux* (*Annales de Ch. et de Physique*, 1896).

Bettazi : *Sulla catena di un ente in un gruppo* (*Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, 1896).

— *Gruppi finiti ed infiniti di enti* (*Item*).

— *Teoria dei limite. Parte VII del Formulario pubblicato dalla Rivista di Matematica*.

G. Veronese : *Intorno ad alcune osservazioni sui segmenti infiniti e infinitesimi attuali* (*Mathematische Annalen*, 47 Bande).

A. Bassi : *Sulle radice della derivata di una funzione olomorfa di genere qualunque* (*Rend. del R. Instituto lombardo*, 1895).

A. Bassi : *Sulle radici della derivata di una funzione olomorfa di genero zero ed uno (Item).*

Burali-Forti : *Sur quelques propriétés des ensembles d'ensembles et leurs applications à la limite d'une ensemble variable (Mathematische Annalen, 47 Bande).*

F. Klein : *Sulle spirito aritmetico nella Matematica (Rend. del Circolo matematico di Palermo, 1896).*


G. Cantor : *Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre (Mathematische Annalen, 46 Bande).*

G. T.

INDICE (*)

	Pag.
V 9 — A. José Teixeira: <i>Biographia do dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto</i>	2
O 4 d — Geminiano Pirondini: <i>Sur les surfaces réglées</i>	49
R. Guimaraes: <i>Congresso de Caen</i>	43
K 2 d, e — D. J. Duran Loriga: <i>Nota sobre el triangulo</i>	45
D 6 f — Davide Besso: <i>Di alcune formole relative alla funzione sferica P_n(a)</i>	65
D 4 ba — J. Bruno de Cabedo: <i>Sobre os coeeficientes da serie de Fourier</i>	81
K 2 d — D. J. Duran Loriga: <i>Sobre los circulos radicales</i>	97
K 4 — E. Lemoine: <i>Règle d'analogies dans le triangle ou transformation continue et transformation analytique correspondante</i>	105
C 4 a — J. Arez: <i>Sobre uma formula de Analyse</i>	110
K 21 aδ — E. Lemoine: <i>Note sur la Géométragraphie ou art des constructions géométriques</i>	114
I 44 a — M. Lerch: <i>Sur diverses formules d'Arithmétique</i>	129
L ¹ 47a — J. Frederico d'Avillez: — <i>Sobre um theorema de Geometria superior</i>	137
S 2 e a — R. Marcolongo: <i>Sur uu cas particulier du mouvement d'un corps solide dans un liquide</i>	161
Bibliographia	41, 51, 85, 118, 144, 175

(*) Os signaes que precedem cada artigo indicam a sua classificação segundo o methodo adoptado no Congresso internacional de bibliographia das Sciencias mathematicas que teve logar em Paris em 1889.



CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Publica-se o *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* em fasciculos de 32 paginas. Cada 6 fasciculos formarão um volume de 192 paginas.

Preço de cada volume — 2\$400 réis.

A correspondencia relativa ao *Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas* deve ser dirigida para o Porto, rua de Costa-Cabral.

F. GOMES TEIXEIRA

Curso de Analyse infinitesimal

Tomo I (Calculo diferencial);

Tomo II (Primeira parte do Calculo integral);

Tomo III (Segunda parte do Calculo integral).

Preço de cada volume — 2\$500 réis.
