

Plante à peine glanduleuse *pumilum* .; p. 27-28 : « Plante semi-abortive ; moins de 10 filets anthéritères, anthères peu remplies, souvent les filets steriles disparaissent complètement ; pedoncules fructifères quelquefois réfléchis souvent dressés ; pétales plus courts, aussi longs ou plus longs que les sépales, mais jamais aussi grands que dans la forme précédente. Cette forme est très-commune dans les terrains sablonneux. LINNE cite pour son *C. semidecandrum* la figure 2. Tab. 30 du Botanicon parisiense (VAILLANT), qui représente la modif. *pellucidum* ; nous ne pensons » — 27/28 — « pas cependant qu'il limite son espèce à la forme *pellucidum*, mais qu'il y fait rentrer la forme *obscurum*. » — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* e descr.) — BONNIER (1912: 62); CLAVAUD (1881: 394); COSSON, G. et W. (1842: 37-38). — 12

- 236 — *C. varians* var. γ . *tetrandrum* mod. *pellucidum* COSSON et GERMAIN (1840: 25, 29), p. 25 : « 1* Plante abortive. moins de 5 anthères, sépales et pétales souvent au nombre de 4, capsules avortées, pédoncules dressés, avortement d'une branche de chaque dichotomie *tetrandrum* 2* » « 2* Toutes les bractées largement scarieuses dans leur moitié supérieure *pellucidum* 3* » « 3* Plantes glanduleuse visqueuse *viscosum* » et « 3* Plante à peine glanduleuse *pumilum*. » — Typus: non vidi. — (? = *C. semid.* st. morb. *hybridum*) — COSSON, G. et W. (1842: 38). — 12, 43, 44.
- 237 — « *C. viscidum* » auctorum sequentium = *C. semid.* : « EICHW. Skizze. p. 174 » sec. FENZL (1842: 406, sub *C. semid.* α . *scarioso-bracteatum*); « Grke. p. 74 » sec. PACHER (1887: 188); « WIMMER et GRAB. p. 430 » sec. MERTENS u. KOCH (1831: 341). — 000.
- 238 — *C. viscidum* BLUFF et FINGERHUTH (1825: 580) : « *C. viscidum*: viscoso-pubescent, caule ramoso diffuso, foliis interioribus ovalibus superioribus ovatis acutiusculis, floribus paniculatis, pedunculis calyce longioribus, petalis bifidis calyce brevioribus vel eum subaequantibus. LINK. enum. I. p. 431. (?) *C. viscosum*, PERS. I. p. 521. (?) In agris, arenosis. ☺. April.-Jun. (Planta tota viscosa et sequentem) (= *C. semid.*) « ita accedit, ut vix distinguas. »; *C. semid.* bene descriptum est! — Typus: non vidi. — (= nomen dubium; ex syn. partim *C. glutinosum* FR., partim *C. semid.* esse potest; cf. syn.!). — 000.
- 239 — *C. viscidum* LINK (1821: 433) : « *C. viscidum*. *C. viscosum* PERS. syn. 1. 521. Hab. in Europa frequ. 2f. D. Decumbens viscidum; folia sub lanceolata. Intermedium inter pr. et seq. » (= *C. triviale* = *C. viscosum* L. et *C. barbulatum* WAHLENBERG) — « Nomina

- erant mutanda ab confusionem evitandam.» — Typus: non vidi. — (= nomen dubium; = *C. semid.* sec. Ind. Kew., 1893: 486, et sec. GRAEBNER, 1918: 653; sed ex signo alato pl. per. esse non potest; cf. syn.!) — 11.
- 240 — *C. viscidum* SCHUR (1866: 118-119): «*C. viscidum* LINK. En. 1, 433. (*C. semidecandrum* L. BMG. 875. RCHB. icon. f. 4968. *C. pentandrum* M. BIEB. *C. viscosum*) — 118/119 — «RCHB. pl. crit. f. 316-317. PERS. l. c. *C. semidecandrum* a scarioso-bracteatum LEDEB. Fl. Ross. 1, 405. *C. pellucidum* CHAUB.) — auf sonnigen Aeckern, Triften, Wiesen. März. Mai.» — Typus: non vidi. — (= nomen dubium; = *C. semid.* pro pte. e syn. «*C. semidecandrum* a scarioso-bracteatum» et «*C. pellucidum*» l. c.). — 12.
- 241 — *C. viscidum* TENORE (1830: 230-231): «*Cerastium viscidum* Lat. ... Omnino glanduloso-viscosum; caule caespitoso, foliis ovatis, floribus» — 230/231 — «laxe dichotomis, pedunculis calycibus duplo longioribus, petalis bifidis calycem semiscarioso-serrulatum subaequantibus, staminibus decem fertilibus omnibus. LINK. Enum. et TEN. syll. loc. cit. cum synonymis et loc. natalibus.» — TENORE (1831: 599 = TEN. Syll.): «*C. viscidum* LINK Enum. I. pag. 438. *C. glutinosum* FRIES novit. p. 21. (non KUNTH nec NUTTAL). *C. viscosum* Fl. Dan. ic. 1211. PERS. syn. l. pag. 521. *C. viscosum* REICH. Icon. bot. tom. 3. pag. 42. tab. 249. fig. 399, 400 et 401. HOOKER Flor. Londin. new edit. tom. I. fasc. 23. TEN. Syll. loc. cit. *C. viscosum* B. LIN. *C. vulgatum* CURTIS Flora Lond. I. edit. ex HOOK. loco citato. In pascuis montosis: Monte Faito di Castellammare, Monte della Stella, Potenza, Velino. Bienne.» — Typus: non vidi. — (= nomen dubium; = *C. semid.* e descr. + *C. glutinosum* Fr. e syn. + *C. holosteoides* Fr., ampl. HYL. e syn. + *C. glomeratum* THUILL.) — 000.
- 242 — «*C. visiosum*» LEJEUNE et COURTOIS apud DURAND (1899: 233, sub *C. semid.*): errore pro «*C. viscosum*». — 13.
- 243 — *C. viscosioides* CANDARGY (1897: 156): «*Cerastium viscosioides*. Differt ab affini *C. viscosa* petalorum unguibus et filamentis imberbiis, petalis calyce brevioribus, capsula calyce sesquiplio longiore. Littus Jerae et Keramnia.» — Typus: non vidi. — (= spec. ann. sec. Ind. Kew., 1904: 38; ? = *C. glomeratum* THUILL., forma cum petalis et filamentis glabris esse potest sec. descr. in LONSING, 1939: 163/495; ? = *C. balear.* e descr. et l. hab.) — GRAEBNER (1918: 689). — 46.

- ! 244 — *C. viscosissimum* SCHUR (1866: 123) = *C. alpinum* L., nr. 5, sec. GRAEBNER (1918: 618). — 000.
- 245 — «*C. viscosum*» auctoris sequentis = *C. semid.* : «K. b. p. 127» sec. SCHLECHTENDAL (1823: 254, sub *C. semid.*). — 000.
- ! 246 — *C. viscosum* DIETRICH (1824: 441) : textum et typum non vidi. — (= *C. semid.* sec. DIETRICH, 1841: 708) — 000, cf. *Addenda* ad p. 11.
- 247 — *C. viscosum* KITAIBEL ex KANITZ (1863: 518) : «*C. viscosum*. Sed folia superiora acutiuscula. Capsulae saepe calyce duplo longiores, subincurvae, ore 10-fido. Panicula dichotoma, multiflora, pedunculis post anthesin declinatis sub maturitate et anthesi erectis. In collibus et montibus aridis Budae in clivis arenosis Pesthini etc. SMITH in Flora brit. perennem ponit, etiam in descriptione, WILLDENOW annuam in Sp. Pl. et in En. pl. ber. Ergo ille distinctam spaciem sub hoc nomine descriptis, quae in nostram non cadit. Quod hic a Mauksch acceptum pro *C. viscoso* cum eodem cum indicavi, accuratius examinatum fuit *C. vulgatum*. A WILLDENOW acceptum specimen videtur distinctum esse : nam multo minus viscosum est, fere tantum pedunculis pilosoviscidis. β. foliis subrotundo-ovatis, minus viscidum. Petala bifida, calycem subaequantia. Stamina 10. Styli 5. Caules erecti.» — In hb. KITAIBELIANO in MBp sec. JAVORKA (1926: 558) : «*viscosum*. In clivis, collibus et montibus siccis Pesthini, Budae (No 361) [*semidecandrum* L.], — *viscosum* β. fol. subrotundis. In horto Orczyano Aprili (No 362) [*semidecandrum* L. + *pumilum* CURT.]»; reliqua exempla = *C. arvense* L. + *C. glomeratum* THUILL. + *C. glutinosum* FR. + *C. pumilum* CURT. — Typi: non vidi. — 000.
- ! 248 — *C. viscosum* LINNE (1753: 437) = *C. glomeratum* THUILL. sec. LONGING (1939: 163/495). — 52.
- ! 249 — *C. viscosum* MORICAUD (1820: 206, nr. 3) : «3. *Cerastium viscosum*. LINN. *C. floribus pentandris, foliis ovatis obtusis, corollis calyce minoribus*. LINN. sp. 627. WILD. sp. 2. p. 812. De C. fl. fr. 4398. PERS. syn. I. p. 521. *Cerastium vulgatum*. γ. Dict. Enc. I. p. 672. no. 3. Caules breves, nunc simplices, nunc caespitosi, erecti vel decumbentes, apice subviscosi; folia parva, ovata, sessilia, obtusa, pilis brevissimis villosa, superiora acutiuscula. Flores pedicellati, pedicelli subviscosi; calyx piloso-glutinosus, apice et margine membranaceus; petala emarginata calyce breviora; stamina 5. Capsula cylindrica subincurva, calyce duplo longior. Semina rufa, parva, sublaevia. Hab. in arenosis et



- aggeribus siccis, al Lido; arvis siccis citra Athesim et ad viarum margines magna quantitate (BOTTARI.). Fl. Aprili.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* sec. POLLINIUS, 1822: 81, et e syn. et e descr.; *C. viscosum* nr. 2 in MORICAUD, 1820: 205-206. — *C. holosteoides* FR., ampl. HYL.) — 000, cf. *Addenda* ad p. 11.
- 250 — *C. viscosum* PERSOON (1805: 521): «*viscosum*, hirsuto-viscosum, caule ramoso (divaricato), flor. paniculatis demum reflexis, petal, apice bifidis cal. subaequant. *C. viscosum* CURT. et plur. auctorum. Hab. in apricis, pratis. Arenulis aut terra ob viscositatem inquinatum. Cal. margine et bractea apice membranacea alba cincta.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* e descr. sine varietate *«Alsinoides»*; PERSOON praeterea *C. semid.*, sed non bene, describit!) — LEJEUNE et COURTOIS (1831: 102). — 11.
- 251 — *C. viscosum* SEBASTIANI et MAURI (1818: 157-158), p. 158: «Maioriora individua caule sub-simplici, foliis latiusculis spathulatis. panicula contracta, floribus paucioribus subtentandris, bracteis calicibusque apice scariosis, tota herba laetius virente admodum viscida, rem primo intuitu a specie diversam ostendunt, quae nihilominus huc reduci debere videtur.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* pro pte. e descr. macriorum individuorum). — 000.
- 252 — *C. viscosum* TAUBERT, in sched. exs. Iter Cyrenaicum 1887, auspice W. BARBEY; 102: «Tripoli»: MPa; vidi. — (= *C. balear.* e pl. visis). — 000.
- 253 — *C. viscosum* WAHLENBERG (1814: 138): «*Cerastium viscosum*: caulinibus prostratis pedunculisque glanduloso-pubescentibus, foliis subovalibus, calycibus apice diaphanis glabris petala aequantibus. *C. viscosum* LINN. spec. plant. ed. WILLD. 2. p. 812. suec. n. 414. Genera elench. scepus. n. 416. M. v. BIEBERST. caucas. n. 884. *C. vulgatum* SMITH, brit. 2. p. 497. *C. ovale* PERSOON. synops. I. p. 521. BESSER. galiz. n. 545. Hab. in campis calcatis praecipue planitierum ubique.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* sec. GAUDIN, 1828: 243 — sub *C. semid.*, et e descr. pro pte. esse potest). — 000.
- 254 — *C. viscosum* * *Alsinoides* LOISELEUR ex PERSOON (1805: 521) = *C. tetrandrum* CURT., nr. 228, sec. TOWNSEND (1877: 35); = *C. glutinosum* FR. sec. Ind. Kew. (1893: 483); = *C. pumilum* CURT. sec. GRAEBNER, 1918: 661). — Syn. v. nr. ind.: 8, 9, 114. — 000.
- 255 — *C. viscosum* β. *macrius* BERTOLONI (1839: 750, 751, 752), p. 750: «β. *macrius*, caule semipollicari-spithamali; foliis parvis, oblongis, ovalibusque; bracteis, calycibusque latius marginatis.»;

p. 751: « Varietatem β. habui ex Liguria occidia a BADAROO, ex arenosis ad Albain Pompeiam a BERTERO, ex viciniis della Venaria, ubi commune, a Prof. RE, Mediolano in muro oppidi, et Ticino a Pr. BALSAMO-CRIVELLO, et De NOTARIS, ex Tyroli meridionali praesertim prope Tridentinum, Bolzano, et Castel Pradaia a FACCHINIO, Bassano in marginibus agrorum, et in incultis a Angarano a Montino, ex Istria circa Dignano a TOMMASINIO, Venetiis a S. Nicolò di Lio a Prof. NACCARIO, ex propugnaculis Patavinis a FACCHINIO, Roma in muris ad vicum Ursi pileati a Prof. MAURIO, Neapoli a'Camaldoli, et in muris, ex ora Bajarum in monte Gauro, et ad Acherusiam ab Eq. Prof. TENORIO, ex montibus di Castellamare, ex Ariano, et Gargano in Apulia, Rhegio Julio in Calabria, ex Sicilia prope Panormum all'Arenella, in monte Pizzuta ad radices, qua respicit la Piana de'Greci, et Catana, ab Eq. GUSSONIO, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLO. Floret Aprili, Majo... Bracteae vel omnes, vel superiores margine albo-membranaceae» — Typi: non vidi. — (= *C. semid.* e descr. et l. hab., excl. syn. variis). — NOTARIS (1844: 74-75). — 12, 56.

- 256 — *C. viscosum* var. γ. *semidecandrum* VISIANI (1852: 183): « var. γ. *semidecandrum*: bracteis supra medium scariosis, petalis calyci subaequantibus. — Syn. *C. semidecandrum* L. sp. pl. ed. II. p. 627. HOST. fl. austr. I. p. 557. RCHB. fl. exc. p. 795 et icon. fl. germ. V. p. 37. cum varietatibus. *C. viscosum* RCHB. ic. bot. III. p. 42. *C. holosteoides* FRIES nov. fl. IV. p. 52. RCHB. ic. bot. II. p. 76. *C. varians* β. *pellucidum* COSS. et GERM. l. c. — Icon. RCHB. ic. fl. germ. V. f. 4968. cum var. COSS. et GERM. l. c. atl. V. f. 7-9. RCHB. icon. bot. II. f. 317. 318. et III. f. 379. 380. 399. 400. 401. SOW. engl. bot. t. 1630. VAILL. bot. paris. t. XXX. f. 2. » — Typus: non vidi. — (= *C. balear.* ex descr. et l. hab. + *C. semid.* e descr. et syn. + *holosteoides* FR., ampl. HYL. e syn. « *C. holosteoides* » + *C. glutinosum* FR. e « *C. viscosum* RCHB. ») — 12, 56.
- 257 — *C. vulcanicum* SCHLECHTENDAL (1838: 208) = spec. ann. («bracteis omnibus herbaceis»). — Syn. v. nr. ind.: 95. — 000.
- ! 258 — « *C. vulgare* γ LMK. » apud TCHIHATCHEFF (1866: 246, sub *C. semid.*) ex errore pro « *C. vulgatum* γ » LAMARCK, nr. 261. — 12.
- ! 259 — *C. vulgatum* LINNE (1762: 627) = *C. holosteoides* FR. ampl. HYLANDER (1945: 150-151). — 000.
- 260 — *C. vulgatum* LAPEYROUSE (1818: 63): « *Cerastium vulgatum* LIN. sp. 627. VAILL. t. 30. f. 3 C. hirsutum, viscidum, caespitosum; foliis ovatis; petalis calyce aequalibus; floribus pedunculo lon-

- gioribus. SMITH. Brit. WILLD. sp. 2. p. 811. ⊙ Fleurs blanches. Vulgaire sur les murs, les tertres le long des chemins dans les champs; sur les rochers des hautes montagnes. Mont-Louis sur les glacis, Coume d'Asparagon, Pic de Lhieris, Houle du Marboré.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* pro pte. sec. BUBANI, 1901: 24 — «LA PEYR. Herb.»; = *C. glomeratum* THUILL. e «VAILL. t. 30. f. 3» et e verbis deser. «floribus pedunculo longioribus»; LAPEYROUSE, 1818: 264, praeterea *C. semid.* bene describit!) — 000.
- 261 — *C. vulgatum* γ. LAMARCK (1783: 679): «γ. *Cerastium vulgatum* villoso-viscosum minus, floribus semi-decandris. *Myosotis hirsuta minor*. TOURNEF. 245. VAILL. paris. t. 30. f. 2. *Myosotis*. HALL. Helv. no. 894. *Cerastium semi-decandrum* L.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* pro pte. e syn.). — 11 (hic errore «1789»).
- 262 — *C. vulgatum* β. C. *Holosteoides* FRIES (1828: 126) = *C. holosteoides* FR. ampl. HYL., ssp. *glabrescens* (MEYER) MÖSCHL. — 000.
- 263 — *C. vulgatum* β. *Minus* SEBASTIANI et MAURI (1818: 157) = ? *C. holosteoides* FR., ampl. HYL.; = non *C. semid.* e verbis: «Macriora occurunt, individua staminibus aliquot (saepius 5, filamentis non exceptis) orbata, quae varietatem β constituunt, non confundendam cum *C. semidecandrum* L., cui monente SMITHIO folia infima glabrata.» — 000.
- 264 — *C. vulgatum* b. *semidecandrum* HEGETSCHWEILER (1825: 154): «b. *Semidecandrum*; minus, hirsuto-viscidum, pedunculis axillaribus flore sublongioribus, petalis calyce duplo brevioribus, stamin. 5. et cum rudimentis stamin. 1-2. *C. semidecandrum* L. et auctorum VAILL. bot. Par. tab. 32 fig. 2. (Icon haud laulanda.) In muris et arvis passim.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* e descr.) — RENDLE (1930: 74). — 11.
- ! 265 — *Graphidium Corrensi* LINDAU (1910: 748-749, fig. in p. 748) = spec. *Mycetium*. — 16, 17, 26, 31.
- ! 266 — *Macrospermum commune* RABENHORST (= spec. *Mycetium*) sec. LINDAU 1910: 227) in speciebus generis *Cerastium* indeterminatis inventum est. — 000.
- ! 267 — *Melampsorella caryophyllacearum* SCHROET. spec. *Mycetium*. — 16, 32.
- ! 268 — *Moenchia erecta* «GAERTN., MEY. u. SCHERBIUS Fl. Wetterau I. 229 (1799)» (sec. GRAEBNER, 1917: 566). — Syn. v. nr. ind.: 227, 273. — 000.
- 269 — *Myosotis semidecandra* MÖNCH (1794: 225): «*semidecandra*, staminibus quinque fertilibus, quinque sterilibus: caule erecto sim-

- plici, superne diviso : foliis connatis ovatis villosis : petalis calyce brevioribus. *Cerastium semidecandrum*. L. *Myosotis arvensis hirsuta minor* VAILLANT. Icon. Tab. 30. fig. 2. h. copiose vere in sylvis locis siccis tenui gramine vestitis. Am Lahnberg. Annua.» — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* e descr. et syn.) — 11.
- ! 270 — *Peronospora alsinearum* CASP.=spec. Mycetium. — 17.
- 271 — *Prevotia alsinoides* GANDOGER (1885: 75): « *Prevotia alsinoides* (PERS.) Hab. Europa merid.-occident. . . *P. arenaria* (TEN.: Neap.). » — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* pro pte ex syn. « *P. arenaria* »). — 13.
- 272 — *Prevotia pellucida* GANDOGER (1885: 81): « *Prevotia pellucida* (CHAUB.) Hab. Gall. etc. F. caulin. ovata-Paris (CHAUBARD in Reliq. Maill. Nr. 937) *P. pellucida* (CHAUB.!). ». — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* e syn.). — 13.
- 273 — *Prevotia semidecandra* GANDOGER (1885: 78-81): « *Prevotia semi-decandra* (L.). *P. breviflora* (GILIB.). *P. obtusifolia* (LAM. part.) Hab. Europa (excl. cret.) . . . *P. viscosa* (LINK: Europa), *P. macilenta* (ASPEGR.: Suecia), *P. holosteiformis* (SCHUR: Transs.), *P. fallax* (GUSS.: Sicil.) et *P. tenuis* (VIV.: Corsica). » — Typi: non vidi. — (= *C. semid.* e syn. + *C. macil.* e syn. + *C. pentandrum* L. e « *P. fallax* » + *Moenchia erecta* e « *P. tenuis* »). — 13.
- ! 274 — *Puccinia arenariae* (SCHUM.)=spec. Mycetium. — 17.
- ! 275 — *Quercus robur* L. — 36, 62.
- 276 — *Stellaria semidecandra* LINK (1795: 62)=nomen nudum = *C. semid.* sec. GRAEBNER (1918: 653). — Typus: non vidi. — 11.
- 277 — *Stellaria semidecandrum* GRAY (1821: 659): « *Stellaria semidecandrum*. Halften-stamened chickweed. Stems tufted, hairy, viscid above; leaves upright, ovate, oblong; flowers conglomerated, 5-stamened; petals notched, shorter than the calyx; capsules cylindrical. *Myosotis* q. *Cerastium hirsutum minus, parvo flore* DILLENII, DILLEN in RAII Syn. 348, 2. *Cerastium semidecandrum*, LIN. S. P. 627. Sandy places and walls; annual; March and April. » — Typus: non vidi. — (= *C. semid.* e syn.) — JESSEN (1879: 289-290), pro pte. — 11.
- ! 278 — *Triticum* (spec. non nominato est)=« *Weizen* ». — 36.
- ! 279 — *Ustilago Duriaeana* (= *Durieuana*) TUL.=spec. Mycetium. — 17, 28, 31.

INDEX ANIMALIUM TRACTATORUM.

- 1 — *Cecidomyidae* (spec. ignota). — 16, 32.
- 2 — *Gallmücke* (? = *Cecidomyidae*, nr. 1). — 16, 32.
- 3 — *Psylla Cerastii* (sine auctore sec. PEYRITSCH, 1881: 16-21) = *Trioza cerastii*, nr. 4. — 000.
- 4 — *Trioza Cerastii* H. Lw. sec. ROSS u. HEDICKE (1927: 120). — 17, 28, 31.

INDEX LIBRORUM TRACTATORUM.

Nisi textum citatum ipse exscripti, bibliotheca indicatur,
quae textum exscriptum mihi misit.

ALBO

- 1919 La vita delle piante vasc. nelle Sicilia Mer.-Orient.. II. (Ragusa).
 ALEXEENKO (= ALEXBENKO, per errorem in p. 49),
 1907 (Titulus cyrillicus) Trav. du Mus. Bot. de l'Acad. Imp. des Sci. de St. - Peters-
 bourg, III.

ALMQUIST

- 1929 Upplands Vegetation och Flora. — Acta Phytogeographica Suecica, I (Uppsala).

ANDERSSON

- 1944 *Senecio integrifolius*. — Bot. Not. (Lund).

ANDERSSON och WALDHEIM

- 1946 *Tortella inclinata* som komp. i skansk sandstäppveget. — Bot. Not. (Lund).

ANDREE

- 1921 Handatlas, 7. Aufl. (Bielefeld und Leipzig).

ARCANGELI

- 1882 Comp. della Fl. Italiana. (Roma e Firenze).

ASCHERSON und GRAEBNER

- 1898-99 Fl. des Nordostdeutschen Flachl. (Berlin).

ASPEGREN

- 1823 Försök till en Blekingsk Fl. (Carlskrona).

BABINGTON

- 1838 Mag. of Zool. and Botany, II. — Bibl.: Royal Botanic Gardens, Kew, Britannia.

BARTLING

- 1832 Plantae Ecklonianae. Alsineae. — Linnaea, VII (Berlin).

BATTANDIER

- 1888-90 = BATTANDIER in BATTANDIER et TRABUT, 1888-90: Fl. de l'Algérie. (Paris).

BECK

- 1890 = BECK v. MANNAGETTA: Fl. von Niederösterreich, I, (Wien).

- 1906 Fl. Bosne, Hercegovine i novopazarskog sandzaka II (3.) dio. — Glas. zem. muz. Bosni i Herc. XI/2. Glas. XVIII (Sarajevo).

BEHRENS

- 1878 *Cerastium tetrandrum* CURT. nebst Bem. über die mikropet. Cer... — Flora, N. R. XXXVI (G. R. LXI. — Regensburg).

BERTOLONI

- 1839 Fl. Italica, IV. (Bononiae).

BESSER

- 1809 Prim. Fl. Galiciae Austriacae utr., I. (Viennae).

BEURLEN

1939 Erd- und Lebensgeschichte. (Leipzig).

BEYER

1891 Beitr. zur Fl. der Thäler Grisanche und Rhêmes in den Grajischen Alpen. — Progr. des Andreas-Real-Gymn. zu Berlin.

BIEBERSTEIN

1808 = Marschall a BIEBERSTEIN: Fl. Taurico-Caucasica, I. (Charkoniae).

1819 Fl. Taurico-Caucasica, III (Suppl.). (Charkoniae).

BLACK

1924 Fl. of South Australia, II. (Adelaide).

BLUFF et FINGERHUTH

1825 Comp. Fl. Germanicae, I. (Norimbergae).

BLYTT-DAHL

1906 Haandb. i Norges Fl. (Kristiania).

BOISSIER

1867 Fl. Orientalis, I. (Basileae).

BONNET et BARATTE

1896 Cat. raisonné des pl. vasc. de la Tunisie. (Paris).

BONNIER

1912 Fl. compl. ill. en couleurs de France Suisse et Belg., II. (Neuchatel-Paris - Bruxelles). — «1912» sec. Ind. Lond. (1930: 138, sub *C. semid.*).

BONNIER et LAYENS

1926 Fl. compl. port. de la France et de la Suisse. Nouv. éd. (Paris).

BORBAS

1900 A Balaton Tavának és Partmellékének (= A Balaton Fl., II). (Budapest).

BORY

1932 = CHAUBARD (1832).

BOULOUMOY

1930 Fl. du Liban et de la Syrie. (Paris).

BRAUN-BLANQUET und MOOR

1938 Verband des *Bromion erecti*. Prodr. der Pflanzengesellschaften. Fasz. 5.

BRIQUET

1910 Prodr. de la Fl. Corse, I. (Genève & Bale).

BRITTON and BROWN

1897 An Ill. Fl. of the Northern United States, Canada and the British possessions, II. (New York).

1936 editio secunda op. cit. 1897, II. (New York).

BUBANI

1901 Fl. Pyrenaea, III. (Mediolani) — Opus posthumum editum curante O. PENZIG.

BUCHENAU

1875 Weitere Beitr. zur Fl. der Ostfriesischen Inseln. — Abh. des naturw. Ver. zu Bremen, IV/3.

BUSCHMANN

1938 Über einige ausdauernde *Cerastium*-A. aus der Verw. des *C. tomentosum* L. — FEDDE, Repert. spec. nov. XLIII. (Berlin — Dahlem).

BUTCHER-STRUDWICK

1930 Further ill. of British pl. (Drawing by Strudwick!). (Ashford).

CADEVALL amb SALLENT

1915 Fl. de Catalunya, I. (Barcelona).

CANDARGY

1897 Fl. de l'île de Lesbos. — Bull. de la Soc. Bot. de France, XLIV (Paris).

CELAKOVSKY

1875 Prodr. der Fl. von Böhmen, III. (Prag).

1881 Prodr. der Fl. von Böhmen, IV (Nachtrag). (Prag).

CESATI, PASSERINI e GIBELLI

1884 Comp. della Fl. Italiana (Milano).

CHAMISSO et SCHLECHTENDAL

1830 = SCHLECHTENDAL et CHAMISSO, 1830.

CHAUBARD

1821 = CHAUBARD in SAINT AMANS, 1821: Fl. Agenaise. (Agen).

1832 Fl. du Péloponnèse = CHAUBARD in BORY (1832): Expéd. sci. de Moree. (Paris).

CHAUBARD in BORY

1832 Expéd. sci. de Moree. (Paris). — ! « Tome III, 2. partie: Botanique » sec. PRITZEL (1872 : 36, nr. 1026)!

1838 Nouv. Fl. du Péloponnèse et des Cyclades. (Paris et Strasbourg). — 2. ed. ad « CHAUBARD in BORY (1832) » [cf. PRITZEL (1872 : 36, nr. 1027)].

CHEVALIER

1827 Fl. Générale des environs de Paris, II/2. (Paris).

CLAVAUD

1881 Fl. de la Gironde. — Act. de la Soc. Linn. de Bordeaux, 4. ser., V.

CORRENS

1907 = CORRENS in DÖRFLER, 1907: Herb. norm., Schedae ad Cent. XLVIII. (Vindobonae).

COSSON et GERMAIN

1840 Obs. sur quelques pl. crit. des env. de Paris. (Paris) (¹).

1845a Atlas de la Fl. des env. de Paris. (I. ed.) (Paris) (¹).

1845b Fl. descriptive et analytique des env. de Paris. (I. ed.; id est textus ad « 1845a »). (Paris) (¹).

1845c Syn. anal. de la Fl. des env. de Paris. (Paris) (¹).

1861 Fl. des env. de Paris (= 2. ed. ad « 1845b »; id est textus ad « 1882 »). (Paris) (¹).

1882 Atlas de la Fl. des env. de Paris; 2. ed. (id est iconographia ad « 1861 »). (Paris) (¹).

COSSON et GERMAIN et WEDDEL

1842 Introduction à une Fl. anal. et descriptive des env. de Paris. (Paris) (¹).

CURTIS

1777 Fl. Londinensis, I. (London). — « 1777 » sec. PRITZEL (1872: 74); « CURT. Fl. Lond. Fasc. VI. t. 30 (1795-96) » sec. GRAEBNER (1918: 658, sub *C. pumilum*; 667, sub *C. tetrandrum*); « I, fasc. II... 1777 » (*C. semid.*) et « II, fasc. VI... 1798 » (*C. pumilum* et *C. tetrandrum*) sec. Ind. Lond. (1930: 137, 138).

1798 Fl. Londinensis, II. — Cf. CURTIS (1777).

DAVIES

1813 Welsh Botany. (London). — Bibl.: Royal Botanic Gardens, Kew, Britannia.

(¹) Textus e « COSSON et G. (1845 a, b, c et 1861 et 1882) » et e « COSSON et G. et W. (1842) » exscripti et transmissi sunt a bibliotheca Musei « Paris ».

DE CANDOLLE

1824 = SERINGE in DE CANDOLLE (1824).

DEGEN

1937 Fl. Velebitica, II. (Budapest).

DESMOULINS

1846 Suppl. I ad Catal. rais. des pl. . . . départ. de la Dordogne. (Bordeaux).

DIETRICH

1824 Flora der Gegend um Berlin oder..., I. Teil. Phanerogamen (Berlin). — (Sec. PRITZEL, 1772: 83).

1841 Fl. Marchica. (Berlin) — « Wien, Naturh. Museum ».

DÖLL

1862 Fl. des Grossherz. Baden, III. (Carlsruhe).

DRUCE

1920 = DRUCE in MOSS, 1920: Cambridge British Flora, III. (Cambridge).

1927 The fl. of Oxfordshire, 2. ed. (« Oxford » sec. JUST, Bot. Jber. LVIII (1930), 1938: 174, nr. 1259; « London » sec. Biological Abstracts, II, 1928: 1239).

1932 Fl. com. Britannicae. (Arbroath).

DUBY

1828 Aug. Pyrami DE CANDOLLE Botanicon Gallicum ... ed. 2, I. (Paris).

DUFOUR

1920 Coup d'oeil topogr. sur la ville de Xativa et sur Moxente... Ann. gen. des sci. phys. (Bruxelles), VII.

DUFTSCHMIED

1885 Die Fl. von Oberösterreich, IV. (Linz).

DURAND

1899 = DURAND in WILDEMAN et DURAND, 1899: Prodr. de la Fl. Belge, III. (Bruxelles).

ECKLON & ZEYHER

1834 Enumeratio plantarum Africæ australis extratropicae quae collectae, determinatae et expositae a Chr. Fr. ECKLON & C. ZEYHER (Hamburgi).

EKLUND

1946 Neue Gesichtspunkte auf die Verbreitung und Einwanderung einiger Pflanzenarten SW — Finnlands. — Mem. Soc. pro Fauna et Fl. Fennica, XXIII, 1946-1947 (Helsingforsiae).

FEDTSCHENKO et FLEROW

1910 Fl. des europ. Russland (St. Petersburg) (Russisch; sec. JUST, 1915: 1234-1235).

FENZL

1842 = FENZL in LEDEBOUR, 1842: Fl. Rossica, I. (Stuttgartiae).

FIEK

1881 (Unter Mitwirkung von UECHTRITZ): Fl. von Schlesien. (Breslau).

FIORI

1896-98 = FIORI in FIORI e PAOLETTI, 1896-98: Fl. anal. d'Italia, I. (Padova).

1907 = FIORI in FIORI e PAOLETTI, 1907: Fl. anal. d'Italia, IV (Appendice). (Padova).

1921 Iconogr. Fl. Italicae, 2. ed. (Sancasciano val di Pesa).

1923 Nuova Fl. anal. d'Italia, I. (Firenze).

FIRBAS

1939 Vegetationsentwicklung und Klimawandel in der mitteleuropäischen Spät- und Nacheiszeit. — Die Naturwissenschaften, XXVII/6, 7. (Berlin).

FOCKE

- 1873 Beitr. zur Kenntnis der Fl. der Ostfriesischen Inseln. — Abh. des naturw. Ver. zu Bremen, III.

FONT QUER

- 1949 Sur quelques Cerastium de l'Espagne et du Maroc. — Travaux Botaniques (Alger) (= Mem. hors-série de la Soc. d'Hist. nat. de l'Afrique du Nord, II).

FORMÁNEK

- 1900 6. Beitr. zur Fl. von Mazedonien. Verh. des naturf. Ver. zv Brünn, XXXVIII.

FOURNIER

- 1928 Fl. compl. de la Plaine Française. (Paris).

FRIES

- 1817 Nov. Fl. Suecicae, IV. (Lundae).

- 1817-18 Fl. Hallandica, I. (Lundae).

- 1823 Nov. Fl. Suecicae, VI. (Lundae).

- 1828 Nov. Fl. Suecicae, 2. ed. (Londini Gothorum).

FRITSCH

- 1934 11. Beitr. zur Fl. von Steiermark. — Mitt. des Naturw. Ver. für Steiermark, LXX. (Graz).

GANDOGER

- 1885 Fl. Europae, IV. (Parisiis Neoboraci, Mediolani, Berolini).

GÄRCKE

- 1878 Fl. von Deutschland, 13. Aufl. (Berlin).

GARTNER

- 1930 Zur syst. Anordnung einiger A. der G. *Cerastium* L. — FEDDE, Repert. spec. nov. r. veg., Beih. CXIII. (Dahlem bei Berlin).

GAUDIN

- 1828 Fl. Helvetica, III. (Turici).

GEIGER

- 1942 Das Klima der bodennahen Luftsicht. — Die Wissenschaft, LXXVIII. (Braunschweig).

GILIBERT

- 1781 Verum enim recte « 1782 » : Flora inchoata, seu Enumeratio plantarum quas in Grodnam collegit et determinavit Joannes, Emmanuel GILIBERT... Collectio quinta, Vilnae 1782. — (Collectiones I-III = Grodnae 1781, IV-V = Vilnae 1782). — Textum exscriptum ab originali, quod exstat in « Universitas Jagellonia Cracoviensis » mihi a Prof. Dr. F. WIDDER, Inst. f. syst. Bot. d. Univ. Graz, datum est.

- 1792 Exerc. Phytologica, I. (Lugduni Gallorum). — Bibl.: Univ. de Genève.

GORTANI

- 1905 Fl. Friulana, I. (Udine).

GRAEBNER in ASCHERSON und GRAEBNER, Syn. der mitteleurop. Fl.; V/1. (Leipzig):

- 1916 91. Lief. = p. 465-544.

- 1917 93. Lief. = p. 545-624.

- 1918 94-95. Lief. = p. 625-784.

- 1919 96-97. Lief. = p. 785-948 (sec. GRAEBNER, 1919: II, ante p. 865).

GRAY

- 1821 A natural arrang. of British pl., II. (London).

GRECESCU

- 1898 Conspl. Fl. Romanei. (Bucaresti).

GRENIER

- 1839 Fragm. d'une Monogr. des Cerastium. (Besançon).
 1841 Monogr. de Cerastio. (Vesontione).
 1865 Fl. de la Chaine Jurassique. — Mem. de la Soc. d'emul. du Doubs. 3. sér. II/1.
 (Besançon).

GRENIER et GODRON

- 1848 Fl. de France, I (Paris. Londres. Besançon).

GRIESELICH

- 1836 Versuch einer Statistik der Fl. Badens, des Elsasses, Rheinbayerns und des Ct. Schaffhausens. — Kleine Bot. Schriften I. (Carlsruhe).

GRISEBACH

- 1841 Reise durch Rumelien und nach Brussa im J. 1839, II. (Göttingen).

GUADAGNO

- 1926 La veget. della penisola Sorrentino. — Bull. dell. Orto Bot., VIII (Napoli).
 1931 Fl. di Capri. — Arch. Bot., VII. (Forli).

GÜRKE

- 1899 = GÜRKE in RICHTER-GÜRKE, 1899: Pl. Europeae, II/2. (Leipzig).

GUSSONE

- 1832 Suppl. ad Fl. Siculae prodr., I. (Neapoli).
 1842 Fl. Siculae Syn., I. (Neapoli).

HALÁCSY

- 1892 Beiträge zur Fl. der Balkanh. IX. — Öst. Bot. Z. XLII. (Wien).
 1901 Consp. Fl. Graecæ, I. (Lipsiae).

HARTMAN

- 1866 Svensk och Norsk Exc.-Fl., 4. Uppl. (Stockholm).

HAUSMANN

- 1851 Fl. von Tirol, I. (Innsbruck).

HAYEK

- 1908 Fl. v. Steiermark, I. (Berlin).
 1918 Beitr. zur Kenntnis der Fl. de salban.-montenegr. Grenzgeb. — Kais. Akad. der Wiss. in Wien, math.-naturw. Kl. Denkschr. XCIV.
 1924 Prodr. Fl. Peninsulae Balcanicae, I. — FEDDE, Repert. spec. nov. r. veget. Beih. XXX. (Berlin-Dahlem).

HEGETSCHWEILER

- 1825 Reisen in den Gebirgsstock zw. Glarus u. Graubünden in den J. 1819, 1820 u. 1822. (Zürich).

HEGI

- 1911 Ill. Fl. von Mitteleuropa, III. (Wien).

HERMANN

- 1912 Fl. von Deutschland u. Fennoskandinavien sowie von Island Spitzbergen. (Leipzig).
 1913 Ein bot. Ausflug nach Majorka. — Verh. des Bot. Ver. der Prov. Brandenburg (Berlin-Dahlem-Steglitz), LIV.
 1938 Einiges über Cerastium. — Hercynia, I/2 (Halle/Saale. Berlin).

HERZOG

- 1909: Über die Vegetationsverhältnisse Sardiniens. — Bot. Jb. (ENGLER) XLII. (Leipzig).

HEUKELS

- 1909 De Fl. van Nederland, II. (Leiden-Groningen).

HOLMBOE

1914 Stud. on the veget. of Cyprus. — Bergens Mus. Skr. N. R. I/2. (Bergen).
HOOKER

1884 The stud. Fl. of the British Islands, 3. ed. (London).
HORNEMAN

1813 Hort. r. bot. hafn. I. (Hauniae).
HULTÉN

1946 Epistula: Stockholm, 5. XI. 1946 (cum tabula geographica C. semid. in Scandinavia).

HYLANDER

1945 Nomenkl. u. syst. Studien über nord. Gefäßpfl. Uppsala Univ. Arsskr., I/7.
IND. KEW.

Index Kewensis an enumeration of the Genera and spec. of flowering plants
... compiled . under the direction of Joseph D. HOOKER by DAYDON JACKSON,
(Oxford);

1893 Pars I,

1893-1938 Pars I-II et Suppl. I-IX.

1904 Suppl. II,

1908 Suppl. III,

1926 Suppl. VI.

IND. LOND.

1930 =Index Londinensis to illustrations of flowering plants ... O. STAPF, II. (Oxford).
IRMSCHER

1923 Pflanzenverbreitung und Entwicklung der Kontinente.—Mitt. aus dem Inst. für
allg. Bot. in Hamburg, V.

JAVORKA

1926 Herb. KITAIBEL. — Ana. hist.-nat. Mus. Nation. Hungarici (Budapest), XXIV.
JAVORKA és CSAPODY

1930 Iconogr. Fl. Hungaricae, V. (Budapest).

JESSEN

1879 Deutsche Excursions-Fl. (Hannover).

1924 Oversigt over Karplanternes Udbred. i Danmark.—Bot. T. (København), XXXIX.
JUST

1886 Bot. Jber., XI/2 (1883). (Berlin).

1915 Bot. Jber., XXXVIII/2 (1910). (Leipzig).

KANITZ

1863 P. KITAIBELII addit. ad Fl. Hungaricam. — Linnea, XXXII. (Halle).

KITTEL

1853 Taschenbuch der Fl. Deutschlands, II; 3. Aufl. (Nürnberg).

KLEBAHN

1913 Kryptogamenflora der Mark Brandenburg und angrenzender Gebiete, V a,
Pilze III (herausgegeben v. d. Bot. Ver. der Prov. Brandenburg), p. 540-542
(Leipzig).

1914 l. c. p. 821-825. (Leipzig).

KNAPP

1872 Die bisher bek. Pfl. Galiciens u. der. Bukowina. (Wien).

1944 Über steppen-artige Trockenrasen im Marchfeld und am Neusiedlersee. (Halle
a. d. Saale).

KOCH

- 1835 Syn. Fl. Germanicae et Helvetiae, I. (Francofurti ad Moenum).
 1837-38 Syn. der Deutschen u. Schweizer Fl. (Frankfurt am Main).
 1843-45 Syn. Fl. Germanicae et Helvetiae, 2. ed. (Francofurti ad Moenum).

KÖPPEN

- 1931 Grundriss der Klimakunde (= 2. Aufl. von «Climate der Erde»). (Berlin und Leipzig).

KÖPPEN und WEGENER

- 1924 Die Klimate der geologischen Vorzeit. (Berlin).

KRAUSE

- 1890 =KRAUSE in PRAHL, 1890: Krit. Fl. der Prov. Schleswig-Holstein, ... II/2. (Kiel)
 1901 =KRAUSE in STURM, Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur, 2 Aufl., V. Schriften des deutschen Lehrervereins, VII (Stuttgart). — «Botanische Staatssammlung, München-Nymphenburg».

KROCKER

- 1790 Fl. Silesiaca, II/1. (Vratislaviae).

LAGERBERG

- 1937 Vilda Växter i Norden, I. (Stockholm).

LAMARCK

- 1778 Fl. Françoise, III. (Paris).
 1783 Encyclopédie méth. Bot., I. (Paris).
 1789 Diction. Encyclopédique de Bot., I. (Paris).

LAMARCK et DE CANDOLLE

- 1805 Fl. Française, 3. éd., IV/2. (Paris).

LANGE

- 1866 Pugillus pl. impr. hisp., quas in it. 1851-52 legit, IV.—Vidensk. Meddel. fra den naturh. For. i Kjöbenhavn for Aaret 1865.
 1880 Conspl. Fl. Groenlandicae. — Medd. om Grönland, III. (Kjöbenhavn).
 1886-88 Haandb. i den Danske Fl., 4. Ausg. (Kjöbenhavn).

LAPEYROUSE

- 1818 Hist. abr. des pl. des Pyrénées..., I. (Toulouse).

LEJEUNE et COURTOIS

- 1831 Comp. Fl. Belgicae, II. (Leodii).

LINDAU

- 1910 =LINDAU in RABENHORST's Kryptogamen-Fl. von Deutschland, Österreich u. der Schweiz, I/9, 2. Aufl. (Leipzig).
 1912 =LINDAU in: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg und angrenzender Gebiete, V a, Pilze, III (herausgegeben v. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg). (Leipzig).
 1922 Hilfsbuch für das Sammeln parasitischer Pilze mit Berücks. d. einh. Nährpfl.; 2. Aufl. (Berlin).

LINK

- 1795 Dissert. Bot. (Suerini).
 1821 Enum. pl. Horti Berolinensis, I (Berolini).

LINNE

- 1753 Spec. pl. I. (Holmiae).
 1755 Fl. Suecica, II; 2. ed. (Stockholmiae).
 1762 Spec. pl., I; 2. ed. (Holmiae).

LITARDIÈRE (DE)

1948 Nouvelles contr. à l'étude de la fl. de la Corse.-Candollea, XI (Genève).

LOISELEUR

1805 — LOISELEUR in PERSOON (1805).

1806 — LOISELEUR DESLONGCHAMPS, 1806: Fl. Gallica, I. (Lutetiae).

1828 Fl. Gallica, I; 2. ed. (Parisii, Londini, Bruxellis).

LOJACONO

1888 Fl. Sicula. (Palermo).

LONSING

1939 Über einjährige europ. *Cerastium*-A. aus der Verw. d. Gr. «*Ciliatopetala*»

FENZL u. «*Cryptodon*» PAX. — FEDDE, Repert. spec. nov., XLVI. (Berlin).

LOSCOS et PARDO

1863 Series inconfecta pl. indigenarum Aragoniae praecipue meridionalis.

(?Dresdae). — «Museum Madrid».

1866 Plantas Aragonesas; 2. ed. (.....). — «Museum Kew».

MAIRE et WEILLER

1939 Contributions a l'étude de la Fl. de la Libye. — Bull. de la Soc. d'Hist. Nat. de l'Afrique du Nord, XXX.

MARTENS

1859 Überblick der Fl. Arctica. — Regensburger Denkschr., IV.

MARTIUS

1872 — ROHRBACH (1872).

MEINSHAUSEN

1878 Fl. Ingrica. (St. Petersburg).

MERTENS und KOCH

1831 I. C. RÖHLING's Deutschlands Fl., III. (Frankfurt am Main).

MEUSEL

1940 Die Grasheiden Mitteleuropas. — Bot. Archiv, XLI. (Leipzig).

1943 Vergleichende Arealkunde, I (Text) et II (Karten). (Berlin-Zehlendorf).

MEYER

1836 Chl. Hanoverana. (Göttingen).

MOENCH

1794 Meth. pl. horti bot. et agri Marburgensis. (Marburgi Cattorum).

MÖSCHL

1933 Zwei neue *Cerastium*-A. der Balkanh. — Öst. Bot. Z., LXXXII. (Wien).

1934 Berichtigungen. Öst. Bot. Z., LXXXIII/1. (Wien).

1936 Über einjährige europ. A. d. G. *Cerastium*. — FEDDE, Repert. spec. nov., XLI. (Berlin).

1938 Morphologie einjähriger europ. A. d. G. *Cerastium*. — Öst. Bot. Z., LXXXVII. (Wien).

1948 *Cerastium holosteoides* FR., ampl. HYL., ssp. *pseudoholosteoides* MÖSCHL. — Bot. Notiser (Lund).

1949: *Cerastium gracile* DUFOUR. — Collectanea Botanica, vol. II, fasc. II. (Barcelona).

MORICAUD

1820 Fl. Veneta, I (Genevae).

MORIS

1827-29 Stirp. sardoarum el., I-III. (Carali).

MÜLLER

- 1933 Verbreitungsflora der Garigueflora. — Beihefte zum Bot. Centralbl., L/2 (Dresden-N.).

MURBECK

- 1897 Contr. à la Conn. de la Fl. du nordouest de l'Afrique et plus spécial. de la Tunisie, I. (Lund).
 1898 De nordeurop. form. af slägtet *Cerastium*. — Bot. Not. (Lund).
 1935 Epistula: Lund, 27. III. 1935.

MURMANN

- 1874 Beitr. zur Pflanzengeogr. der Steiermark. (Wien).

MURR

- 1906 Beitr. zur Fl. von Tirol u. Vorarlberg. — Allg. Bot. Z., Jahrg. 1905. (Karlsruhe).

MUTEL

- 1834 Fl. Française, I. (Paris).

NEILREICH

- 1846 Fl. von Wien. (Wien).
 1859 Fl. von Niederösterreich, II. (Wien).
 1861 Nachträge zu MALY's Enum. pl. phanerog. imp. austr. univ. (Wien).

NEUMANN

- 1883 Stud. öfver Skanes och Hallands fl. — Bot. Not. (Lund).

NOTARIS (= DE NOTARIS).

- 1844 Repert. Fl. Ligusticae. (Taurini).

NOULET

- 1837 Flore du bassin sous-pyrénéen, . . (Toulouse).

NYMAN

- 1878 Conspl. Fl. Europaeae, I. (Örebro Sueciae).

ONNO

- 1933 Die Strandform. an der mittl. Lübecker Bucht. — Ber. der Deutschen Bot. Ges., LI/6. (Berlin-Dahlem).

OPIZ

- 1852 Sezn. Rostl. Kvet. Ceske. (Praze).

OSTWALD

- Die Farbtonleitern ; 2. Aufl. (Leipzig).

PACHER

- 1887 =PACHER in PACHER und JABORNEGGL, 1887: Fl. von Kärnten, I/3. (Klagenfurt).

PALMGREN

- 1927 Die Einwanderungswege der Fl. nach den Alandsinseln. — Acta Bot. Fennica, 2. (Helsingforsiae).

PENZIG

- 1921 Pfl.-Teratologie, 2. Aufl., I. (Berlin).

PERSOON

- 1805 Syn. Pl., I. (Parisiis, Lutetiorum et Tubingae).

PETIT

- 1884-85 ...Bot. Tidsskr. XIV. — Bibl.: Naturh. Museum, Wien.

PEYRITSCH

- 1881 Zur Aetiologie der Chloranthieen einiger *Arabis*-A. — PRINGSHEIM's Jb. f. wiss. Bot., XIII/1.

POLIVKA, DOMIN a PODPERA

- 1928 Klic k úplne kvét. rep. Ceskoslovenske, (Olomouci).

POLLINIUS

1822 Fl. Veronensis, II. (Veronae).

PREIS

1939 Die *Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium-Ass.* auf Basalt, Glimmerschiefer u. Granitgneis. Beih. Bot. — Centralbl. LIX/B (Dresden).

PRINGSHEIM

1906 Wasserbewegung u. Turgorregulation in welkenden Pflanzen. — Jahrb. wiss. Bot. XLIII/1 (sec. VOLK, 1931: 173).

PRITZEL

1872 Thesaurus Lit. Bot.; 2. ed.

RECHINGER

1943 Fl. Aegaea. — Denkschr. der Akad. Wiss. in Wien. Nath.-nat. Kl. CV/1.

REICHENBACH

1824 Iconogr. bot., I. (Lipsiae). — «1824» sec. Ind. Lond. (1930: 138, sub *C. semid.*).

1832 Fl. Germanica exc., II/3. (Lipsiae).

1841 Ic. Fl. Germanicae, V. (Lipsiae). — «1841» sec. Ind. Lond. (1930: 138, sub *C. semid.*).

1841 Deutschlands Fl., V. (Leipzig).

RENDLE

1930 Handb. of the British Fl., 7. ed. (olim: BENTHAM, HOOKER). (Kent).

RICHTER

1835 Car. LINNAEI systema, gen., spec., pl. uno vol., II. (Lipsiae).

ROHLENA

1942 Conspectus Fl. Montenegrinae. — Preslia (Praha), XX-XXI.

RÖHLING

1796 Deutschlands Fl. (Bremen).

ROHRBACH

1872 = ROHRBACH in MARTIUS, EICHLER et URBAN, 1872: Fl. Brasiliensis, XIV/2. (Lipsiae).

ROHWEDER

1939 Weitere Beitr. zur System. u. Phylog. der *Caryophyll.* — Beih. Bot. Centralbl. (Dresden), LIX/B.

ROSS und HEDICKE

1927 Die Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- u. Nordeuropas, 2. Aufl. (Jena).

ROTHMALER et SILVA

1939 Flora Lusitaniae emendationes. — Agronomia Lusitana, Vol. 1 — Tomo IV (Alcobaça).

ROUY et FOUCAUD

1896 Fl. de France, III (Chez).

RÜBEL

1930 Pflanzengesellschaften der Erde. (Bern-Berlin).

SACCARDO

1909: Chronologia delle Flora Italiana. (Padova) (= Vol. V ab: FIORI, PAOLETTI e BEGUINOT, Fl. anal. d'Italia).

SAINT AMANS

1921 Fl. Agenaise. (Agen).

SALMON

1913 Notes on Jersey pl. — J. of Bot., II.

SAMPALIO

- 1935 Novas adições e correções à Fl. Portuguesa. — Bol. da Soc. Broteriana, X
(2. ser.).

SANTESSON

- 1946 Epistula : Uppsala, 10. XII. 1946.

SCHISCHKIN

- 1926 Not. syst. ex Hb. H. Bot. USSR., VI.
1936a Fl. et System. pl. vasc. — Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS (Moskau-Leningrad),
Ser. I/III.
1936b Fl. URSS, VI. (Mo-qua-Leningrad).

SCHLECHTENDAL

- 1823 Fl. Berolinensis, I. (Berolini).

SCHLECHTENDAL

- 1838 De pl. Mexicanis. — Linnaea, XII (Halle /S.).

SCHLECHTENDAL et CHAMISSO

- 1830 Pl. Mexicanarum. — Linnaea, V (Berlin).

SCHLECHTENDAL, LANGETHAL und SCHENK

- 1883 Fl. von Deutschland, XII; 5. Aufl. (Gera-Untermhaus).

SCHMALHAUSEN

- 1895 Fl. sredn. i juzn. Ross. (sec. titulum cyrillicum), I. (Kiew).

SCHUR

- 1853 Sertum Fl. Transsilvanicae. — Verh. u. Mitt. des siebenbürg. Ver. f. Naturw. zu
Hermannstadt.
1866 Enum. pl. Transsilvaniae. (Vindobonae).
1871 Phytogr. Fragmente. — Öst. Bot. Z., XXI. (Wien).
1877 Phytogr. Mitt. — Verh. des naturf. Ver. in Brünn. XV/2.

SCHWARZ

- 1936 Die Vegetationsverhältnisse Westanatoliens. — Bot. Jb. (ENGLER), LXVII.
(Leipzig).

SCOPOLI

- 1772 Fl. Carniolica, I; 2. ed. (Vindobonae).

SEBASTIANI et MAURI

- 1818 Fl. Romanæ Prodr. (Romæ).

SENKEN et PAU

- 1908 .. Bull. Acad. int. Geogr. Bot. Paris, XVII.

SERINGE

- 1824 = SERINGE in DE CANDOLLE, 1824: Prodr. syst. nat. r. veget., I. (Parisiis).

SIBTHORP-SMITH

- 1806 Fl. Graecæ Prodr., I. (Londini).

SIMONKAI

- 1886 Enum. Fl. Transsilvanicae. (Budapest).

SMALL

- 1903 Fl. of the Southeastern United States. (New York).

SMITH-RÖMER

- 1804 Fl. Britannica, II. (Turici).

SONDER

- 1859-60 = SONDER in HARVEY and SONDER, 1859-60: Flora Capensis, I (Dublin).

SOYER-WILLEMET

1839 Sur le *Cerastium manticum* et quelques espèces de ce genre. (Nancy).

SOWERBY and SMITH

1806 Engl. Bot., XXIII.

SPENNER

1829 Fl. Friburgensis, III. (Friburgi Brisgoviae).

SPRENGEL

1825 CAR. LINNAEI Syst. veget., 16 ed., I et II. (Gottingae).

STOIANOFF et STEFANOFF

1923 Fl. de la Bulgarie, I.—Annu. des Arch. Min. de l'agric. Bulg., IV. (Sofia).

1933 eodem titulo, I; 2. ed. (Sofia).

STROBL

1885 Fl. des Etna. — Öst. Bot. Z., XXXV. (Wien).

STURM

1833 Deutschlands Fl., I/63. (Nürnberg).

TCHIHATCHEFF

1866 Asie Mineure ; Botanique I. (Paris).

TENORE

1811 Fl. Napolitana. (Napoli).

1830 Fl. Napolitana, II/IV. (Napoli).

1831 Syll. pl. vasc. Fl. Neapolitanae. (Neapoli).

TERRACCIANO

1891 Syn. pl. vasc. Mt. Pollini — Annu. del R. Ist. Bot. di Roma, IV (Milano).

TORNABENE

1889 Fl. Aetnea, I. (Catinae).

TOWNSEND

1877 One some spec. of *Cerastium*. — J. of Bot. (London), XV.

UECHTRITZ

1884 Result. der Durchf. der schlesischen Phanerogamenfl. im J. 1883. — 61. Jber. der Schlesischen Ges. f. Vaterl. Cultur (Breslau).

VAHL

1799 Fl. Danicae, VII. (Hauniae).

VAILLANT

1727 Bot. Parisiense. (Leide et Amsterdam).

VAUGH

1946 Epistula : Ann Arbor, Michigan, U. S. A., 5. XI. 1946.

VANDAS

1909 Reliquiae FORMÁNEK. (Brunae).

VELENOVSKY

1891 Fl. Bulgarica. (Prag).

1900 7. Nachtr. zur Fl. von Bulgarien. — Sitzber. der kön. Böh. Ges. der Wiss., math. naturw. Kl. (Prag), Jahrg. 1899.

VIAUD GRAND-MARAIS et GUYAN-VARCH

1883 Cat. des pl. vasc. de l'île de Groix. — Bull. de la Soc. Bot. de France, XXX. — Bibl. : « Université Grenoble ».

VICIOSO

1946 : Notas sobre la Flora Española. — An. del Jard. Bot. de Madrid, VI/2 (1945).

- VISIANI
1852 Fl. Dalmatica, III. (Lipsiae).
- VIVIANI
1824 Fl. Corsicae spec. nov. (Genuae).
- VOLK
1931 Beitr. zur Ökologie der Sandveget. der oberrhein. Tiefebene. — Z. f. Bot. XXIV, (Jena).
- VOLLMANN
1914 Fl. von Bayern. (Stuttgart).
- WAHLENBERG
1814 Fl. Carpatorum. (Göttingae).
1824 Fl. Suecica, I. (Upsaliae).
- WALDSTEIN und KITAIBEL
1802 Descr. et ic. pl. rar. Hung., I.
- WALTER
1788 Fl. Caroliniana (London). — Bibl.: Royal Botanic Gardens, Kew, Britannia.
- WEIMARCK
1916 = Epistula: Lund, 1. X. 1946.
- WHITE
1946 Epistula: Brisbane (Australien), 25. IX. 1946.
- WILLIAMS
1898a Enum. provisoire des esp. du g. *Cerastium*. — Bull. Herb. BOISSIER (Genève), VI/11.
1898b Crit. Notes on some spec. of *Cerastium*. — J. of Bot., XXXVI.
1899 Crit. Notes ... *Cerastium*. — J. of Bot., XXXVII.
1922 Crit. Notes ... *Cerastium*. — J. of Bot., LX.
- WILLKOMM
1863 Führer in's Reich der deutschen Pfl. (Leipzig).
1882 Führer in das Reich der Pfl. Deutschl., Österreichs u. der Schweiz, 2. Aufl. (Leipzig).
- WILLKOMM et LANGE
1880 Prodr. Fl. Hispanicae, III. (Stuttgariae).
- WILSON
1833 Observations on some British plants, particularly with reference to the English Fl. of Sir JAMES E. SMITH. — Miscellany (ed. by HOOKER) III. — « Bibl. : Museum Kew ».
- WIMMER et GRABOWSKY
1827 Fl. Silesiae, I. (Vratislaviae).
- WOHLFARTH
1892 = WOHLFARTH in HALLIER-WOHLFARTH, 1892: W. D. I. KOCH's Syn. der Deutschen u. der Schweizer Fl., 3, Aufl., I. (Leipzig).
- ZAPALOWICZ
1911 Conspl. Fl. Galiciae crit., III. (Cracoviae).



SUMMA.

In hoc opusculo omnes biotypi *Cerastii semidecandri* LINNAEI, sensu latiore, tractantur. — *C. semidecandrum* L., s. l. (significatum est bracteis infimis in apicibus semper fere usque ad tertiam partem longitudinis — plusve minusve — hyaline membranaceis) hoc modo in species distinctas dividitur :

- 1) Plantae glabrae aut in superiore parte pilis obtusis et pygmaeis, numquam acuminatis, vestitae = *C. macilentum* ASPEGREN (p. 52).
-) Plantae pilis acuminatis vestitae et semper fere glandulosae, in calyce saltem 2
- 2) Petala super stamina semper eminentia, acutiuscule biloba aut denticulata = *C. semidecandrum* LINNE, sensu stricto (p. 10).
-) Petala aequilonga staminibus, integra aut acute denticulata, numquam biloba = *C. balearicum* HERMANN (p. 44).

Species et glabritie aut vestitu pilorum et forma et longitudine petalorum discriminantur. Loca, quibus *C. semid.* et *C. balear.* inveniuntur, ex exemplis visis aut operibus citatis in fig. 50 designata sunt. Figurae partes floris et fructus demonstrant. — Species singulæ Latine describuntur et Germanice explicantur. Fines et quibus ex originibus species exortae sint, Germanice tractantur. In indice plantarum synomymis *C. semidecandri* L., s. l., diagnoses originales additæ sunt. Praeterea omnibus nominibus additur, cui speciei attribuenda sint.

Cum mihi in animo sit, has species porro inquirere, oro, ut nominatione operum mihi ignotorum aut missione typis et exemplis (quae ad tempus brevissimum remittam) adiuver. Epistulae mitti possunt ad: «Dr. Wilhelm Möschl, Österreich, Steiermark, Bruck a. d. Mur, Erzherzog-Johann-G. 8» aut, permissione directoris instituti cit. Prof. Dr. Felix WIDDER. ad: «Dr. W. Möschl, Österreich, Steiermark, Graz, Holteigasse 6 — Institut für systematische Botanik der Universität Graz».

NOTA.

Praeterea omnes species «Subdivisio 2. *Leiopetala* FENZL (Divisio 1. *Fugacia* FENZL), quae in «MÖSCHL, Über einjährige europ. A. d. G. *Cerastium*. FEDDE, Repert. spec. nov., XLI (1936: 153-163)» citatae sunt, a me porro tractantur. Quare omni tempore talia exempla determinare paratus sum.

CORRIGENDA ET ADDENDA.

- P. 5 (§ 2, lin. 15), adde: «MERXMÜLLER (München),».
» (§ 2, lin. 20), adde: «SUESSENGUTH (München),».
- P. 7 (§ 1, lin. 3), adde: «e, f, g, (RECHINGER; Wien, 5. XI, 1949).».
- P. 8, deleatur: «UC =...».
- P. 10 (§ 1, lin. 3), non «lugdb. 550», sed: 450!
» (§ 3 = descr. nova, lin. 20), non «aulatim», sed: paulatim!
- P. 11 (§ 2 = Syn.), non «1781 — *C. breviflorum*...», sed: «1782» (cf. Ind. pl., nr. 23, et Ind. librorum!).
» (§ 2 = Syn.), non «1789», sed: 1783.
» (§ 2 = Syn.), adde: «1805 — *C. pusillum* CURT. apud LAMARCK et DC., 777
(sub: *C. semid.* β) (= *C. pusillum* CURTIS apud SPENNER, 849.) in p. 12;
Ind. pl., nr. 83).
» (§ 2 = Syn.), adde: «1820 = *C. viscosum* MORICAUD, 206, nr. 3.» (cf. Ind.
pl., nr. 249).
» (§ 2 = Syn.), adde: «1824 — *C. viscosum* DIETRICH, 441.» (cf. Ind. pl.,
nr. 246).
» (§ 2 = Syn.), adde: «1827 — *C. Boenninghausianum* WEIHE e WIMMER et GR.,
430 (in textu *C. semid.*).» (= «1831 — *C. Boenninghausianum* WEIHE ex
LEJEUNE et COURTOIS, 102.» in p. 12; cf. Ind. pl., nr. 19).
» (§ 2 = Syn.) adde: «1828 — *C. semidecandrum* γ. *pellucidum* DUBY, 87.»
(cf. Ind. pl., nr. 175).
- P. 12, adde: «1839 — *C. semidecandrum* var. *tenuis*,..., GAY e SOYER-WILLEMET,
55.» (cf. Ind. pl., nr. 207).
» (post: 1861), non «8631 — *C. arenosum* ... 214 518.», sed: «1863 — ...
214/518.».
- P. 13, non «1896 — *C. semidecandrum* ε. *parviflorum*...», sed: ζ!
- P. 15 (post: HEGI ...), adde: «HEIMANS, KLOOS en KRUSEMAN, Geillustreerd
Flora von Nederland... (door HEIMANS, HEINSIUS en THIJSSSE), 16. ed.,
Amsterdam-Batavia (1947: 435): figura haud laudanda.».
- P. 22 (§ 9D¹, lin. 16), adde: «West-Tirol, Faggen bei Kauns (KIELHAUSER: Mö,
Wi).»
- P. 27 (§ 1 = Syn.), non «1918 — ... *hybridum* GRAEBNER ...», sed: *hibridum*!
- P. 32 (§ 1, lin. 13), non «(S. 7: II A)», sed: 16: II A.
- P. 31 (§ 3, lin. 9) adde: «Bei den Infectionversuchen mit *Aecidium elatinum*, dem
Urheber des Tannen-Hexenbesens, wurden *Stellaria*... und *Cerastium*
semidecandrum mit Erfolg infiziert. [TUBEUF, Kleinere Mitt. u. Not. (Arb.
d. Biol. Abt. f. Land — u. Forstwirtschaft a. Kais. Gesundheitsamt, 1901, Bd.
II, Heft 2, p. 364) sec. JUST, Bot. Iber. XXX (1902), II, 1905: 397].»; «*Aeci-
dium elatinum*» non in p. 16-17 neque in Indice plantarum citatum est.
- P. 34 (§ 1, lin. 21), non «1820 m», sed: 1280!
- P. 35 (lin. 30), non «! (1922), S. 402!», sed: [(1922), S. 402]!



- P. 36 (§ 1, lin. 35), non « werhalb », sed : weshalb !
- P. 37 (§ 1, lin. 1), non « Samenzahll », sed : Samenzahl !
- P. 37 (§ 2, lin. 28), non « MORRIS », sed : MORIS !
- P. 44 (§ 1, lin. 19), non « zurück, durch », sed : « zurück. Durch » !
» (§ 3, lin. 1), non « Aufstiege », sed : Aufstieg !
- P. 46 (§ 2 = Syn.), adde : « 1832 — C. semidecandrum B. C. S. Linnaeanum CHAUBARD, 130. » (= « 1838 — C. semidecandrum B. C. S. Linnaeanum CHAUBARD et BORY, 29. » in p. 46; cf. Ind. pl., nr. 161).
» (§ 10C², lin. 2), non « Exs. Soc. Cen. 493 », sed : 403 !
- P. 49 (§ 1, lin. 18), non « ALEXBENKO », sed : ALEXEENKO.
» (§ 2, lin. 11), non « C. semid. f. bilobum », sed : f. genuinum !
» (§ 2, lin. 16), adde : « Moron (Sevilla) » (VICIOSO. Notas sobre la Fl. Española. — An. del Jard. Bot. de Madrid, VI/2, 1946: 28 — C. semid.); non insignata in fig. 50 (« 11B¹ »), p. 58.
- P. 50 (lin. 17), non « (ADAMOVIC: MBe), und C. balear. (UW, DIMONIE », sed : « (ADAMOVIC: MBe, UW) und C. balear. (DIMONIE » !
» (lin. 28, ante « Lenkoran »), adde : « RIKLI, Das Pflanzenkleid d. Mittelmeerländer, II (1945: 831) gibt die Art in der Dünenzone der Kolchis zusammen mit der mediterranen Euphorbia Paralias an. Diese Angabe fehlt in der Karte = Fig. 50, S. 58). »
- P. 54 (§ 5 = specim. sequ.), non « UL », sed semper : ULu !
- P. 55 (1, lin. 15), non « aunsnahmslos », sed : ausnahmslos !
- P. 56 (§ 2, lin. 4), adde : « C. perfoliatum L. trägt am Blattrand mitunter gut sichtbare Stumpfhaare (bis 0,5 mm). »
» (§ 3, lin. 1), non « lu », sed : In !
- P. 60 (§ 1, lin. 17), non « dem Grossen », sed : dem grossen !
» (§ 2, lin. 13), non « haldelt », sed : handelt !
- P. 65 (Nr. 1, lin. 24), non « Cf. nr. ind. 90 », sed : 89 !
- P. 69 (Nr. 23, lin. 1), non « WILLIAMS (1899: 128) », sed : WILLIAMS (1899: 123) !
» (Nr. 24, lin. 3), adde : « Sec. MOSCHL, Cerastium campanulatum VIVIANI und ähnliche Arten (Portugaliae Acta Biologica, B; Vol. « Júlio HENRIQUES », 1949, perfecte impressum 1950) syn. nr. 154 = C. granulatum CHIOV. et syn. nr. 171 = C. palustre MORIS. »
- P. 71 (Nr. 38, lin. 2), adde post nr. 254 : « 256. »
- P. 72 (Nr. 51, lin. 1), non « (1813: ?) », sed : « (1813: 44) »; confer p. 11.
- P. 77 (Nr. 81, lin. 2), adde post nr. 247 : « 254. »
- P. 93 (Nr. 193, lin. 9), adde : « STOIANOFF et STEF. (1933: 382). »
- P. 94 (Nr. 195, lid. 6), non « (HOFMN.) », sed : (HOFM.).
- P. 95 (Nr. 202b, lin. 2), non « 46 », sed : 47.
- P. 96 (Nr. 212, lin. 5), non « 55, 55 », sed : 54, 55.

INHALTSÜBERSICHT.

	Seite
Einleitung (mit Abkürzungen)	5
<i>Cerastium semidecandrum</i> LINNE, sensu stricto (= <i>C. semid.</i>)	10
Dispositio formarum, status morbosi hybridaeque	16
Forma <i>genuinum</i> (ROUY et FOUCAUD) MÖSCHL	17
Forma <i>stenopetalum</i> (BECK) HEGI	24
Status morbosi	26
Hybridae	28
Tractatio speciei in Lingua Germanica	30
<i>Cerastium balearicum</i> HERMANN (= <i>C. balear.</i>)	44
<i>Cerastium macilentum</i> ASPEGREN (= <i>C. macil.</i>)	52
Gemeinsame Merkmale, verwandschaftliche Beziehungen, Lebensraum und mögliche Entfaltung der Sippe	56
Index plantarum et tractatarum et excludendarum (synonyma <i>C. semidecandri</i> L., s. l., cum descriptionibus originalibus; nomina omnia cum nomenclatione specierum illarum, qui- bus illa attribuenda sunt)	65
Index animalium tractatorum	106
Index librorum tractatorum	106
Summa	120
Corrigenda et addenda	121
Index figurarum: fig. 1-37 = p. 9; fig. 38-39 = p. 35; fig. 40-45 = p. 39; fig. 46-48 = p. 41; fig. 49 = p. 48; fig 50=tab. geogr. = = p. 58; fig. 51 = p. 64.	



443
 $\frac{1}{2}$ inod.







