2
(9)
14

Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 2

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral
1301500904

MATRI

VITRICO . QVE . SVIS

CARISSIMIS . AC . LONGE . COLENDISSIMIS

IN

PVBLICVM . AC . PERPETVVM

AMORIS . ATQVE . OBSERVANTIAE

TESTIMONIVM

D.

FRANCISCVS . ANTONIVS . ALVES

b2453450x

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

DECERPTAE,

QUAS,

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. Sebastiano d'Almeida e Silva,

SECUNDO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSORE P. O.,

CAET., CAET., CAET.

IN

CONIMBRICENSI ACADEMIA

Integra hujus mensis die

PROPUGNANDAS OFFERT

FRANCISCUS ANTONIUS ALVES.

INAUGURALI DISSERTATIONI

EX

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

DECRETO

ARGUMENTUM PRAEBET:

Nunquid inter febrem puerperalem, metro-peritonitem, et phlebitem uterinam verum datur discrimen?

Quae rationalis hujus febris curatio?

La plus haute mission de l'homme, après celle du service des autels, est d'être prêtre du feu sacré de la vie, dispensateur des plus beaux dons de Dieu, et maître des forces occultes de la nature, c'est-à-dire, d'être médécin.

HUFELAND.

Ex Anatome humana et Comparata.

L'anatomie forme le premier anneau de la chaîne dont se composent les sciences médicales.

CRUVEILHIER.

I.

Staechiologia anatomiae pars, et admodum necessaria.

II.

Omnes humani corporis textus a cellula proveniunt; omnes tamen ex cellulis non constant.

III.

Prima rudimenta ossificationis in externis membranis cellularum cartilaginearum efficiuntur.

IV.

De anatomicis muscularium fasciculorum elementis Bowmani sententiam impugnabimus.

V.

Ex cellulis nucleatis hepatis parenchyma constat.

VI.

Sudoriferas inter et ceruminosas glandulas nullum verum discrimen.

VII.

Ganglia, et spinalis medulla, substantiae nerveae centra generatoria.

VIII.

Fibra centralis tubuli nervei constans elementum.

IX.

Retinae structura minime eadem in omnibus vertebratis.

Ex Physiologia, Hygieina et Operationibus chirurgicis.

Nosce te ipsum.

SOCRATES.

Tout par l'observation, et l'expérience.

BECLARD.

I.

Organismi principia immediata praecipuam originem in eo habent.

II.

Sanguinis temperies non in dexteris, ut existimat Bernard, quam in sinistris, cordis cavis, calidior.

III.

Globulorum sanguinis solutio perquam probabiliter lienis functio.

IV.

Saccharum in hepate segregatum in pulmonibus transformatur.

V.

Ab epithelio seminiferorum canaliculorum spermatozoa orta.

VI.

Cellularum contactus duarum in animalibus generationis initium.

VII.

Verdé-Delisle sententiam de vaccinationis utilitate rejicimus.

VIII.

Artificialis lactatio raro in usu ponenda.

IX.

In rhinoplastiae operatione indiana methodùs anteponenda.

Ex Materia Medica et Pharmacia, Pathologia Generali et Chirurgica.

Que peut être la Thérapeutique, si l'on ignore comment, et sur quelles parties agissent les médicaments?

BÉJIN.

I.

Medicamentorum — in hyposthenisantia et hypersthenisantia — divisionem rejicimus.

II.

Strychninae vis in nervea centra, sanguine interveniente, exercetur.

III.

Ferrum non verum emmenagogum.

IV.

Aetheris et chloroformii per albumen *solidificatio* optima pharmaceutica praeparatio.

V.

In hydrolatis praeparandis, medicaminis principiorum solutio vaporis ope efficienda.

VI.

Microscopia ad dignoscendos quosdam morbos utilissima.

VII.

Pathologiae et Therapiae admodum prodest haematologia.

VIII.

In Therapia electricitatis effectus, per *inductionem* obtentae, praestantissimi.

IX.

In curanda rachitide, orthopedicae operationes absque interna medicatione parum proficiunt.

Ex Pathologia et Therapia medica, Tocologia, Medicina Forensi, Publica Hygieina, et Hippocratica doctrina.

Ars medica est id quod est propter therapeuticen.
RENOUARD.

La thérapeutique est le complément nécessaire de toutes les connaissances médicales, et le but vers le quel doivent tendre tous les efforts des médecins.
GUERSANT.

I.

Andralis sententia de diabetis pathogenia aliquando probabilis.

II.

Virus syphiliticum unum;

III.

Ex quo blennorrhagiae plerumque non proveniunt.

IV.

Bilis absorptio icteri sola proxima causa.

V.

Febres essentiales alterationibus primitivis haematologicis saepe respondent.

VI.

In tinea curanda per depilationem Mahonis methodus anteponenda.

VII.

Thomasini sententiam de typhi icterodeos *(febre amarella)* natura impugnamus.

VIII.

Homoeopathicam pathogeniam non admittimus.

IX.

Giacomini sententiam de tartari emetici actione ad pneumonias curandas rejicimus.

X.

In pelvis angustia, inter septem novemque centimetra, symphyseotomia raro instituenda.

XI.

Artificialis partus praematurus, potius mechanicis, quam Pharmacologicis agentibus, efficiendus.

XII.

Physiologicam *glucosuriam* in puerperis dari sustinebimus.

XIII.

In litibus infanticidii, pulmonarem docimasiam hydrostaticam reliquis anteponimus.

XIV.

Inter maniae et monomaniae proximam causam verum discrimen.

XV.

Auburn poenitentiarium systema, quam Phyladelphiae, praestantius.

XVI.

Expositorum infantium nostratia instituta reformanda.

XVII.

Hippocratis philosophia medica praecipue in Pythagorae doctrinis fundamentum habet.

XVIII.

Aphoris. 14 — Seç. 1.ª = Qui crescunt plurimum habent, etc.
» 22 — » 1.ª = Concocta purgare, etc.
» 13 — » 2.ª = Quibuscumque crisis, etc.
» 22 — » 4.ª = Morbis quibuslibet, etc.

TYPIS ACADEMICIS. — MDCCCLVII.

2 020000 048572 0200